

Koninkrijk België

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID
VAN DE VOEDSELKETEN EN
LEEFMILIEU**

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen
zullen, Onze Groet.

Gelet op verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, laatst gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten;

Gelet op het advies van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten, gegeven op 14 februari 2023;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 maart 2023 ;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 29 juli 2022 met toepassing van artikel 5, lid 1, van

richtlijn 2015/1535/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen die op 12 september 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de beslissing van de Raad van State van 19 september 2023 om geen advies te verlenen;

Gelet op artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen, gegeven op 28 juni 2022;

Overwegende dat planten, die al dan niet in de lijsten van de bijlage vermeld zijn, en die tot 15 mei 1997 in de Europese Unie niet in significante mate voor de menselijke voeding zijn gebruikt, onder de toepassing vallen van verordening (EU) nr. 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en de Minister van Volksgezondheid,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN
BESLUITEN WIJ:

Artikel 1. In artikel 6, §1, van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- a) in de bepaling onder 7° worden de woorden “die in lijst 2 en 3 van de bijlage van dit besluit zijn

aangegeven,"opgeheven;

- b) in de bepaling onder 8° worden de woorden "die in lijst 2 en 3 van de bijlage bij dit besluit zijn aangegeven,"opgeheven.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. De voedingsmiddelen die niet voldoen aan de voorwaarden vervat in dit besluit maar wel aan de voorwaarden zoals die golden vóór de inwerkingtreding van dit besluit, kunnen in de handel worden gebracht tot twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4. De minister bevoegd voor Landbouw en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gedaan te Brussel, 12 december 2023

Van Koningswege:

De Minister van Landbouw,
De Minister van Volksgezondheid,

BIJLAGE bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2021
betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen
samengesteld zijn of deze bevatten

Lijst 1 : Gevaarlijke planten die niet als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden

Wetenschappelijke naam / Nom scientifique	Familie / Famille	Synoniemen/ Synonymes	Nederlandse naam / nom Néerlandais	Franse naam / nom Français	Beperkingen en afwijkingsvoorwaarden	Limites et conditions de dérogation
Abrus precatorius L.	Leguminosae		weesboontje	régλισse d'amérique		
Aconitum spp.	Ranunculaceae		monnikskap	aconit		
Actaea spicata L.	Ranunculaceae		christoffelkruid	actée en épi		
Adenium spp.	Apocynaceae					
Adonis spp.	Ranunculaceae		voorjaarsadonis	adonis du printemps		
Aethusa cynapium L.	Apiaceae		hondspeterselie	petite ciguë		
Agapanthus spp.	Amaryllidaceae		afrikaanse lelie	agapanthe		
Agrostemma githago L.	Caryophyllaceae		bolderik	nielle des blés		
Aletris farinosa L.	Nartheciaceae					
Aleurites spp.	Euphorbiaceae		o.a. houtolieboom	aleurite, e.a. bancoulier		
Aleurites moluccana (L.) Willd.	Euphorbiaceae		kemiri, kukui	graine de lumbang, kukui, kemiri	Een afwijking voor het gebruik van niet geraffineerde olie kan worden gevraagd aan en	Une dérogation pour l'utilisation de l'huile non raffinée peut être demandée et est

					wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat phorbolesters en/of eleostearinezuur bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze phorbolesters en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor eleostearinezuur.	évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des esters de phorbol et/ou de l'acide éléostéarique, quelle que soit sa source, ne conduit pas, respectivement, à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces esters de phorbol scientifiquement fondée et à la valeur DNEL de l'acide éléostéarique scientifiquement fondée.
Alkanna spp.	Boraginaceae		alkanna	orcanette		
Amaryllis spp.	Amaryllidaceae		amaryllis	amaryllis		
Ammi majus L.	Apiaceae		groot	grand ammi		

			akkerscherm			
Anacyclus officinarum Hayne	Anacyclus		duitse bertram	pyrèthre d'Allemagne		
Anacyclus pyrethrum (L.) Link.	Anacyclus		roomse bertram	pyrèthre d'Afrique		
Anadenanthera spp.	Leguminosae					
Anagallis arvensis L.	Primulaceae		guichelheil	mouron rouge des champs		
Anamirta cocculus (L.) Wight et Arn.	Menispermaceae		kokkelkorrelstruik	coque du levant		
Anchusa spp.	Boraginaceae		ossentong	buglosse		
Andromeda spp.	Ericaceae		lavendelhei	andromède		
Anemone spp.	Ranunculaceae		anemoon	anémone		
Galipea officinalis Hancock, Cusparia officinalis (Hancock.) Engl. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)		Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias, Cusparia trifoliata (Willd) Engl.	angusturaboom	angusture vraie		
Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. Coulton.	Cactaceae	Anhalonium lewinii Henning	peyote, peyotl	peyote, peyotl		
Annona spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Annonaceae		o.a. zuurzakboom	e.a. corossol, cœur de bœuf		
Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.	Moraceae		upas	ipo		
Aquilegia vulgaris L.	Ranunculaceae		wilde akelei	ancolie vulgaire		
Areca catechu L.	Arecaceae		areka, betelnootpalm	aréquier		

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.	Compositae	Chrysanthemum frutescens L.	struikmargriet	anthémis		
Arisaema spp.	Araceae		o.a. drakeraap	e.a. navet indien		
Aristolochia spp.	Aristolochiaceae		pijpbloem	aristoloche commune		
Arnica chamissonis Less.	Compositae		valkruid	arnica		
Arnica montana L.	Compositae		valkruid	arnica		
Artemisia annua L.	Compositae		zomeralsem	armoise annuelle		
Arum maculatum L.	Araceae		gevlekte aronskelk	arum tacheté, gouet tacheté		
Asarum canadense L.	Aristolochiaceae		Canadese mansoor	asaret du Canada		
Asarum europaeum L.	Aristolochiaceae		mansoor	asaret d'Europe		
Aspidosperma spp.	Apocynaceae					
Athyrium filix-femina (L.) Roth	Athyriaceae		wijfjesvaren	fougère femelle		
Atractylis gummifera (L.) Less.	Compositae			chardon à glu		
Atropa spp.	Solanaceae					
Aucuba japonica Thunb.	Garryaceae		broodboom	aucuba		
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.	Compositae	Eupatorium triplinerve Vahl				
Baccharis spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Compositae					
Baptisia spp.	Leguminosae					
Baptisia tinctoria (L.) R.Br.	Leguminosae		wilde indigo, verflupine	indigo sauvage, lupin indigo	Een afwijking voor het gebruik van de	Une dérogation pour l'utilisation

					wortel kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor planten-bereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat cytisine bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor cytisine.	de la racine peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant de la cytisine, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de cytisine scientifiquement fondée.
<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb.	Iridaceae	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	luipaardbloem	fleur léopard		
<i>Borago</i> spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Boraginaceae		incl. bernagie	incl. bourrache	Het gebruik van kleine hoeveelheden bloemen van <i>Borago officinalis</i> L. in culinaire bereidingen is toegelaten.	L'utilisation de petites quantités de fleurs de <i>Borago officinalis</i> L. dans les préparations culinaires est autorisée.
<i>Brachyglottis</i> spp.	Compositae					
<i>Brayera</i>	Rosaceae	<i>Hagenia</i>	kosoboom	kousso		

anthelmintica Kunth		abyssinica (Bruce) J.F. Gmel.				
Brugmansia spp.	Solanaceae					
Brunfelsia spp.	Solanaceae					
Bryonia spp.	Cucurbitaceae		o.a. heggerank	bryone		
Buxus sempervirens L.	Buxaceae		palmboompje	buis commun		
Caladium spp.	Araceae			pédiveau		
Calea zacatechichi Schltdl	Compositae		droomkruid	l'herbe rêveuse		
Calla palustris L.	Araceae		slangewortel	calla des marais		
Caltha palustris L.	Ranunculaceae		dotterbloem	souci d'eau, populage des marais		
Canarium indicum L.	Burseraceae		nangainoten	noix de nagaille		
Cannabis sativa L.	Cannabaceae		hennep	chanvre	Het gebruik van hennepzaden en daarvan afgeleide producten kan worden toegestaan indien het voedingsmiddel voldoet aan de bepalingen van sectie 2.6 (delta-9- tetrahydrocannabi nol (Δ9-THC)- equivalenten) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023	L'utilisation des graines de chanvre et des produits dérivés peut être autorisée si la denrée alimentaire est conforme aux dispositions de la section 2.6 (équivalents de delta-9- tétrahydrocannabi nol (Δ9-THC)) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023

					betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006.	concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006.
Caragana arborescens Lam.	Leguminosae		erwtenstruik	arbre aux pois		
Carlina spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Compositae					
Caryota spp.	Arecaceae			e.a. palmier céleri		
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl.	Celastraceae		qat	khat		
Catharanthus roseus (L.) G.Don.	Apocynaceae		roze maagdenpalm	pervenche de Madagascar		
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx.	Berberidaceae		blauwe zilverkaars	blue cohosh		
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L.Andersson	Rubiaceae	Cephaelis acuminata Karst., Uragoga granatensis Baill., Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill., Cephaelis ipecacuanha (Brot.) Tussac	braakwortel	racine d'ipeca, ipéca du Brésil		
Erysimum x cheiri (L.) Crantz	Brassicaceae	Cheiranthus x cheiri L.	muurbloem	giroflée des murailles, vélard		
Cestrum spp.	Solanaceae					

Ceterach officinarum DC.	Aspleniaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat ptaquiloside bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor ptaquiloside.	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant du ptaquiloside, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de ptaquiloside scientifiquement fondée.
Chamaelirium luteum (L.) A. Gray	Melanthiaceae		helonias	fausse unicorne		
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	Chenopodium ambrosioides L.	welriekende ganzevoet	chénopode fausse-ambroise, thé-du-mexique		
Cibotium barometz (L.) J. Sm.	Dicksoniaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations

					plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat ptaquiloside bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor ptaquiloside.	de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant du ptaquiloside, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de ptaquiloside scientifiquement fondée.
<i>Cicuta virosa</i> L.	Apiaceae		waterscheerling	ciguë vireuse, ciguë aquatique		
<i>Cineraria</i> spp.	Compositae			cinéraire		
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	Cucurbitaceae	<i>Cucumis colocynthis</i> L.	kolokwint	coloquinte officinale		
<i>Clivia miniata</i> (Lindl.) Bosse	Amaryllidaceae		clivia, sint-Jozefsbloem	lis de saint Joseph		
<i>Clusia rosea</i> Jacq.	Clusiaceae					
<i>Cnidioscolus</i> spp.	Euphorbiaceae					
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchicaceae		herfsttijloos	colchique d'automne		
<i>Colutea arborescens</i> L.	Leguminosae		europese blazenstruik	baguenaudier commun, arbre à vessies		
<i>Comandra</i> spp.	Santalaceae					
<i>Conium</i>	Apiaceae		gevekte	grande ciguë		

maculatum L.			scheerling			
Convallaria majalis L.	Asparagaceae		lelietje-van-dalen, meiklokje	muguet		
Convolvulus arvensis L.	Convolvulaceae		akkerwinde	liseron des champs		
Convolvulus scammonia L.	Convolvulaceae		purgeerwinde	scammonée		
Coriaria myrtifolia L.	Coriariaceae		looiersstruik	redoul		
Coriaria thymifolia Humb. et Bonpl.	Coriariaceae					
Corydalis spp.	Papaveraceae		helmbloem, o.a. holwortel	e.a. corydale creuse		
Corydalis solida (L.) Clairv.	Papaveraceae	Corydalis bulbosa (L.) DC.	vingerhelmbloem	corydale solide, corydale à tubercule plein	Een afwijking voor het gebruik van de wortelstok kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk	Une dérogation pour l'utilisation du rhizome peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de)

					onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloïden.	ces alcaloïdes scientifiquement fondée.
Corynanthe spp.	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
Cotoneaster spp.	Rosaceae		dwergmispel	cotonéaster		
Crinum asiaticum L.	Amaryllidaceae		lelie	crinum d'asie		
Crotalaria spp.	Leguminosae					
Croton spp.	Euphorbiaceae					
Cryptostegia spp.	Apocynaceae					
Cycas spp.	Cycadaceae		cycaspalm, varenpalm	cycas		
Cynodon dactylon (L.) Pers.	Poaceae		handjesgras	chiendent dactyle		
Cynoglossum spp.	Boraginaceae		hondstong	cynoglosse		
Cypripedium calceolus L.	Orchidaceae		vrouwenschoentj e	sabot de vénus		
Cytisus spp.	Leguminosae					
Dalechampia scandens Jacq.	Euphorbiaceae			liane ortie		
Daphne spp.	Thymelaeaceae					
Datura spp.	Solanaceae					
Delphinium spp.	Ranunculaceae		ridderspoor	staphisaigre, dauphinelle		
Derris spp.	Leguminosae					
Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara		Dicentra spectabilis (L.) Lem.	Gebroken hartje	cœur de marie, cœur de jeanette		
Dichondra repens J.R. Forst. Et G. Forst.	Convolvulaceae			dichondra rampant		

Dictamnus albus L.	Rutaceae		vuurwerkplant, essenkruid	dictame blanc, fraxinelle		
Dieffenbachia spp.	Araceae		dieffenbachia	dieffenbachia		
Digitalis spp.	Plantaginaceae		vingerhoedskruid	digitale		
Tamus communis L.	Dioscoreaceae	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	spekwortel	tamier commun		
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.	Leguminosae		tonkabonen boom	fève de tonka		
Dirca palustris L.	Thymelaeaceae			dirca des marais		
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Dryopteridaceae		mannetjesvaren	fougère mâle		
Duboisia spp.	Solanaceae					
Durio zibethinus L.	Malvaceae		doerian	durian, durion		
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.	Cucurbitaceae		springkomkommer	concombre d'âne, momordique		
Echium spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Boraginaceae		o.a. slangekruid	e.a.vipérine		
Ephedra spp.	Ephedraceae		o.a. zeedruif	ephédra		
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.	Ranunculaceae		winterakoniet	eranthé d'hiver, hellébore d'hiver		
Erechtites spp.	Compositae					
Erythrina spp.	Brassicaceae		erythrina	erythrine		
Erythroxylum coca Lam.	Leguminosae		cocastruik	coca		
Euonymus atropurpureus Jacq.	Celastraceae		vuurkardinaalsmuts	fusain noir pourpré		
Euonymus europaeus L.	Celastraceae		wilde kardinaalsmuts	fusain d'europe		
Euphorbia spp.	Euphorbiaceae		o.a. wolfsmelk,	e.a. euphorbe		

			kerstster	panachée, poinsettia		
Tetradium rubicarpum (A.Juss.) T.G.Hartley	Rutaceae	Euodia rubicarpa (A. Juss.) Benth., Evodia rubicarpa (A.Juss.) Hook.f. & Thomson (A. Juss.) Benth				
Excoecaria agallocha L.	Euphorbiaceae					
Ficaria verna Huds.	Ranunculaceae	Ficaria renunculoïdes Monch.	speenkruid	renoncule ficaire, ficaire fausse-renoncule		
Forestiera spp.	Oleaceae					
Fritillaria imperialis L.	Liliaceae		keizerskroon	fritillaire impériale, couronne impériale		
Galanthus spp.	Amaryllidaceae		o.a. sneeuwklokje	e.a. perce-neige		
Galega officinalis L.	Leguminosae		galega	galéga, sainfoin d'Espagne	Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidinge n indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant de la

					dat galegine en/of peganine bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor galegine en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL waarde voor peganine.	galegine et/ou de la péganine, quelle que soit sa source, ne conduit pas, respectivement, à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de galéguine scientifiquement fondée et à la valeur DNEL de péganine scientifiquement fondée.
Garcinia hanburyi Hook. f.	Clusiaceae					
Geissospermum spp.	Apocynaceae					
Gelsemium spp.	Gelsemiaceae			jasmin jaune		
Genista tinctoria L.	Leguminosae		verfbrem	genêt des teinturiers		
Glechoma hederacea L.	Lamiaceae		hondsdrif	lierre terrestre		
Globularia alypum L.	Plantaginaceae		drietandkogelbloem	globulaire turbitt		
Globularia vulgaris L.	Plantaginaceae		gewone kogelbloem	globulaire commune		
Gloriosa superba L.	Colchicaceae		prachtlelie			
Gratiola officinalis L.	Plantaginaceae		genadekruid	gratiole		
Griffonia	Leguminosae	Bandeiraea	griffonia	griffonia		

simplicifolia (DC.) Baill.		simplicifolia (DC.) Benth.				
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.	Hypericaceae	Harunga madagascariensis L. (Lam. ex Poir.) Choisy	haronga boom	guttier du gabon		
Heimia spp.	Lythraceae					
Heliotropium spp.	Boraginaceae		heliotroop, zonnewende	héliotrope		
Helleborus spp.	Ranunculaceae		nieskruid, o.a. kerstroos	hellébore, e.a. rose de Noël		
Hepatica nobilis Mill. -	Ranunculaceae		leverbloempje	anémone hépatique		
Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier	Apiaceae		reuzenberenklauw	berce de caucase		
Hippomane mancinella L.	Euphorbiaceae		manchineel	mancenillier		
Homalomena spp.	Araceae					
Hura crepitans L.	Euphorbiaceae		zandkokerboom	arbre au diable, sablier blanc		
Hyacinthus orientalis L.	Asparagaceae		hyacint	jacinthe d'orient		
Hyoscyamus spp.	Solanaceae					
Ilex aquifolium L.	Aquifoliaceae		hulst	houx		
Illicium anisatum L.	Schisandraceae	Illicium religiosum Siebold et Zucc.	japanse steranijs	anis étoilé du japon		
Ipomoea spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3))	Convolvulaceae		pronkwinde	ipomée		
Iris spp.	Iridaceae		o.a. lis	iris		
Jatropha curcas L.	Euphorbiaceae		purgeernoot	médicinier, pourghère		

Juglans nigra L.	Juglandaceae		zwarte walnoot	noyer noir		
Juniperus sabina L.	Cupressaceae		sabijnse jeneverbess	genévrier sabine		
Kalmia latifolia L.	Ericaceae		lepelboom	laurier de montagne		
Laburnum anagyroides Medik.	Leguminosae	Cytisus laburnum L.	gewone goudenregen	cytise faux ébénier		
Lactuca virosa L.	Compositae		gifsla	laitue vireuse		
Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville	Papaveraceae		creosootstruik	créosotier		
Leopoldia comosa (L.) Parl.	Asparagaceae	Muscari comosum (L.) Mill.	kuifhyacint	muscardi à toupet		
Leucojum vernum L.	Amaryllidaceae		lenteklokje	niéole de printemps		
Ligustrum vulgare L.	Oleaceae		wilde liguster	troène commun		
Linaria vulgaris Mill.	Plantaginaceae		vlasbekje	linaire commune	Een afwijking kan worden gevraagd aan, en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidinge n indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat quinazoline alkaloïden bevat, ongeacht de bron	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes quinazoliniques, quelle que soit sa

					ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze quinazoline alkaloiden.	source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes quinazoliniques scientifiquement fondée.
Liriope spp.	Asparagaceae					
Lithospermum spp.	Boraginaceae		o.a. parelzaad	e.a. grémil		
Lobelia inflata L.	Campanulaceae		gezwollen lobelia	lobélie enflée		
Lonchocarpus spp.	Leguminosae					
Lonicera caprifolium L.	Caprifoliaceae		tuinkamperfoelie	chèvrefeuille des jardins		
Lupinus spp.	Cactaceae		lupine	lupin	Enkel de cultivars met lage gehalten aan alkaloiden van de planten Lupinus angustifolius L. en Lupinus albus L. kunnen worden toegelaten in voedingsmiddelen indien aangetoond werd dat het zaad en het meel van de planten maximum 200 mg/kg totaal alkaloiden en geen anagryne bevatten.	Seuls les cultivars à faible teneur en alcaloïdes des plantes Lupinus angustifolius L. et Lupinus albus L. peuvent être autorisés dans les denrées alimentaires s'il a été démontré que les graines et la farine des plantes contiennent au maximum 200 mg/kg d'alcaloïdes totaux et pas d'anagryne.

Lycoris spp.	Amaryllidaceae					
Lyonia spp.	Ericaceae					
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt	Asparagaceae		dalkruid	maianthème à deux feuilles		
Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae		kamalaboom	kamala, rottlière des teinturiers		
Mandragora officinarum L.	Solanaceae		alruin	mandragore officinale		
Meconopsis spp.	Papaveraceae		schijnpapaver			
Menispermum canadense L.	Menispermaceae		Canadees Maanzaad.	Ménisperme du Canada		
Mercurialis annua L.	Euphorbiaceae		tuinbingelkruid	mercuriale annuelle		
Mercurialis perennis L.	Euphorbiaceae		bosbingelkruid	mercuriale vivace		
Mesembryanthemum spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Aizoaceae		o.a. middagbloem, ijskruid	e.a. ficoïde glaciale		
Mimosa spp.	Leguminosae			mimosa		
Mosannonna depressa (Baill.) Chatrou	Annonaceae	Guatteria gaumeri Greenm.	yumel	yumel		
Mucuna pruriens (L.) DC.	Leguminosae	Dolichos pruriens L.			Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la

					dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat harmaan alkaloiden, levo-dopa, lectines en/of niet proteïnogene aminozuren bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze harmaan alkaloiden, de wetenschappelijk onderbouwde DNEL waarde voor levo-dopa, de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze lectines en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde	portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes de type harmane et/ou de la levo-dopa et/ou des lectines et/ou des acides aminés non protéinogènes, quelle que soit sa source, ne conduit pas, respectivement, à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes de type harmane scientifiquement fondée, à la valeur DNEL de levo-dopa scientifiquement fondée, à la valeur DNEL de (chacune de ou la plus toxique de) ces lectines scientifiquement fondée et à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces acides aminés non protéinogènes
--	--	--	--	--	---	---

					voor (elk van of de meest toxische van) deze niet proteïnogene aminozuren.	scientifiquement fondée.
Myoporum laetum G. Forst.	Scrophulariaceae		Ngaio boom	Arbre Ngaio		
Narcissus spp.	Amaryllidaceae		witte narcis, dichtersnarcis	narcisse des poètes		
Nerium spp.	Apocynaceae		oleander	laurier-rose		
Nicotiana spp.	Solanaceae		o.a. tabak	tabac		
Nigella damascena L.	Ranunculaceae		juffertje-in-'t-groen	nigelle de damas		
Nymphaea alba L.	Nymphaeaceae		witte waterlelie	nymphéa blanc		
Nymphaea odorata Ait.	Nymphaeaceae		geurende waterlelie	nymphéa odorants		
Ochrosia spp.	Apocynaceae					
Ophioglossum vulgatum L.	Ophioglossaceae		addertong	ophioglosse commun, ophioglosse vulgaire, langue de serpent, ophioglosse des alpes, herbe sans couture	Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat ptaquiloside bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant du ptaquiloside, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la

					de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor ptaquiloside.	valeur DNEL de ptaquiloside scientifiquement fondée.
Ornithogalum spp.	Asparagaceae		vogelmelk	ornithogale		
Orobanche spp.	Orobanchaceae		bremraap	orobanche		
Oxalis spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Oxalidaceae		klaverzuring	oxalide, oxalis		
Paeonia spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Paeoniaceae		pioen	pivoine		
Papaver somniferum L.	Papaveraceae		slaapbol, papaver, maankop	pavot officinal	Het zaad (maanzaad) mag verkocht worden aan de eindverbruiker of mag gebruikt worden op of in bakkerijproducten indien het voedingsmiddel voldoet aan de bepalingen van sectie 2.5 (opiumalkaloïden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen	La graine (graine de pavot) peut être vendue au consommateur final ou être utilisée sur ou dans des produits de boulangerie si la denrée alimentaire est conforme aux dispositions de la section 2.5 (alcaloïdes opioïdes) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains

					in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006	contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006
Paris quadrifolia L.	Melanthiaceae		eenbes	parisette		
Parthenocissus quinquefolia (L.)	Vitaceae		vijfbladige wingerd	vigne vierge		
Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
Peganum harmala L.	Nitrariaceae		harmala	harmal		
Petasites spp.	Compositae		hoefblad	pétasite		
Petunia violacea Lindl.	Solanaceae					
Pfaffia spp.	Amaranthaceae					
Philodendron spp.	Araceae					
Physostigma venenosum Balf.	Leguminosae		calabarbonen	fèves de calabar		
Phytolacca spp.	Phytolaccaceae		karmozijnbes	phytolaque		
Pieris formosa (Wall.) D. Don	Ericaceae			Piérís andromède		
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don Murr.	Ericaceae			Andromède du Japon		
Pilocarpus spp.	Rutaceae					
Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb	Araceae		Driebladige pinellia	Pinellia	Een afwijking voor het gebruik van de wortel kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie	Une dérogation pour l'utilisation de la racine peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis

					van advies voor planten-bereidingen indien het dossier middels analyse aantoonst dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat 3,4-dihydroxybenzaldehyde en/of pinelline bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor 3,4-dihydroxybenzaldehyde en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor pinelline. De voorwaarde tot analyse vervalt indien kan worden aangetoond dat de bereiding volledig conform de methode volgens de Chinese	des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant du 3,4-dihydroxybenzaldehyde et/ou de la pinelline, quelle que soit sa source, ne conduit pas, respectivement, à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de 3,4-dihydroxybenzaldehyde scientifiquement fondée et à la valeur DNEL de pinelline scientifiquement fondée. Les analyses ne sont pas nécessaires s'il peut être démontré que la préparation est réalisée en suivant en tout point la méthode de la pharmacopée chinoise.
--	--	--	--	--	--	--

					Pharmacopée wordt uitgevoerd.	
Piper methysticum Forster f.	Piperaceae		kava, kawa	kava, kawa		
Piscidia piscidula (L.) Sarg.	Leguminosae	Piscidia erythrina (Loefl.) L.	piscidia	piscidie		
Podophyllum peltatum L.	Berberidaceae		Voetblad, eendevoet	podophyllée pelté		
Poncirus trifoliata (L.) Raf.	Leguminosae		driebladcitrus	oranger trifolié		
Psoralea spp.	Rubiaceae					
Psychotria viridis Ruiz. Et Pav.	Dennstaedtiaceae		Chacrana	Sami Ruca		
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.	Olacaceae		adelaarsvaren	fougère-aigle		
Ptychopetalum spp.	Ericaceae					
Pyrularia pubera Michx.	Santalaceae		buffelnoot			
Quassia spp.	Simaroubaceae					
Quillaja saponaria Molina. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Quillajaceae		zeephoutboom	bois de panama, quillaia		
Ranunculus spp.	Ranunculaceae		boterbloem	renoncule		
Rauvolfia spp.	Apocynaceae					
Rhododendron spp.	Ericaceae		rododendron	rhododendron		
Rhodomyrtus spp.	Myrtaceae					
Rhus spp.	Anacardiaceae		sumak	sumac		
Rhus aromatica Aiton	Anacardiaceae		welriekende sumac	rhus aromatique	Enkel het gebruik van kleine niet-	Seule l'utilisation de petites

					geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae		sumak	sumac, sumac des corroyeurs, vinaigrier	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
<i>Rhus glabra</i> L.	Anacardiaceae		gladde sumak	sumac à bois glabre	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations culinaires.
<i>Rhynchosia</i> spp.	Leguminosae					
<i>Richardia scabra</i> L.	Rubiaceae		valse ipecacuanha	faux ipéca		
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae		wonderboom	ricin commun		
<i>Rivina humilis</i> L.	Phytolaccaceae					
<i>Roemeria hybrida</i> L. DC.	Papaveraceae					
<i>Rubia tinctorum</i> L.	Rubiaceae		meekrap	garance des teinturiers		
<i>Ruta</i> spp.	Rutaceae					
<i>Salvia divinorum</i> Epling & Játiva	Lamiaceae		centraal Amerikaanse	sauge des aztèques		

			salie			
Sanguinaria canadensis L.	Papaveraceae		bloedwortel	sanguinaire du canada		
Sansevieria spp.	Asparagaceae		vrouwentongen	sansevière		
Santalum album L.	Santalaceae		sandelboom	Santal blanc, sandal		
Sassafras albidum (Nutt.) Nees	Lauraceae	Sassafras officinale T. Nees & C.H. Eberm.	Sassafrashout	bois de sassafras		
Saussurea spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Compositae					
Schefflera spp.	Araliaceae					
Schinus molle L.	Anacardiaceae		peruviaanse peperboom	faux poivrier	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
Schinus terebinthifolius Raddi.	Anacardiaceae		braziliaanse peperboom	baies roses, poivre rose	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij keukenbereidingen.	Seule l'utilisation de petites quantités non concentrées de fruits est autorisée pour les préparations de cuisine.
Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A.Gray	Melanthiaceae	Sabadilla officinalis (Schltdl. & Cham.) Standl. Brandt. Et Ratzeb.	Sabadilkruid	cévadille		

Scindapsus spp.	Araceae					
Scopolia spp.	Solanaceae					
Scrophularia spp. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Scrophulariaceae		helmkruid	scrofulaire		
Scutellaria baicalensis Georgi (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Lamiaceae		Baikalglidkruid	Scutellaire du lac Baïkal	Het gebruik van de wortel afkomstig van deze plant is toegelaten in voedingsmiddelen.	L'utilisation de la racine provenant de cette plante est autorisée dans les denrées alimentaires.
Scutellaria lateriflora L. (zie ook lijst 3/voir aussi liste 3)	Lamiaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidinge n indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat furano neoclerodanen bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des furano néoclérodanes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces furano néoclérodanes

					meest toxische van) deze furano neoclerodanen. De voorwaarde tot analyse vervalt indien door een botanisch certificaat wordt aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	scientifiquement fondée. Les analyses ne sont pas nécessaires s'il peut être démontré par un certificat botanique que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Scutellaria spp.	Lamiaceae		blauw glidkruid	scutellaire toque		
Securigera varia (L.) Lassen	Leguminosae	Coronilla varia L.	bont kroonkruid	coronille bigarrée		
Senecio spp.	Compositae		kruiskruid	séneçon		
Sesbania spp.	Leguminosae					
Sida cordifolia L.	Malvaceae		bala	bala		
Sida rhombifolia L.	Malvaceae					
Simarouba amara Aubl.	Simaroubaceae					
Solandra grandiflora Sw.	Solanaceae			liane trompette		
Solanum americanum Mill.	Solanaceae		Amerikaanse zwarte nachtschade,	morelle noire d'Amérique		
Solanum nigrum L.			Zwarte nachtschade	morelle noire		
Solanum dulcamara L.	Solanaceae		bitterzoet	douce-amère, morelle douce-amère		
Solenostemma argel (Delile) Hayne	Apocynaceae					
Sorbus domestica	Rosaceae		peervormigelijste	cormier, sorbier	Een afwijking kan	Une dérogation

L.			rbes	domestique	worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat parasorbinezuur bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor parasorbinezuur. De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant de l'acide parasorbique, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de l'acide parasorbique scientifiquement fondée. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalents de cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Spartium junceum L.	Leguminosae		spaanse brem	genêt d'espagne		

Spathiphyllum spp.	Araceae					
Spigelia anthelmia L.	Loganiaceae			spigélie vermifuge		
Spigelia marilandica (L.) L.	Loganiaceae					
Sprekelia spp.	Amaryllidaceae		goudlelie	e.a. croix de saint-jacques		
Stephanotis spp.	Apocynaceae		bruidsbloem	jasmin de madagascar		
Sternbergia spp.	Amaryllidaceae					
Strophanthus spp.	Apocynaceae					
Strychnos spp.	Loganiaceae					
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake	Caprifoliaceae		sneeuwbes	symphorine		
Symphytum spp.	Boraginaceae		smeerwortel	consoude		
Tabebuia spp.	Bignoniaceae					
Tabernanthe iboga Baill.	Apocynaceae		ibogo	iboga		
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip	Compositae	Chrysanthemum cinerariifolium (Trevir) Vis.	dalmatisch vlooienkruid	pyrèthre		
Taxus spp.	Taxaceae		taxus	if		
Tephrosia spp.	Leguminosae					
Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast.	Cupressaceae	Callitris quadrivalvis Vent. Callitris quadrivalvis Rich. & A.Rich.	sandarak, kamercipres	sandaraque, thuja de Barbarie		
Teucrium chamaedrys L.	Lamiaceae		echte gamander	germandrée petit-chêne		
Teucrium polium L.	Lamiaceae			germandrée tomenteuse		

Thevetia spp.	Lamiaceae		o.a. gele oleander	e.a. laurier-rose jaune		
Thuja occidentalis L.	Apocynaceae		westerse levensboom	thuya d' occident		
Trichocereus spp.	Cactaceae					
Trichodesma incanum Bunge	Boraginaceae					
Trollius europaeus L.	Ranunculaceae		europese trollius	trolle d' europe		
Tulipa spp.	Liliaceae		tulp	tulipe		
Turbina corymbosa (L.) Raf.	Convolvulaceae					
Tussilago spp.	Compositae		klein hoefblad	tussilage		
Tylophora asthmatica Wight et Arn.	Apocynaceae			asmatica, faux- ipeca		
Urginea spp.	Asparagaceae		zeeajuin	scille maritime		
Veratrum spp.	Melanthiaceae		nieswortel	vératre		
Viburnum prunifolium L.	Adoxaceae		amerikaanse sneeuwbal	viorne à feuilles de prunier		
Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Apocynaceae	Vincetoxicum officinale Moench	witte engbloem	dompte-venin		
Wikstroemia spp.	Thymelaeaceae					
Wisteria floribunda (Willd.) DC.	Leguminosae		japanse blauweregen	glycine du japon		
Wisteria sinensis (Sims) Sweet.	Leguminosae		chinese blauweregen	glycine de chine		
Xysmalobium undulatum (L.) R. Br.	Apocynaceae		uzara	uzara		
Zanthoxylum acanthopodium DC.	Rutaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt	Une dérogation peut être demandée et est

					beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes scientifiquement fondée.
Zanthoxylum americanum Mill.	Rutaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini

					het eindproduct dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	contenant des alcaloïdes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes scientifiquement fondée.
Zanthoxylum armatum DC.	Rutaceae	Zanthoxylum alatum Roxb.	geelhout	zanthoxylle	Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde	Une dérogation peut être demandée et est évaluée par la Commission d'avis des préparations de plantes si le dossier démontre au moyen d'analyse que la portion journalière recommandée du produit fini contenant des alcaloïdes, quelle que soit sa source, ne conduit pas à une ingestion supérieure à la valeur DNEL de (chacun de ou le plus toxique de) ces alcaloïdes

					voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	scientifiquement fondée.
Zigadenus spp.	Melanthiaceae		alkaligras	cannash		

Lijst 2: Eetbare paddenstoelen

Deel 1: Gekweekte eetbare paddenstoelen

Liste 2: Champignons comestibles

Partie 1: Champignons comestibles cultivés

Nom scientifique Wetenschappelijke naam	Famille Familie	Synoniem Synonyme	Nom néerlandais Nederlandse naam	Nom français Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
Agaricus arvensis Sch.: Fr.	Agaricaceae		Anijschampignon	Agaric des jachères		
Agaricus bisporus (Lange) Sing. var. Albidus (Lange) Sing.	Agaricaceae		Gekweekte champignon	Agaric bispore, Champignon de Paris, variété blanche		
Agaricus bisporus (Lange) Sing. var. Avellanuss Lange) Sing.	Agaricaceae		Kastanjechampignon	Agaric bispore, Champignon de (Paris, variété blonde)		
Agaricus bitorquis (Quélet) Saccardo	Agaricaceae		Straatchampignon	Psalliotte des trottoirs		
Agaricus campestris L.: Fr.	Agaricaceae		Weidechampignon	Agaric des jachères		
Agaricus silvicola (Vitt.) Peck	Agaricaceae		Slanke anijschampignon	Agaric sylvicole		
Agaricus subrufescens Peck	Agaricaceae	Agaricus blazei Murill	Amandelpaddenstoel	Agaric auguste		
Agrocybe cylindracea (DC.: Fr.) Maire	Bolbitiaceae		Populierleemhoed	Pholiote du Peuplier, Pivoulade		
Boletus aereus Bull. ex Fr.	Boletaceae		Bronskleurig eekhoortjesbrood	Cèpe bronzé, Tête-de-nègre		
Boletus reticulatus Schaeff.	Boletaceae	Boletus aestivalis (Paulet) Fr.	Vroeg eekhoortjesbrood	Cèpe d'été		

Boletus rex-veris D. Arora & Simonini	Boletaceae			Cèpe Roi du printemps		
Coprinus comatus (Müll.:Fr.) Pers.	Agaricaceae		Geschubde inktzwam	Coprin chevelu		
Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.	Ophiocordycipitaceae	Paecilomyces hepiali Q.T. Chen & R.Q. Dai Ophiocordyceps sinensis			Enkel het gebruik in voedingssupplementen is toegelaten.	Seule l'utilisation dans les compléments alimentaires est autorisée.
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer	Physalacriaceae		Fluweelpootje	Collybie à pied velouté		
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.	Ganodermataceae		Gesteelde lakzwam	Ganoderma, Bois de Cerf, Ganoderme luisant		
Ganoderma tsugae Murr.	Ganodermataceae					
Grifola frondosa (Dicks.) Gray	Meripilaceae		Eikhaas	Poule de bois, Polypore en touffes		
Grifola umbellata (Pers.) Pilat	Meripilaceae		Schermpjeseikhaas			
Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kummer	Strophariaceae		Dennezwavelkop	Hypholome doux		
Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers.	Hericiaceae		Pruikzwam	Hydne hérisson		
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae		Judasoor	Oreille de Judas		
Hypsizygus tessulatus (Bull.: Fr.) Sing.	Lyophyllaceae		Buna Shimeji	Buna Shimeji		
Hypsizygus ulmarius (Bull.: Fr.) Kühner	Lyophyllaceae		Iepenzwam	Lyophylle de l'Orme		
Laetiporus sulphureus	Fomitopsidaceae		Zwavelzwam	Polypore souffré		

(Bull.: Fr.) Murrill	e					
Lasiosphaeria gigantea Batch Ex Pers.	Lasiosphaeriaceae					
Lentinula edodes (Berk.) Pegler	Marasmiaceae		Shiitake	Shiitake	De consumptie van rauwe of licht gekookte Shiitake kan leiden tot huidreacties. Het is aanbevolen om de Shiitake ongeveer 20 minuten te koken voor consumptie of het te verwarmen tot een temperatuur van 130 - 150 °C. De gedroogde paddenstoelen zouden voldoende moeten worden gehydrateerd vóór het koken	La consommation de Shiitake cru ou peu cuit peut provoquer des réactions cutanées. Il est recommandé de cuire le shiitake pendant environ 20 minutes avant de le consommer ou de le chauffer à une température de 130 à 150 °C. Les champignons séchés doivent être suffisamment hydratés avant la cuisson.
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke	Tricholomataceae		Paarse schijnridder	Pied bleu		
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser	Agaricaceae		Blanke Parasolzwam	Lépiote pudique		
Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo	Lyophyllaceae		Hon-Shimeji	Hon-Shimeji		

Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae		Gewone morielje	Morille commune		
Pholiota mutabilis (Scop.: Fr.) Kumm. Smith & Singer	Strophariaceae		Kleine bundelzwam	Pholiote changeante		
Pholiota nameko (I. Ito) S. Ito & Imai	Strophariaceae		Nameko	Naméko		
Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae		Trechteroesterzwam	Pleurote corne, Rolland d'abondance		
Pleurotus citrinopileatus Singer	Pleurotaceae		Goudkleurige oesterzwam	Pleurote jaune		
Pleurotus colombinus	Pleurotaceae					
Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.)	Pleurotaceae		Trechteroesterzwam	Pleurote corne, Rolland d'abondance		
Pleurotus cystidiosus O.K. Miller	Pleurotaceae					
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae		Kruisdisteloesterzwam	Pleurote du Panicaud		
Pleurotus flabellatus (M.J. Berk & Broome) Sacc.	Pleurotaceae					
Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) P. Kumm	Pleurotaceae		Gewone oesterzwam	Pleurote en huitre		
Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quélet	Pleurotaceae		Bleke oesterzwam	Pleurote pulmonaire		
Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer	Pleurotaceae					
Pleurotus salmoneostramineus Vassil	Pleurotaceae		Zalmoesterzwam	Pleurote saumon		
Pleurotus sp. Florida (Eger)	Pleurotaceae		Floridazwam	Pleurote de Floride		
Polyporus umbellatus	Polyporaceae		Schermpjeseikhaas	Polypore en		

(Pers.) Fr.				ombelle		
Stropharia rugosoannulata Murrill	Strophariaceae		Blauwplaatstropharia	Strophaire à anneau rugueux		
Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Singer	Pluteaceae		Rijststrozwam, Tropische beurszwam	Volvaire cultivée		

De paddenstoelen vermeld in deel 2 van lijst 2 in de mate dat ze kunnen geteeld worden en voor menselijke consumptie geschikt blijven.

Les champignons repris dans la partie 2 de la liste 2 dans la mesure où ils peuvent être cultivés et restent propres à la consommation humaine

Deel 2: Wilde paddenstoelen die mogen in de handel gebracht worden in zoverre de reglementering van bedreigde soorten dat toelaat

Partie 2: Champignons sauvages qui peuvent être mis dans le commerce pour autant que la réglementation pour la conservation des espèces menacées le permette

Nom scientifique Wetenschappelijke naam	Familie Familie	Synoniem Synonyme	Nom néerlandais Nederlandse naam	Nom français Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limites et conditions
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.	Agaricaceae		Straatchampignon	Psalliotte des trottoirs		
Agaricus campestris L.: Fr.	Agaricaceae		Weidechampignon	Agaric champêtre		
Agrocybe cylindracea (DC.: Fr.) Maire	Bolbitiaceae		Populierleemhoed	Pholiote du jeuplier; Pivoulade		
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck.	Pyronemataceae		Grote oranje bekerzwam	Pézize orangée		
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F. Gray	Amanitaceae		Parelamaniet	Amanite rougissante; Golmotte		
Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kummer s.l.	Physalacriaceae		Honingzwam s.l.	Armillaire couleur de miel		

				s.l.		
Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.	Auriculariaceae		Judasoor	Oreille de Judas		
Boletus badius non sensu Persoon	Boletaceae	Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert	Kastanjeboleet	Bolet bai		
Boletus edulis Bull.: Fr.	Boletaceae		Eekhoortjesbrood	Cèpe de Bordeaux		
Boletus erythropus Pers.	Boletaceae		Gewone heksenboleet	Bolet à pied rouge		
Bovista plumbea Pers.	Agaricaceae		Loodgrijze bovist	Boviste plombée	Enkel het gebruik van het vruchtlichaam is toegelaten.	Seule l'utilisation du sporophore est autorisée.
Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer	Lyophyllaceae		Voorjaarspronkridder	Tricholome de la Saint-Georges; Mousseron		
Cantharellus cibarius Fr.: Fr.	Cantharellaceae		Hanekam; Dooierzam; Cantharel	Chanterelle orangée		
Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr.	Cantharellaceae		Trechtercantharel	Chanterelle en tube		
Coprinus comatus (Müll.: Fr.) S.F. Gray	Agaricaceae		Geschubde inktzwam	Coprin chevelu		
Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers.	Cantharellaceae		Hoorn-van-overvloed	Trompette de la mort		
Disciotis venosa (Pers.: Fr.)	Morchellaceae		Grote aderbekerzwam	Pézize veinée		
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer	Physalacriaceae		Fluweelpootje	Collybie à pied velouté		
Hydnum repandum L.: Fr.	Hydnaceae		Gele stekelzwam	Pied de mouton		
Hygrophoropsis aurantiaca(Wlf.: Fr.)	Hygrophoropsidaceae		Valse cantharel	Fausse girolle		

Maire						
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke	Hydnangiaceae		Amethistzwam; Rode koolzwam	Laccaire améthyste		
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke	Hydnangiaceae		Fopzwam	Laccaire laqué		
Lactarius deliciosus (L.:Fr.) Gray	Russulaceae		Oranjegroene melkzwam	Lactaire délicieux		
Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk.	Agaricaceae		Reuzenbovist	Vesse-de-loup géante		
Lepista inversa (Scop.) Pat.	Tricholomataceae		Roodbruine trechterzwam	Clitocybe inversé		
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke	Tricholomataceae		Paarse schijnridderzwam	Pied bleu		
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser	Agaricaceae	Lepiota naucina	Blanke parasolzwam	Lepiote pudique		
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer	Agaricaceae		Grote parasolzwam	Coulemelle, Lépiote élevée		
Marasmius oreades (Balt.: Fr.) Fr.	Marasmiaceae		Weidekringzwam	Marasme des Oréades; Faux mousseron		
Morchella angusticeps Peck	Morchellaceae			Morille		
Morchella elata Fr.: Fr.	Morchellaceae		Kegelmorielje	Morille conique		
Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers.	Morchellaceae		Gewone morielje	Morille commune		
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer	Pleurotaceae		Gewone Oesterzwam	Pleurote en forme d'huître		
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.	Russulaceae		Regenboogrussula	Russule charbonnière		
Russula vesca Fr.	Russulaceae		Smakelijke russula	Russule comestible		
Russula virescens (Schaeff.) Fr.	Russulaceae		Ruwe russula	Russule verdoyante; Palomet		

Suillus granulatus (L.) O. Kuntze	Suillaceae		Melkboleet	Bolet granulé		
Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Singer	Suillaceae		Gele ringboleet	Bolet élégant		
Suillus luteus (L.: Fr.) S.F. Gray	Suillaceae		Bruine ringboleet	Bolet jaune		
Tremella fuciformis Berk.	Tremellaceae		Witte trilzwam	Trémelle blanche		
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken	Tricholomatacea e		Matsu-take	Matsutake		
Tricholoma populinum	Tricholomatacea e		Lange Populieridderzwam	Tricholome des peupliers		
Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quélet	Tricholomatacea e		Glanzende ridderzwam	Tricholome prétentieux		
Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer	Tricholomatacea e		Donkergrijze ridderzwam	Tricholome terreux; Petit- gris		
Tuber aestivum Vitt.	Tuberaceae		Zomertruffel	Truffe d'été		
Tuber magnatum Pico sp.	Tuberaceae		Witte truffel	Truffe blanche		
Tuber melanosporum Vitt.	Tuberaceae		Perigordtruffel	Truffe du Périgord		
Tuber indicum Cooke & Massee	Tuberaceae		Chinese of Aziatische truffel	Truffe chinoise ou asiatique		
Tuber uncinatum Chatin	Tuberaceae		Bourgognetruffel	Truffe de Bourgogne		
Wolfiporia extensa (Peck) Ginns	Fomitopsidaceae	Poria cocos Wolf		Pachyme	Enkel het gebruik van het sclerotium is toegelaten.	Seule l'utilisation du sclérote est autorisée.

Lijst 3: Te notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm

Liste 3: Plantes à notifier si sous forme prédosée

Botanische naam / Nom botanique	Familie / Famille	Synoniem / Synonyme	Naam	Nom	Toegelaten plantendeel of specifieke bereiding	Parties de plante autorisée ou préparation particulière	Voorwaarden	Conditions
Abelmoschus esculentus (L.) Moench	Malvaceae		oker, okra	okra, gombo, cabo, calou	vrucht	fruit		
Abelmoschus moschatus Medik.	Malvaceae		ambrettezaad, muskuszaad	ambrette	zaad	graine		
Abies alba Mill.	Pinaceae		gewone zilverspar, grote spar, zilverspar	sapin pectiné, sapin blanc, sapin argenté	schors, tak, naald, knop, zaad, hars	écorce, rameau, aiguille, bourgeon, graine, résine		
Abies balsamea (L.) Mill.	Pinaceae		balsemspar, canadabalsem	sapin baumier	schors, naald, hars, twijg	écorce, aiguille, résine, brindille		
Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode &	Pinaceae	Abies pectinata Dc. Var. Equi-Trojani Asch. & Sint. Ex Boiss	nordmann-spar, kaukasische spar, krimspar	sapin de nordmann, sapin du caucase, sapin de crimée	schors, naald	écorce, aiguille		

Cullen								
Abies sibirica Ledeb.	Pinaceae		siberische zilverden	sapin de sibérie	schors, tak, naald, hars	écorce, rameau, aiguille, résine		
Abroma augusta L. f	Malvaceae				wortelschors	écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Acacia catechu (L.f.) Willd.	Leguminosae			acacia à cachou, cachoutier	gom	gomme		
Acacia decurrens Willd.	Leguminosae				gom	gomme		
Acacia	Leguminosae	Acacia	echte acacia,	acacia du nil	schors,	écorce,		

nilotica (L.) Delile	e	arabica (Lam.) Willd.	gom-acacia		vrucht, gom	fruit, gomme		
Acacia senegal (L.) Willd.	Leguminosa e		arabische gom	gommier blanc, acacia sénégal	schors, gom	écorce, gomme		
Acacia seyal Delile	Leguminosa e				gom	gomme		
Acanthus mollis L.	Acanthacea e		stekelige berenklauw	acanthé molle, acanthé à feuilles larges	hele plant	plante entière		
Acer campestre L.	Sapindacea e		Spaanse aak, veldesdoorn	Érable champêtre	knop	bourgeon	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n hypoglycine s bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycine s.
Acer negundo L.	Sapindacea e		vederesdoorn	érable negundo, érable négondo, érable à giguère, érable à feuilles de frêne, érable américain	schors	écorce	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n hypoglycine s bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycine s.

Acer saccharinum L.	Sapindaceae		witte esdoorn of zilveresdoorn	érable argenté, érable de virginie, plaine blanche	bast, hout	liber, bois	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n hypoglycine s bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en hypoglycine s.
Achillea ageratum L.	Compositae			achillée à feuilles d'agératum, achillée visqueuse	bovengron dse delen	parties aériennes		
Achillea atrata L.	Compositae		dofzwart duizendblad	achillée noirâtre	bovengron dse delen	parties aériennes		
Achillea erba-rotta All.	Compositae			achillée à feuilles simples	bovengron dse delen	parties aériennes		
Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) I.Richardson	Compositae		duizendblad, hemdsknoopj es, muskusduize ndblad	achillée musquée	bovengron dse delen	parties aériennes		
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo	Compositae	Diotis candidiss ima Desf., Otanthus maritimu s (L.) Hoffmann s & Link			bovengron dse delen	parties aériennes		

Achillea millefolium L.	Compositae		gewoon duizendblad	achillée millefeuille	bovengron dse delen	parties aériennes		
Achillea nana L.	Compositae		wilde bertram	achillée naine	bovengron dse delen	parties aériennes		
Achillea ptarmica L.	Compositae		wilde bertram	achillée sternutatoire	bovengron dse delen	parties aériennes		
Achyranthes bidentata Blume	Amaranthaceae		dubbelgetande amarant	achyranthes bidentata blume	wortel	racine		
Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen	Compositae		parakres, kiespijnknop penkruid, braziliaanse cresson	cresson de para, brède mafane	bovengron dse delen	parties aériennes		
Acorus calamus L.	Acoraceae		kalmoes, echte kalmoes	acore, acore odorant, acore vrai	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van beta-asarone hoger dan 115 µg en 2 µg/kg lichaamsgewicht. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de bêta-asarone supérieure à 115 µg et 2 µg/kg poids corporel. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

							tijdens de zwangersch ap.	
Actaea heracleifolia (Kom.) J.Compton	Ranunculac eae	Cimicifug a heracleif olia Kom.	zilverkaars		wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperio de. Niet gebruiken bij leveraandoe ningen.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome seché. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommati on. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.
Actaea racemosa L.	Ranunculac eae	Cimicifug a	zwarte amerikaanse	actée américaine,	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen	La portion journalière

		racemosa (L.) Nutt.	slangenwortel	cimicifuge			dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperio de. Niet gebruiken bij lever- aandoeninge n.	recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 30 mg de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Consultez votre médecin sur l'utilisation et la durée de consommati on. Ne pas utiliser en cas de maladie du foie.
Actinidia chinensis Planch.	Actinidiace ae		kiwi, chinese kruisbes	kiwi, groseille de chine	vrucht, knop	fruit, bourgeon		
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang &	Actinidiace ae		kiwi	kiwi	vrucht, knop	fruit, bourgeon		

A.R.Ferguson								
Adansonia digitata L.	Malvaceae		baobab	baobab, pain de singe	vrucht	fruit		
Adiantum capillus-veneris L.	Pteridaceae		europes venushaar	capillaire, cheveux de vénus	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Adiantum pedatum L.	Adiantaceae		hoefijzervaren	adiante du canada, capillaire du canada, adiante pédalée	hele plant gekookt of gedroogd	plante entière cuite ou séchée	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas

							gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Adoxa moschatellina L.	Adoxaceae		muskuskruid	petite musquée	hele plant	plante entière		
Aegopodium podagraria L.	Apiaceae		zevenblad	égopode podagraire, herbe aux goutteux, podagraire	blad	feuille		
Aesculus hippocastanum L.	Hippocastanaceae		witte paardekastanje	marronnier commun, marronnier d'inde	zaad, bladknop	graine, bourgeon de feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van aescine hoger dan 75 mg. De analysesresultaten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'aescine supérieure à 75 mg. Les résultats d'analyse

							moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum.	Zingiberaceae	Amomum angustifolium Sonn.	madagascar cardamom	maniguette fine, cardamom de Madagascar	vrucht, zaad	fruit, graine		
Aframomum exscapum (Sims) Hepper	Zingiberaceae				vrucht, zaad	fruit, graine		
Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans	Rutaceae	Barosma betulina (P.J.Bergius) Bartl. et H.L. Wendl.	bucco, boechoe	buchu	blad	feuille		
Agathosma crenulata (L.) Pillans	Rutaceae	Barosma crenulata (L.) Hook., Barosma serratifolia (Curtis) Willd.	eironde buchu		blad	feuille		
Agathosma serratifolia (Curtis) Spreeth	Rutaceae				blad	feuille		
Agave americana L.	Asparagaceae		honderdjarige aloë	agave américain, agave d'amérique	bloemstengel	tige florale		
Agave	Asparagaceae		sisal	sisal	bloemstengel	tige		

sisalana Perrine	ae				gel, wortel	florale, racine		
Agave tequilana F.A.C. Weber	Asparagace ae		blauwe agave	agave bleu	bloemsten gel, blad	tige florale, feuille		
Agrimonia eupatoria L.	Rosaceae		gewone agrimonie	aigremoine eupatoire	hele plant	plante entière		
Agrimonia repens L.	Rosaceae	Agrimoni a odorata Mill.	welriekende agrimonie	aigremoine odorante	bovengron dse delen	parties aériennes		
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.	Lamiaceae		akkerzenegro en	bugle petit pin, d'ive ou d'ivette	bovengron dse delen	parties aériennes		
Ajuga iva (L.) Schreb.	Lamiaceae			ivette musquée, germandrée musquée, bugle fausse ivette	bovengron dse delen	parties aériennes		
Ajuga reptans L.	Lamiaceae		kruipend zenegroen	bugle rampante	bovengron dse delen	parties aériennes		
Albizia julibrissin Durazz.	Leguminosa e		perzische slaapboom, zijdeboom	acacia de constantinopl e, arbre de soie	schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Alcea rosea L.	Malvaceae	Althaea rosea (L.) Cav	stokroos	passe-rose, passerose, rose trémière	bloem	fleur		

Alchemilla vulgaris L.	Rosaceae	Alchemilla xanthochlora Rothm.	spitslobbige vrouwemantel	alchémille à lobes aigus	hele plant	plante entière		
Alisma plantago-aquatica L.	Alismataceae		grote waterweegbreed	plantain d'eau commun	wortel	racine		
Alisma plantago-aquatica subsp. orientale (Sam.) Sam.	Alismataceae	Alisma orientale (Sam.) Juz.	waterweegbreed	plantain d'eau	wortelstok, knol	rhizome, tubercule		
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	Sisymbrium alliaria (L.) Scop.	look-zonderlook	alliaire, herbe à ail	hele plant	plante entière		
Allium ampeloprasum L.	Amaryllidaceae	Allium porrum L.	oerprei	Poireau d'été	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Allium ascalonicum L.	Amaryllidaceae		sjalot	échalote, échalotte	bol	bulbe	De etikettering moet de	L'étiquetage doit comporter

							volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Allium cepa L.	Amaryllidaceae		ui	oignon	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Allium sativum L.	Amaryllidaceae		knoflook	ail cultivé	bol	bulbe	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien

							bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants.
Allium schoenopras um L.	Amaryllidac eae		bieslook	ciboulette	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants.
Allium ursinum L.	Amaryllidac eae		daslook	ail des ours	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants.
Alnus glutinosa	Betulaceae		zwarte els	aulne noir, aulne	schors, bladknop,	écorce, bourgeon		

(L.) Gaertn.				glutineux, aulne commun	blad, gom	de feuille, feuille, gomme		
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Betulaceae		grauwe els, witte els, grijze els	aulne blanc, aulne rugueux, aulne de montagne, arcoce, varne	schors, bladknop	écorce, bourgeon de feuille		
<i>Aloe africana</i> Mill.	Xanthorrhoeaceae				blad, gel, latex (sap)	feuille, gel, latex (jus)	Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances

							stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	aux denrées alimentaires . L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.
Aloe arborescens Mill.	Xanthorrhoeaceae		kandelaaraloe	aloès arborescent	blad, gel	feuille, gel	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant

							de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires . L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.
Aloe ferox Mill.	Xanthorrhoeaceae		kaapse aloë	aloès	blad	feuille	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006

							van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires . L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.
Aloe perryi Baker	Xanthorrhoeaceae				blad, gel	feuille, gel	Het voedings-supplement dient te	Le complément alimentaire doit être

							voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding	conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires . L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin en
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							g uw arts raadplegen.	cas de grossesse ou d'allaitement.
Aloe plicatilis (L.) Mill.	Xanthorrhoeaceae		waaieraalwijn, waaieraloë	aloès éventail	blad, gel	feuille, gel	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. L'étiquetage doit

							volgende waarschuwi ngen bevatten : Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen.	comporter les avertisseme nts suivants : Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitemen t.
Aloe vera (L.) Burm. f.	Xanthorrhoeaceae	Aloe barbadensis Mill.	echte aloë	aloès	blad	feuille	Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de

							mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	certaines autres substances aux denrées alimentaires . L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.
Aloysia citriodora Palau	Verbenaceae	Lippia citriodora (Lam.) Kunth, Aloysia triphylla (L'Hér) Britton	geurig ijzerhard, citronelle	verveine odorante, verveine citronnée, citronelle verveine	blad	feuille		
Alpinia galanga (L.) Willd.	Zingiberaceae		grote galgant	grand galanga	wortelstok	rhizome		
Alpinia hainanensis K.Schum.	Zingiberaceae	Alpinia katsumadae Hayata			hele plant	plante entière		
Alpinia officinarum	Zingiberaceae		kleine galgant	petit galanga	wortelstok	rhizome		

Hance								
Alpinia oxyphylla Miq.	Zingiberaceae				vrucht, wortelstok	fruit, rhizome		
Althaea officinalis L.	Malvaceae		echte heemst, witte malve, witte maluw	guimauve officinale, mauve blanche, bourbon de saint-jacques	hele plant	plante entière		
Amaranthus caudatus L.	Amaranthaceae		kattenstaartamarant	amarante queue de renard, amarante caudée	blad, zaad	feuille, graine		
Amaranthus cruentus L.	Amaranthaceae		paarse amarant	amarante étalée, amarante couleur de sang, amarante rouge, amarante paniculée, amarante sanglante, épinard du soudan, queue de renard	zaad	graine		
Ammi visnaga Lam.	Apiaceae		fijn akkerscherm, khella	petit ammi, herbe aux cure-dents, khella	vrucht	fruit		
Amomum villosum var. xanthioides	Zingiberaceae	Amomum xanthioides Wall.			zaad	graine		

(Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.J.Chen		ex Baker						
Amorphophallus konjac K. Koch	Araceae		konjac	konjac	wortel	racine		
Amyris balsamifera L.	Rutaceae		amyris, sandelhout west, west- indisch rozenhout	amyris baumier, am yris, bois de rose, chandelle	hout, oliehars	bois, oléorésine		
Ananas comosus (L.) Merr.	Bromeliaceae		ananas	ananas	vrucht	fruit		
Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees	Acanthaceae		justicie, indiase gentiaan	echinacée d'inde	blad	feuille		
Anemarrhenas asphodeloides Bunge	Asparagaceae				wortelstok	rhizome		
Anethum graveolens L.	Apiaceae		dille	aneth, fenouil bâtard	vrucht	fruit		
Angelica archangelica L.	Apiaceae		grote engelwortel	angélique vraie	hele plant	plante entière		
Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.	Apiaceae		aziatische engelwortel, bai zhi	bai zhi	wortel	racine		
Angelica	Apiaceae		shishiudo, du	shishiudo, du	hele plant	plante		

pubescens Maxim.			huo	huo		entière		
Angelica sinensis (Oliv.) Diels	Apiaceae		chinese engelwortel, dong quai	angélique chinoise, dong quai	hele plant	plante entière		
Angelica sylvestris L.	Apiaceae		gewone engelwortel	angélique des bois	blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias	Rutaceae	Cusparia officinalis Engl.; Cusparia trifoliata (Willd.) Engl. Galipea officinalis Hancock	angusturaboom	angusture vrai	schors	écorce		
Annona muricata L.	Annonaceae		zuurzak, guanábana	corossolier	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénines.
Annona reticulata L.	Annonaceae		custardappel, ossenhart	cachiman, corossolier réticulé, anone cœur de bœuf, cœur de bœuf	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune

							re hoeveelhede n acetogenine s bevat.	quantité détectable en acétogénine s.
Annona squamosa L.	Annonaceae		zoetzak, suikerappel, kaneelappel of schubappel	attier, pommier cannelle	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n acetogenine s bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acétogénine s.
Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd.	Combretace ae				bast, gom	liber, gomme		
Anredera baselloides (Kunth) Baill.	Basellaceae				blad, wortel	feuille, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement

							behandeling	contre le diabète.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Compositae		rozenkransje	pied-de-chat, pied-de-chat dioïque	bovengron dse delen	parties aériennes		
Anthemis tinctoria L.	Compositae		gele kamille	anthémis des teinturiers, camomille des teinturiers	hele plant	plante entière		
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Apiaceae		echte kervel	autres noms communs : camomille puante, anthémis puante, camomille des chiens, maroute, camomille maroute, marouette, anthémis cotule, anthémis bâtarde, œil-de-vache.	bloeiende toppen	sommités fleuries		
Anthyllis vulneraria L.	Leguminosae		wondklaver	vulnéraire	hele plant	plante entière		
Antirrhinum majus L.	Plantaginaceae		grote leeuwenbek	grand mufler, mufler à grandes fleurs, gueule-de-loup, gueule-de-lion	bovengron dse delen	parties aériennes		

Aphanes arvensis L.	Rosaceae	Alchemilla arvensis (L.) Scop.	grote leeuwenklauw	alchemille des champs	bovengronde delen	parties aériennes		
Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault	Nostocaceae		klamath, AFA	algue bleu-vert du lac klamath, AFA	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden marine toxines bevat. Het gehalte aan microcystine moet onder 1 µg/g zijn.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en toxines marines. La teneur en microcystine doit être inférieure à 1 µg/g.
Apium graveolens L.	Apiaceae		selderij	céleri sauvage	hele plant	plante entière		
Arachis hypogaea L.	Leguminosae		aardnoot	arachide, cacahuète	zaad, vette olie	graine, huile grasse		
Aralia elata (Miq.) Seem.	Araliaceae		japanse engelenboom	angélique en arbre du japon	blad, wortelschors	feuille, écorce de racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

							ap of borstvoedin g.	
Aralia racemosa L.	Araliaceae		trosaralia, amerikaanse nardus	aralia à grappes	wortelstok , wortel	rhizome, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitemen t.
Arbutus unedo L.	Ericaceae		aardbeiboom	arbousier commun	vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants.
Arctium lappa L.	Compositae		amerikaanse nardus	grande bardane	hele plant	plante entière		
Arctium minus (Hill) Bernh.	Compositae	Lappa minor Hill	kleine klit	petite bardane	hele plant	plante entière		

Arctium tomentosum Mill.	Compositae		donzige klit	bardane tomenteuse, bardane poilue	hele plant	plante entière		
Argania spinosa (L.) Skeels	Sapotaceae		arganboom	arganier	vrucht, pitolie	fruit, huile de noyaux	Voor de pitolie, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Pour l'huile de noyaux, seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Brassicaceae		mierikswortel, mierik	raifort, cranson	wortel	racine		
Artemisia abrotanum L.	Compositae	Artemisia procera Willd.	citroenkruid	aurone, citronnelle, aurone mâle, abroton, armoise citronnelle, arquebuse.	bovengrondse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia	Compositae		absintalsem		bovengrond	parties	De	La portion

absinthium L.					dse delen	aériennes	aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia capillaris Thunb.	Compositae		welriekende alsem	armoise capillaire	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia dracunculus L.	Compositae		dragon	estragon	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia frigida Willd.	Compositae		westerse bijvoet	armoise douce	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone

							hoger dan 6 mg.	supérieure à 6 mg.
Artemisia genipi Weber ex Stechm.	Compositae		alpenbijvoet	génépi vrai, génépi noir	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia glacialis L.	Compositae				bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia judaica L.	Compositae				bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia pontica L.	Compositae		kleine alsem, pontische alsem	petite absinthe, absinthe romaine	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire

							leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia umbelliformis Lam.	Compositae		kleine alpenabsint	génépi blanc	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia vallesiaca All.	Compositae			armoise du valais	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia verlotiorum Lamotte	Compositae				bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artemisia vulgaris L.	Compositae		bijvoet	armoise vulgaire	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen	La portion journalière

							dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à 6 mg.
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg	Moraceae		broodboom	arbre à pain	vrucht, zaad, hout	fruit, graine, bois	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n lectine bevat. De grondstof moet een hittebehand eling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis	Fucaceae		knotswier	ascophylle noueuse	thallus	thallus		
Asimina triloba (L.) Dunal	Annonaceae		pawpaw	asiminier	vrucht rijpe	fruit mûr	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en

							acetogenine s bevat.	acétogénine s.
Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren	Leguminosa e		aspalathus, rooibos thé	aspalathus, rooibos thé	bovengron dse delen	parties aériennes		
Asparagus cochinchinen sis (Lour.) Merr.	Asparagace ae		chinese asperge	asperge chinoise	wortel	racine		
Asparagus officinalis L.	Asparagace ae		asperge	asperge	wortel, scheut	racine, pousse		
Asparagus racemosus Willd.	Asparagace ae		satavari, satavar, shatamull		wortelstok	rhizome		
Astracantha adscendens (Boiss. & Hausskn.) Podlech	Leguminosa e	Astragalu s adscende ns Boiss. & Hausskn.			gom	gomme		
Astracantha cretica (Lam.) Podlech	Leguminosa e	Astragalu s creticus Lam.			gom	gomme		
Astracantha gummifera (Labill.) Podlech	Leguminosa e	Astragalu s gummifer Labill.			gom	gomme		
Astracantha microcephal a (Willd.) Podlech	Leguminosa e	Astragalu s microcep halus Willd.			gom	gomme		
Astragalus membranace us Fisch. ex.	Leguminosa e				wortel	racine		

Bunge								
Astragalus membranaceus Moench	Leguminosae		astragalus	astragale	wortel	racine		
Astrantia major L.	Apiaceae		zeeuws knoopje, groot sterrenscherm	grande astrance, grande radiaire	bovengrondse delen	parties aériennes		
Athamanta macedonica (L.) Spreng.	Apiaceae				vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Atractylodes lancea (Thunb.) DC.	Compositae				wortelstok , wortel	rhizome, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Atractylodes	Compositae				wortelstok	rhizome	De	L'étiquetage

macrocephala Koidz.							etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Atractylodes ovata (Thunb.) DC.	Compositae				wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Avena fatua L.	Poaceae		oot	folle-avoine, averon, coquiole, havenon	bovengron dse delen	parties aériennes		
Avena sativa L.	Poaceae		haver, gekweekte haver	avoine, avoine cultivée	bovengron dse delen	parties aériennes		
Baccharis	Compositae	Baccharis	carqueja	baccharis	hele plant	plante	De	L'étiquetage

trimera (Less.) DC.		genistello ides var. trimera (Less.) Baker				entière	etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Bacopa monnieri (L.) Wettst.	Plantaginac eae	Bacopa monnieri (L.) Pennell	kleinbladige bacopa, brahmi	hysope d'eau, brahmi	hele plant	plante entière		
Bactris gasipaes Kunth	Arecaceae		perzikipalm	palmier pêche, péjibaie, parépou	vrucht	fruit		
Balanites aegyptiaca (L.) Delile	Zygophyllac eae			dattier du désert	hele plant	plante entière		
Ballota nigra L.	Lamiaceae		stinkende ballote	ballote fétide, ballote noire	bovengron dse delen	parties aériennes		
Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek	Lamiaceae		stinkende ballote	ballote du midi, ballote fétide	hele plant	plante entière		
Bambusa bambos (L.) Voss	Poaceae	Bambusa arundina cea	bamboe	bambou tabashir	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een	La matière première doit être

		(Retz.) Willd.					hittebehandeling ondergaan.	traitée à la chaleur.
Bambusa vulgaris Schr.	Poaceae		bamboe	bambou	scheut, stengel	pousse, tige	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	La matière première doit être traitée à la chaleur.
Barbarea verna (Mill.) Asch.	Brassicaceae		vroeg barbarakruid	cresson de terre, barbarée printanière	bovengron dse delen	parties aériennes		
Barbarea vulgaris R.Br.	Brassicaceae		gewoon barbarakruid	barbarée commune, herbe de sainte-barbe	bovengron dse delen	parties aériennes		
Bellis perennis L.	Compositae		madeliefje	pâquerette	bovengron dse delen	parties aériennes		
Berberis aquifolium Pursh.	Berberidaceae	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	mahonia aquifolium (pursh) nutt.	mahonia	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes isoquinoléiniques (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Berberis aristata DC.	Berberidaceae				wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse	La portion journalière recommand

							hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	ée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes isoquinoléiniques (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Berberis vulgaris L.	Berberidaceae		zuurbes	epine-vinette	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes isoquinoléiniques (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae		paranoot, bazielennoten, Amazonianoten	noyer d'Amazonie, noyer du Brésil, châtaignier du Brésil	noot	noix		
Beta vulgaris L.	Amaranthaceae		gekweekte biet	betterave cultivée	hele plant	plante entière		
Betula alleghaniensis	Betulaceae		gele berk	bouleau jaune	schors, blad	écorce, feuille		

s Britton								
Betula lenta L.	Betulaceae		suikerberk	bouveau flexible, bouveau acajou, bouveau merisier	schors, blad, sap	écorce, feuille, sève		
Betula pendula Roth	Betulaceae		ruwe berk	bouveau verruqueux, bouveau blanc	knop, schors, blad, teer, sap	bourgeon, écorce, feuille, goudron, sève		
Betula pubescens Ehrh.	Betulaceae		zachte berk, gewone berk	bouveau pubescent, bouveau des marais	knop, schors, blad, sap	bourgeon, écorce, feuille, sève		
Bixa orellana L.	Bixaceae		orleaanboom	rocouyer	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine		
Blainvillea acmella (L.) Philipson	Compositae	Spilanthes acmella (L.) Murray, Acemella oleracea (L.) R. K. Jansen	champagneblad, abc-kruid, parakers	brèdes mafane	bovengrondse delen	parties aériennes		
Borago officinalis L.	Boraginaceae		bernagie, komkommerkruid	bourrache, bourrache officinale	bloem, zaad	fleur, graine	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidine)	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de la section 2.4 (alcaloïdes)

							e alkaloïden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumge halten aan bepaalde verontreinig ingen in levensmidde len en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatie- dossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	pyrrolizidini ques) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminant s dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006. Le dossier de notification doit démontrer cette conformité par analyse.
Boronia megastigma Nees ex Bartlett	Rutaceae		boronia	boronia	bovengron dse delen	parties aériennes		
Boswellia	Burseracea		wierookboom	arbre à	gomhars	gomme-		

sacra Flueck.	e			encens		résine		
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.	Burseracea e		wierookboom	encens	oliehars, gomhars	oléorésin e, gomme- résine		
Brassica cretica Lam.	Brassicacea e				bovengron dse delen	parties aériennes		
Brassica napus L.	Brassicacea e	Brassica napus var. napobras sica (L.) Rchb.	koolzaad	colza, navette	wortel, zaad	racine, graine		
Brassica nigra (L.) K.Koch	Brassicacea e		zwarte mosterd	moutarde noire	bovengron dse delen	parties aériennes		
Brassica oleracea L.	Brassicacea e		incl. tuinkool	incl. chou potager	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

							etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling , uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Brassica rapa L.	Brassicaceae	Sinapis juncea L.	raapzaad	navette d'été	hele plant	plante entière		
Buglossiodes arvensis	Boraginaceae				olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Bupleurum chinense DC.	Apiaceae		sikkelgoudschem	buplèvre chinois	wortel	racine	De etikettering moet de	L'étiquetage doit comporter

							volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia of antidiabetis che behandeling)	l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants ou de traitement contre le antidiabète
Bupleurum rotundifolium L.	Apiaceae		doorwas	buplèvre à feuilles rondes	bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia of antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants ou de traitement contre le diabète.
Bursera tomentosa	Burseraceae				vrucht, schors	fruit, écorce	Analyse moet	L'analyse doit

(Jacq.) Triana & Planch.							aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n podophyllot oxine en analogen bevat.	démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en podophyllot oxine et analogues.
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.	Leguminosa e		grijze knikkernoot	canique grise, z'yeux à chatte	schors, zaad	écorce, graine		
Cakile maritima Scop.	Brassicacea e		zeeraket	roquette de mer, cakilier maritime, tétine de souris	blad, wortel	feuille, racine		
Calendula arvensis (Vaill.) L.	Compositae		akkerghoudsbl oem	souci des champs, souci sauvage	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken bij zwangersch ap. Niet gebruiken bij leverproble men.	L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas de problèmes de foie.

Calendula officinalis L.	Compositae		tuigoudsbloem	souci officinal	bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap. Niet gebruiken bij leverproblemen.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas utiliser en cas de problèmes de foie.
Calluna vulgaris (L.) Hull	Ericaceae		struikhei	callume, bruyère commune	bovengron dse delen	parties aériennes		
Camelina sativa (L.) Crantz	Brassicaceae		huttentut, dederzaad, vlasdodder, vlasdotter	cameline, lin bâtard	zaad	graine		
Camellia sinensis (L.) Kuntze	Theaceae		theestruik	théier	blad	feuille	Het voedings-supplement dat extracten bevat die worden vermeld in bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006	Le complément alimentaire contenant des extraits énumérés à l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement

						van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen, dient te voldoen aan de bepalingen van ditzelfde reglement. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het voedings-supplement dat andere extracten of ongeëxtraheerde bladeren	européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, doit être conforme aux dispositions de ce même règlement. La portion journalière recommandée du complément alimentaire contenant des autres extraits ou des feuilles sans extraction, ne doit pas conduire à une
--	--	--	--	--	--	---	--

							bevat, mag niet leiden tot een inname hoger dan 600 mg looistoffen (uitgedrukt als epigallocate chine-3-gallaat). Het notificatiedossier dient deze conformiteit middels analyse aan te tonen. Enkel het gebruik van volgende extractievloeistoffen zijn toegelaten: water, alcohol met een maximumgehalte van 25 %.	ingestion de tanins (exprimé en épigallocate chine-3-gallate) supérieure à 600 mg. Le dossier de notification doit démontrer cette conformité par analyse. Seule l'utilisation des solvants d'extraction suivants est acceptée: eau, alcool avec une teneur maximale de 25%.
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson	Annonaceae		ylang-ylang	ylang-ylang, canang odorant	bloem	fleur	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une

							een inname hoger dan 0,6 mg safrol.	ingestion de safrole supérieure à 0,6 mg.
Canarium acutifolium (DC.) Merr.	Burseracea e				noot	noix		
Capparis spinosa L.	Capparacea e		kappertjes	câprier commun, câprier épineux	bovengron dse delen	parties aériennes		
Capsella bursa- pastoris (L.) Medik.	Brassicacea e		gewoon herderstasje	bourse-à- pasteur commune	bovengron dse delen	parties aériennes		
Capsicum annuum L.	Solanaceae	Capsicum frutescen s L.	spaanse peper, chilipepers, paprika, groene peper, rode peper	piment annuel, piment des jardins, piment rouge, poivre de guinée	vrucht	fruit		
Carex arenaria L.	Cyperaceae		zandzegge	laîche des sables	blad, wortelstok	feuille, rhizome		
Carica papaya L.	Caricaceae		papaja, meloenboom	papayer	vrucht	fruit		
Carissa carandas L.	Apocynacea e		kristusdoorn	karonda	vrucht, blad	fruit, feuille		
Carlina acaulis L.	Compositae		zilverdistel	carline acaule	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable

							n carlina oxide bevat. De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedings- supplement en.	en oxyde de carline. L'huile essentielle isolée de cette plante n'est pas autorisée dans les complément s alimentaires .
Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G.Martens	Compositae		hoge zilverdistel	carline argentée	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n carlina oxide bevat. De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedings- supplement en.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en oxyde de carline. L'huile essentielle isolée de cette plante n'est pas autorisée dans les complément s alimentaires .
Carpinus betulus L.	Betulaceae		haagbeuk	charme	knop, blad	bourgeon , feuille		

Carthamus lanatus L.	Compositae			carthame laineux	olie van het zaad, bloem	huile de la graine, fleur		
Carthamus tinctorius L.	Compositae		saffloer	carthame des teinturiers	bloem, zaad	fleur, graine		
Carum carvi L.	Apiaceae		echte karwij	carvi, cumin de prés	vrucht	fruit		
Cassia fistula L.	Leguminosae		indische goudenregen	canéficier, cassier	vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer

							toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen; Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitemen t. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Castanea sativa Mill.	Fagaceae		tamme kastanje	châtaigner, châtaignier commun	schors, bladknop, blad, zaad	écorce, bourgeon de feuille, feuille, graine		
Catalpa bignonioides Walter	Bignoniace ae		groene trompetboom	catalpa bignioïdes, arbre aux haricots, catalpa boule, catalpa commun	blad	feuille		
Ceanothus americanus L.	Rhamnacea e		amerikaanse sering	thé du new jersey	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité

							hoeveelheden peptide alkaloiden bevat	déetectable en alcaloïdes peptidiques.
Cecropia peltata L.	Urticaceae			bois trompette, coulequin	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Cedrus libani A. Rich.	Pinaceae		libanonceder, libanese ceder	cèdre du liban	kegelvrucht, blad, hout	cône, feuille, bois		
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Malvaceae		kapokboom	kapokier, bois coton, fromager	bast, blad, olie van het zaad	liber, feuille, huile de la graine		
Centaurea behen L.	Compositae				bloem	fleur		
Centaurea calcitrapa L.	Compositae		kalketrip	centaurée chausse-trape, centaurée étoilée, chardon étoilé	bloem	fleur		

Centaurea centaurium L.	Compositae		centaurie, groot duizendguldenkruid	grande centaurée	bloem	fleur		
Centaurea cyanus L.	Compositae		korenbloem	bleuet des champs, centaurée bleuet	bloem	fleur		
Centaurea jacea L.	Compositae		knoopkruid	centaurée jacée, tête de moineau, ambrette	bloem	fleur		
Centaurea montana L.	Compositae		bergcentaurie	centaurée des montagnes	bloem	fleur		
Centaurium erythraea Rafn	Gentianaceae	Erythraea centaurium (L.) Pers.	echt duizendguldenkruid	erythrée petite centaurée	bovengronde delen	parties aériennes		
Centella asiatica (L.) Urb.	Apiaceae	Hydrocotyle asiatica L.	gotu kola	hydrocotyle d'asie	bovengronde delen	parties aériennes		
Centranthus ruber (L.) DC	Caprifoliaceae		rode spoorbloem, rode valeriaan	valériane rouge, centranthe rouge	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden valepotriaten bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en valépotriate s.
Cerasus	Rosaceae		weichselboom	bois de	zaad	graine		

mahaleb (L.) Mill.			m	sainte-lucie, cerisier de sainte-lucie, faux merisier				
Ceratonia siliqua L.	Leguminose ae		johannesbroo dboom	caroubier	vrucht, zaad	fruit, graine		
Cercis siliquastrum L.	Leguminose ae		judasboom	arbre de judée, gainier	vrucht, gomme van het zaad	fruit, gomme de la graine		
Cetraria islandica (L.)	Parmeliace ae		ijslands mos	lichen d'islande	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentratio n en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Chaenomele s speciosa Nakai	Rosaceae		chinese sierkwee	cognassier de chine	vrucht	fruit		
Chamaemelu m nobile (L.) All.	Compositae	Anthemis nobilis L.	roomse kamille	camomille romaine	bovengron dse delen	parties aériennes		
Chamaecrista nomame	Leguminosa e	Cassia nomame			vrucht (peul),	fruit (gousse),		

(Sieber) H.Ohashi		(Sieber) Honda			blad	feuille		
Chelone glabra L.	Plantaginac eae		schildpadbloem	tête de tortue	bovengron dse delen	parties aériennes		
Chenopodium quinoa Willd.	Amaranthac eae		quinoa	quinoa	gewassen zaden	graines lavées		
Chenopodium vulvaria L.	Amaranthac eae		stinkende ganzenvoet	vulvaire	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n ascaridole bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en ascaridole.
Chimaphila umbellata (L.) Nutt.	Ericaceae	Chimaphila cymosa J.Presl & C.Presl	pipsissewa	chimaphile à ombelles, pirole en ombelle	hele plant	plante entière		
Chiococca alba (L.) Hitchc.	Rubiaceae			bejuco de berac	wortel	racine		
Chionanthus virginicus L.	Oleaceae		sneeuwvlokk enboom	arbres à neige	wortelscho rs	écorce de racine		
Chlorella vulgaris Beijerinck	Chlorellace ae	Chlorella communis Artari	chlorella	chlorella	ééncellige alg	algue unicellula ire		
Chondrus crispus Stackhouse	Gigartinace ae		iers moswier	varech, mousse d'irlande	thallus	thallus		
Chrysanthellum americanum (L.) Vatke	Compositae			chrysanthellum	bloeiende toppen	sommités fleuries		

Chrysanthellum indicum subsp. afroamericanum B.L. Turner	Asteraceae		gele kamille	camomille d'or	bovengronde delen	parties aériennes		
Chrysophyllum cainito L.	Sapotaceae		cainito, sterappel	caimitier, cainite	vrucht	fruit		
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty	Poaceae		vetiver	vétiver	wortel	racine		
Cichorium endivia L.	Compositae		andijvie	chicorée endive	blad	feuille		
Cichorium intybus L.	Compositae		wilde cichorei	chicorée sauvage	hele plant	plante entière		
Cinchona calisaya Wedd.	Rubiaceae	Cinchona ledgeriana (Howard) Bern.Moen. ex Trimen	kinaboom, quinaboom	quinquina jaune, quinquina calisaya	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

Cinchona lancifolia Mutis	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona micrantha Ruiz & Pav.	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant :

							bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona nitida Ruiz & Pav.	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona officinalis L.	Rubiaceae		kinaboom, quinaboom	quinquina jaune, quinquina calisaya	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine

							hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd.	Rubiaceae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinchona	Rubiaceae		rode	quinquina	schors	écorce	De	La portion

pubescens Vahl			kinaboom, rode kinine	rouge			aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de quinine supérieure à 100 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
Cinnamomu m camphora (L.) J.Presl	Lauraceae		kamferboom	camphrier, laurier du japon	hele plant	plante entière		
Cinnamomu m cassia (Nees & T.Nees) J.Presl	Lauraceae	Cinnamo mum aromatic um Nees	chinese kaneel	cannelier de chine	bovengron dse delen	parties aériennes		
Cinnamomu m verum J.Presl.	Lauraceae	Cinnamo mum zeylanicu m Blume, C. zeylanicu m Nees	kaneelboom, ceylonkaneel	cannelier, cannelier de ceylan	schors, blad	écorce, feuille		
Cistanche	Orobanchac				stengel	tige		

salsa (C.A. Mey.) G. Beck	eae							
Cistus creticus L.	Cistaceae	Cistus ladaniferus Stokes	rotsroos	ciste de crête	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
Cistus × incanus L.	Cistaceae		cistusroos	ciste à gomme	hele plant	plante entière		
Cistus monspeliensis L.	Cistaceae		rotsroos	ciste de montpellier	vrucht, blad, hars	fruit, feuille, résine		
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae		watermeloen	pastèque	vrucht, zaad	fruit, graine		
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle	Rutaceae		limoen	lime, limettier	vrucht	fruit		
Citrus aurantium L.	Rutaceae	Citrus aurantium L. ssp. amara Engl., Citrus aurantium L. ssp. sinensis L., Citrus aurantium L. ssp. aurantium L., Citrus aurantium var.	bittere oranje appelboom curaçao oranjeappel	orange amère, bigaradier orange de curaçao	bloem, vrucht, pericarp	fleur, fruit, péricarpe	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van parasympathine hoger dan 20 mg.	Pour les compléments alimentaires avec des préparations du fruit: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de parasympathine supérieure à

		dulcis					Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden meta-synephrine bevat. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Niet gebruiken door personen die behandeld worden voor hypertensie. Niet toedienen aan kinderen jonger dan	20 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en méta-synéphrine. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Ne pas utiliser en cas de traitement anti-hypertenseur. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans. Cesser l'utilisation
--	--	--------	--	--	--	--	--	--

							12 jaar. Bij tekenen van onrust of nervositeit, de inname van het product stoppen.	du produit en cas d'agitation ou de nervosité.
Citrus limon (L.) Osbeck	Rutaceae	Citrus limon (L.) Burm. f.	citroenboom, limoen	citron, citronnier	bovengron dse delen	parties aériennes		
Citrus maxima (Burm.) Merr.	Rutaceae	Citrus grandis (L.) Osbeck, Citrus decumana L.	pompelmoesboom	pamplemoussier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Citrus medica L.	Rutaceae		sucade-citroen, cedraat, citroenboom	cédratier	vrucht, zaad	fruit, graine		
Citrus myrtifolia Raf.	Rutaceae	Citrus aurantium var. myrtifolia Ker Gawl.	chinotto	chinois	vrucht, pericarp	fruit, péricarpe		
Citrus nobilis Lour.	Rutaceae				vrucht	fruit		
Citrus paradisi Macfad.	Rutaceae		grapefruit	grapefruit	bovengron dse delen	parties aériennes		
Citrus reticulata Blanco	Rutaceae		mandarijn, tanquerine, satsuma, clementine	mandarinier, clémentine	bovengron dse delen	parties aériennes		
Citrus	Rutaceae		sinaasappel	oranger	bloem,	fleur,		

sinensis (L.) Osbeck					blad, vrucht	feuille, fruit		
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Cladoniace ae		echt rendiermos	lichen des rennes, lichen des caribous	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentratio n en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Clematis armandii Franch.	Ranunculac eae		bosrank	clématite d'armand	gedroogde stengel	tige séchée	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n aristolochiaz uur bevat. Een botanisch certificaat moet	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochiq ue. Un certificat botanique doit démontrer

							aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Clematis chinensis Osbeck	Ranunculaceae		chinese clematis		gedroogde wortel	racine séchée	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique. Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette plante.
Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Req.) Govaerts	Lamiaceae	Calamint ha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball			blad	feuille		
Clinopodium	Lamiaceae	Calamint	borstelkrans	clinopode,	bovengron	parties		

vulgare L.		ha vulgaris (L.) Druce		clinopode commun, sariette vulgaire	dse delen	aériennes		
Clitoria ternatea L.	Leguminosae		kittelbloem	pois bleu	bloem	fleur	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en acide aristolochique.
Cnicus benedictus L.	Compositae		gezegende distel	chardon-bénit	bovengron dse delen	parties aériennes		
Cochlearia officinalis L.	Brassicaceae		echt lepelblad	cochléaire officinale, cranson	bovengron dse delen	parties aériennes		
Cocos nucifera L.	Arecaceae		kokospalm	cocotier	zaad, vette olie	graine, huile grasse		
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.	Campanulaceae		codonopsis	codonopsis	wortel	racine		
Coffea arabica L.	Rubiaceae		koffie (boom)	caféier	zaad	graine		
Coffea canephora Pierre ex Froehner	Rubiaceae	Coffea robusta Lind. ex De Wild	robusta koffieplant	caféier robusta	zaad	graine		
Coix lacryma-jobi	Poaceae		jobstranen	larmes de job	zaad	graine		

L.								
Coix lacryma-jobi var. ma-yuen (Rom.Caill.) Stapf	Poaceae	Coix ma-yuen Rom. Caill.	jobstranen	larmes de job	zaad, olie van het zaad	graine, huile de la graine		
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott et Endl.	Malvaceae		kolaboom	noix de cola, colatier	zaad	graine		
Cola nitida (Vent.) Schott et Endl.	Malvaceae		kolaboom	noix de cola, colatier	zaad	graine		
Coleus forskohlii (Poir.) Briq.	Lamiaceae				bovengron dse delen, wortel	parties aériennes , racine	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec des médicaments pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul

Combretum micranthum G.Don	combretace ae		kinkeliba	kinkéliba	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	ants. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Combretum sundaicum Miq.	Combretace ae				blad, bladsteel	feuille, pédoncul e		
Commiphora africana (A.Rich.) Endl.	Burseracea e		afrikaanse mirre	myrrhe africaine	gomhars	gomme- résine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitemen t.

Commiphora habessinica (O.Berg) Engl.	Burseraceae				gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora mukul Engl.	Burseraceae		guggul	myrrhe des indes	olie-gomhars	oléo-gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Commiphora myrrha (Nees) Engl.	Burseraceae	Commiphora molmol (Engl.) Engl. ex Tschirch	mirre	myrrhe	olie-gomhars	oléo-gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou

							tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	d'allaitement.
Commiphora schimperi (O.Bergman) Engl.	Burseraceae				gomhars	gomme-résine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Conyza canadensis (L.) Cronquist	Compositae	Erigeron canadensis L.	canadese fijnstraal	vergerette du canada, conyze du canada	hele plant	plante entière		
Copaifera langsdorffii Desf.	Leguminosae				oliehars van de schors	oléorésine de l'écorce		
Coptis japonica (Thunb.) Makino	Ranunculaceae				wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoléiniques (exprimée

							als coptisine) hoger dan 10 mg.	en coptisine) supérieure à 10 mg.
Coptis teeta Wall.	Ranunculac eae				wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes isoquinoléini ques (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.
Coptis trifolia (L.) Salisb.	Ranunculac eae			coptide trifoliée	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'alcaloïdes isoquinoléini ques (exprimée en coptisine) supérieure à 10 mg.
Corallina officinalis L.	Corallinace ae				thallus	thallus		
Cordia myxa	Boraginace		sebestenboo		vrucht	fruit	Het	Le

L.	ae		m				voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidine alkaloiden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatiedossier dient deze	complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de la section 2.4 (alcaloïdes pyrrolizidiniques) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006. Le dossier de notification doit démontrer
----	----	--	---	--	--	--	---	---

							conformiteit aan te tonen middels analyse.	cette conformité par analyse.
Coriandrum sativum L.	Apiaceae		koriander	coriandre	bovengron dse delen, olie van het zaad	parties aériennes , huile de graine	Voor de olie van het zaad, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsing rediënt zijn toegelaten (verordenin gen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Pour l'huile de graine, seuls les produits conformes à l'autorisatio n en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Cornus florida L.	Cornaceae		grootbloemig e amerikaanse kornoelje	cornouiller à fleurs d'amérique, bois-de-chien	vrucht, schors	fruit, écorce		
Cornus mas L.	Cornaceae		gele kornoelje	cornouiller mâle	vrucht	fruit		
Cornus officinalis Siebold & Zucc.	Cornaceae		japanse kornoelje	cornouiller officinal	vrucht	fruit		
Cornus sanguinea L.	Cornaceae		rode kornoelje	cornouiller sanguin, sanguin	knop, vrucht, blad	bourgeon , fruit, feuille		
Corrigiola telephiifolia Pourr.	Molluginac eae			corrigiole à feuilles de téléphium	wortel	racine		

Corylus avellana L.	Betulaceae		hazelaar	noisetier, coudrier	bladknop, blad, vrucht, zaad	bourgeon de feuille, feuille, fruit, graine		
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	Myrtaceae	Eucalyptus citriodora Hook.	citroen eucalyptus	eucalyptus citronné	blad	feuille		
Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr.	Menispermaceae				wortel, stengel	racine, tige	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoléiniques (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Crambe maritima L.	Brassicaceae		zeekool	chou marin, crambé maritime	hele plant	plante entière		
Crataegus azarolus L.	Rosaceae		azarooldoorn	azarolier, azérolier	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidin

							oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	es oligomériques supérieures à 22,5 mg et de flavonoides supérieures à 2,6 mg.
Crataegus curvisepala Lindm.	Rosaceae		koraalmeidoorn	aubépine à feuilles en éventail	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommet fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieures à 22,5 mg et de flavonoides supérieures à 2,6 mg.
Crataegus laevigata (Poir.) DC.	Rosaceae	Crataegus oxyacantha auct.	tweestijlige meidoorn	aubépine à deux styles	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, feuille, sommet fleurie, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques

							dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crataegus monogyna Jacq.	Rosaceae		eenstijlige meidoorn	aubépine à un style	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	bourgeon de feuille, feuille, sommité fleurie, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crataegus pentagyna Waldst. & Kit.	Rosaceae				vrucht, blad, bloeiende top	fruit, feuille, sommité fleurie	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de procyanidines oligomériques supérieure à 22,5 mg et de

							hoger dan 2,6 mg.	flavonoides supérieure à 2,6 mg.
Crithmum maritimum L.	Apiaceae		zeevenkel	fenouil marin, perce-pierre	blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Crocus sativus L.	Iridaceae		saffraankrokus	safran	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van depressie behandeling .	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la

								dépression.
Crossostephi um chinense (A.Gray ex L.) Makino	Compositae				bovengron dse delen	parties aériennes		
Cruciata laevipes Opiz	Rubiaceae	Galium cruciata (L.) Scop.	kruisbladwals tro	gaillet croisette	bovengron dse delen	parties aériennes		
Cryptocarya agathophylla van der Werff	Lauraceae	Ravensar a aromatic a Sonn.; Agathoph yllum aromatic um (Sonn.) Willd	ravensara	ravensare aromatique, ravensara aromatica	vrucht	fruit		
Cucumis melo L.	Cucurbitac eae		meloen	melon	vrucht, zaad	fruit, graine		
Cucumis sativus L.	Cucurbitac eae		comcommer	concombre	vrucht	fruit		
Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitac eae		reuzenpompo en	potiron	vrucht	fruit		
Cucurbita pepo L.	Cucurbitac eae		courgette, pompoen, sierpompoen	courge, pépon, citrouille	bloem, vrucht	fleur, fruit		
Cuminum cyminum L.	Apiaceae		komijn	cumin officinal	vrucht	fruit		
Cupressus sempervirens L.	Cupressace ae		italiaanse cipres	cyprès provençal	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Curcuma longa L.	Zingiberace ae	Curcuma domestic a Val.,	kurkuma	curcuma, rhizome de curcuma,	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de	L'étiquetage doit comporter

		Curcuma domestic Loir., Amomum curcuma Jacq		safran des indes			volgende waarschuwing bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Curcuma xanthorrhiza Roxb.	Zingiberaceae		curcuma	curcuma	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe	Zingiberaceae		javaanse curcuma, zedoarwortelstok	safran de java, zedaire	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Raadpleeg uw arts of	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre

							apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia	médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants
Cuscuta chinensis Lam.	Convolvulac eae		duivelsnaaiga ren	cuscuta de chine	zaad	graine		
Cuscuta epithymum Murray	Convolvulac eae		klein warkruid	cuscuta du thym, cuscuta à petites fleurs, petite cuscuta	bovengron dse delen	parties aériennes		
Cyamopsis tetragonolob a (L.) Taub.	Leguminosa e		guarplant	plante à guar	zaad, gom	graine, gomme		
Cyathula officinalis K.C. Kuan	Amaranthac eae				wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Cyclanthera pedata (L.) Schrad.	Cucurbitac eae		caigua, mexicaanse augurk	caigua, cyclanthère à feuilles digitées	vrucht, blad	fruit, feuille		
Cydonia	Rosaceae	Cydonia	kwee	cognassier	vrucht	fruit		

oblonga Mill.		vulgaris Pers.						
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf	Poaceae		citroengras	citronelle, lemongrass de l'amerique centrale	bovengron dse delen	parties aériennes		
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W.Watson	Poaceae	Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Stapf			bovengron dse delen	parties aériennes		
Cymbopogon jwarancusa subsp. olivieri (Boiss.) Soenarko	Poaceae	Cymbopogon laniger (Desf.) Duthie			bovengron dse delen	parties aériennes		
Cymbopogon martini (Roxb.) Will. Watson	Poaceae		palmarossa	palmarosa	bovengron dse delen	parties aériennes		
Cymbopogon nardus (L.) Rendle	Poaceae		citronella	verveine des indes, citronnelle des indes	bovengron dse delen	parties aériennes		
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.	Poaceae	Andropogon schoenanthus L.	kameelgras		bovengron dse delen	parties aériennes		
Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor	Poaceae		java citronella	citronelle de java	bovengron dse delen	parties aériennes		
Cynara cardunculus L.	Compositae		kardoen	cardon	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		

Cynara scolymus L.	Compositae		artisjok	artichaut	bloemhoofd, blad	capitule, feuille		
Cyperus rotundus L.	Cyperaceae		notengras	souchet rond	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Cytinus hypocistis (L.) L.	Cytinaceae		gele hypocist		bloem, sap	fleur, jus		
Daemonorops draco (Willd.) Blume	Arecaceae	Daemonorops propinqua Becc.; Calamus draco Willd.			vrucht, hars	fruit, résine		
Dahlia pinnata Cav.	Compositae	Dahlia variabilis (Willd.) Desf.		dahlia commun	wortel	racine		
Daucus carota L.	Apiaceae		peen	carotte	wortel, zaad	racine, graine		
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.	Compositae		tuinchrysant	chrysanthème, Chrysanthème d'automne, Chrysanthème	bloem, blad	fleur, feuille		

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae		sofiekruid	e horticole l'herbe de sainte sophie	blad, zaad	feuille, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg.
Desmodium adscendens DC.			Desmodium	Desmodium	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden dimethyltryptamine derivaten en alkaloiden van het type beta-carboline (type harmane) bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de dérivés de la diméthyltryptamine ni d'alcaloïdes de type bêta-carboline (type harmane)
Dianthus caryophyllus L.	Caryophyllaceae		tuinanjerk	oeillet des fleuristes	bloem	fleur		

Dimocarpus longan Lour.	Sapindaceae	Euphoria longan (Lour.) Steud.	longan	longane	zaadmantel, bloem, vrucht	arille, fleur, fruit		
Dioscorea alata L.	Dioscoreaceae			igname ailée, grande igname, cambarre	wortelknol	tubercule	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palib.) C. Pei & C. T. Ting	Dioscoreaceae				wortelstok	rhizome		
Dioscorea composita Hemsl.	Dioscoreaceae				wortelknol	tubercule		
Dioscorea oppositifolia L.	Dioscoreaceae	Dioscorea opposita Thunb.	yam	yam	wortel, wortelstok	racine, rhizome		
Dioscorea polystachya Turcz.	Dioscoreaceae	Dioscorea batatas Decne	yamswortel, chinese igname	igname	wortelstok	rhizome		
Dioscorea villosa L.	Dioscoreaceae		wilde yam	igname indigène	wortelknol	tubercule		
Diospyros kaki Thunb.	Ebenaceae		kaki	kaki, plaqueminier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		

Diospyros virginiana L.	Ebenaceae		amerikaanse persimoon	plaquemines de virginie.	vrucht, olie van het zaad	fruit, huile de graine		
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC	Brassicaceae		grote zandkool, wilde rucola	diplotaxis à feuilles étroites	bovengronde delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg.
Dipsacus fullonum L.	Caprifoliaceae		grote kaardebol, wilde kaardebol	cabaret des oiseaux, cardère à foulon, bonnetier sauvage, chardon à bonnetier	wortel	racine		
Dipsacus inermis Wall.	Caprifoliaceae	Dipsacus asper Wallich., Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai	sechuan kaardebol, xu duan	xu duan	wortel	racine		
Dipsacus japonicus Miq.	Caprifoliaceae		japanse kaardebol	dipsacus japonicus miq.	wortel	racine		
Dorstenia contrajerva	Moraceae				wortel	racine		

L.								
Dracocephalum moldavica L.	Lamiaceae			thé des jardins, tête de dragon, mélisse de moldavie	blad, zaad	feuille, graine		
Drimys winteri J.R.Forst. & G.Forst.	Winteraceae			écorce de winter, foye, canelo	bast	liber		
Drosera anglica Huds.	Droseraceae	Drosera longifolia L.	lange zonnedaauw	rossolis d'angleterre, rossalis à feuilles longues	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinon en bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
Drosera intermedia Hayne	Droseraceae		kleine zonnedaauw	Droséra intermédiaire	hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinon en bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
Drosera peltata Thunb.	Droseraceae				bovengronde delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen	L'analyse doit démontrer

							dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinon bevat.	que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
Drosera ramentacea Burch ex DC	Droseraceae				hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinon bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
Drosera rotundifolia L.	Droseraceae		ronde zonnedaauw	droséra, rossolis à feuilles rondes	bovengronde delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinon bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco	Dunaliellaceae	Haematococcus salinus Dunal						

Durvillea antartica (Chamisso) Hariot	Durvillaeaceae	Fucus antarcticus Chamisso			thallus	thallus		
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	Chenopodium botrys L.	druifkruid		bloeiwijzen	inflorescences	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en ascaridole.
Echinacea angustifolia DC.	Echinacea		kogelbloem, rode zonnebloem	échinacée à feuilles étroites	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2,4 g gedroogde wortel.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2,4 g de racine séchée.
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.	Compositae		bleekbladige zonnehoed	échinacée pâle	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok :	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou rhizome :

							De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 720 mg gedroogde wortel.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 720 mg de racine séchée.
Echinacea purpurea (L.) Moench	Compositae		purperen rudbeckia, rode zonnehoed	echinacée pourpre	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2 g gedroogde kruid.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 2 g d'herbe séchée.
Echium plantagineu m L.	Boraginace ae		slangenkruid	vipérine faux-plantain	olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsing rediënt zijn toegelaten	Seuls les produits conformes à l'autorisatio n en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont

							(verordenin gen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283). Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidin e alkaloïden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumge halten aan bepaalde verontreinig ingen in levensmidde len en tot intrekking van Verordening	autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283). Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de la section 2.4 (alcaloïdes pyrrolizidini ques) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminant s dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							(EG) nr. 1881/2006. Het notificatiedossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	(CE) no 1881/2006. Le dossier de notification doit démontrer cette conformité par analyse.
Eisenia bicyclis (Kjellman) Setchell	Lessoniaceae		aramé	aramé	thallus	thallus		
Elaeis guineensis Jacq.	Arecaceae		oliepalm	palmier à huile d'Afrique	olie van de pit	huile de noyaux		
Elettaria cardamomum (L.) Maton.	Zingiberaceae		echte kardemom, kardoem	cardamome	zaad	graine		
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim	Araliaceae	Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms.	Siberische ginseng	eleuthérocoque	wortel	racine		
Elymus repens (L.) Gould	Poaceae	Agropyron repens (L.) P. Beauv.	kweek, graswortel	chiendent commun, chiendent rampant	wortelstok	rhizome		
Embelia ribes Burm.f.	Primulaceae				wortel, blad, vrucht	racine, feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant :

							ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Epilobium angustifoliu m L.	Onagraceae		gewoon wilgenroosje	epilobe en épi, epilobe à feuilles étroites	bovengron dse delen	parties aériennes		
Epilobium parviflorum Schreb.	Onagraceae		viltige bastwezerik, kleinbloemig wilgeroosje	epilobe à petites fleurs	bovengron dse delen	parties aériennes		
Equisetum arvense L.	Equisetacea e		heermoes	prêle des champs	bovengron dse delen	parties aériennes		
Equisetum fluviatile L.	Equisetacea e		holpijp	prêle des eaux	bovengron dse delen	parties aériennes		
Equisetum hyemale L.	Equisetacea e		schaafstro	prêle d'hiver	bovengron dse delen	parties aériennes		
Equisetum telmateia Ehrh.	Equisetacea e		reuzenpaarde nstaart	grande prêle, grande queue-de- cheval	bovengron dse delen	parties aériennes		
Erica cinerea L.	Ericaceae		rode dophei	bruyère cendrée	bloeiwijze	infloresce nces		
Erica tetralix L.	Ericaceae		gewone dophei	bruyère quaternée, bruyère à quatre angles, caminet	bloem	fleur		
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	Rosaceae		japanse mispel, loquat	néflier du japon, bibassier	blad, zaad	feuille, graine		

Eriodictyon californicum (Hook. et Arn.) Torr.	Boraginaceae		heilig kruid, yerba sancta	herbe sainte	bovengronde delen	parties aériennes		
Erodium cicutarium L'Hérit.	Geraniaceae		gewone reigersbek	bec-de-cigogne commun, erodium à feuilles de ciguë	hele plant	plante entière		
Eruca vesicaria L. Cav.	Brassicaceae	Eruca sativa Mill.	Rucola, raketsla	roquette	bovengronde delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg
Eryngium campestre L.	Apiaceae		echte kruisdistel	panicaut champêtre, chardon roulant	bovengronde delen	parties aériennes		
Eschscholzia californica Cham.	Papaveraceae		slaapmutsje	eschscholzia de californie, pavot jaune de californie	bovengronde delen	parties aériennes		
Eucalyptus dives Schauer	Myrtaceae		pepermunt eucalyptus	eucalyptus mentholé	blad, twijg	feuille, brindille		
Eucalyptus globulus Labill.	Myrtaceae		eucalyptusboom, koortsboom	eucalyptus, arbre à fièvre,	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		

				gommier bleu				
Eucalyptus odorata Behr	Myrtaceae				blad	feuille		
Eucalyptus radiata Sieber ex DC.	Myrtaceae			eucalyptus radié	blad	feuille		
Eucalyptus smithii R.T.Baker	Myrtaceae				schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Eucheuma horridum J. Agardh	Solieriaceae				thallus	thallus		
Eucheuma spinosum J. Agardh.	Solieriaceae				thallus	thallus		
Eucommia ulmoides Oliv.	Eucommiaceae		gutta-percha boom, chinese rubberboom	arbre à gutta-percha	schors	écorce		
Eugenia uniflora L.	Myrtaceae		surinaamse kers	ceriser de cayenne	schors, bloem, vrucht, blad	écorce, fleur, fruit, feuille		
Euphrasia rostkoviana Hayne	Orobanchaceae	Euphrasia officinalis L.	beklierde ogentroost	euphrase glanduleuse	bovengron dse delen	parties aériennes		
Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm.	Orobanchaceae		stijve ogentroost, ogentroost	euphrase raide, euphrase glanduleuse, casse- lunettes	bovengron dse delen	parties aériennes		
Euterpe	Arecaceae		açaí	açaí	vrucht,	fruit,		

oleracea Mart.					zaad	graine		
Evernia prunastri (L.) Ach.	Parmeliace ae		eikmos, gewoon geweimos	evernia, lichen de chêne, mousse de chêne	thallus	thallus		
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult.	Rubiaceae				schors	écorce	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Fabiana imbricata Ruiz & Pav	Solanaceae				hele plant	plante entière		
Fagopyrum esculentum Moench	Polygonace ae	Polygonu m fagopyru m L.	gewone boekweit	sarrasin commun, blé noir	bovengron dse delen	parties aériennes		
Fagus sylvatica L.	Fagaceae		gewone beuk	hêtre commun	schors, knop, vrucht	ecorce, bourgeon , fruit		
Fallopia japonica (Houtt.)	Polygonace ae	Polygonu m cuspidatu p	Japanse duizendknoo p	renouée du japon, reynoutria	hele plant	plante entière		

Ronse Dec.		m Siebold & Zucc.		du japon				
Ferula assa- foetida L.	Apiaceae		duivelsdrek	ase fétide	wortel, gomhars	racine, gomme- résine		
Ficus benghalensis L.	Moraceae		banyan	figuier des banians, banian de l'inde	schors, vrucht	écorce, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Ficus carica L.	Moraceae		vijg	figuier commestible	hele plant	plante entière		
Ficus religiosa L.	Moraceae		bodhiboom	figuier des pagodes, arbre de la bodhi, pipal	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage

							gebruik van antidiabetische behandeling .	concomitant de traitement contre le diabète.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim	Rosaceae	Spirea ulmaria L.	moerasspirea , geitenbaard	reine-des-prés, ulmaire, barbe de bouc	bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Filipendula vulgaris Moench.	Rosaceae		knolspirea	spirée filipendule	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre

							bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescente n onder 18 jaar.	pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Foeniculum vulgare Mill.	Apiaceae		venkel	fenouil	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsge wicht voor kinderen jonger dan 12 jaar.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl	Oleaceae		forsythia	forsythia	vrucht, blad, wortel	fruit, feuille, racine		
Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex	Rosaceae		aardbei	fraiser	hele plant	plante entière		

Rozier								
Fragaria vesca L.	Rosaceae		bosaardbei	fraisier sauvage, fraisier des bois	vrucht, blad	fruit, feuille		
Fragaria viridis Weston	Rosaceae		heuvelaardbei	fraisier des collines, fraisier vert	hele plant	plante entière		
Frangula alnus Mill.	Rhamnaceae	Frangula dodonei Ard., Rhamnus frangula L.	sporkehout, vuilboom	bourdaine, frangule	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants :

							bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitemen t. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Frangula purshiana Cooper	Rhamnacea e	Rhamnus purshian a DC.	Cascara	cascara, écorce sacrée	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De analyseresul taten moeten	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïd es totaux* (exprimés en cascaroside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles

							beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Fraxinus excelsior L.	Oleaceae		gewone es	frêne commun	bovengronde delen	parties aériennes		
Fraxinus ornus L.	Oleaceae		pluim-es, manna-es	frêne à fleurs, frêne à manne	blad, manna	feuille, manne		
Fucus serratus L.	Fucaceae		zaagwier	varech denté	thallus	thallus		
Fucus vesiculosus	Fucaceae		fucus, blaaswier	fucus, varech vésiculeux	thallus	thallus		

L.								
Fumaria officinalis L.	Papaveraceae		gewone duivekervel	fumeterre officinale	bovengron dse delen	parties aériennes		
Galeopsis segetum Neck.	Lamiaceae	Galeopsis ochroleuca Lam.	Bleekgele hennepnetel	galéopsis des champs, chanvre bâtard	bovengron dse delen	parties aériennes		
Galium aparine L.	Rubiaceae		kleefkruid	gaillet grateron, rièble, grateron, gratte-langue, gaille	bovengron dse delen	parties aériennes		
Galium mollugo L.	Rubiaceae		glad walstro	caille-lait blanc, gaillet mou	bovengron dse delen	parties aériennes		
Galium odoratum (L.) Scop.	Rubiaceae	Asperula odorata L.	lievevrouweb edstro	on la connaît aussi sous les noms de « rièble », « grateron », « gratte-langue », « gaille ».	Bovengron dse delen	parties aériennes		
Galium verum L.	Rubiaceae		geel walstro	gaillet jaune, caille-lait jaune	bovengron dse delen	parties aériennes		
Garcinia × mangostana L.	Clusiaceae		mangostan	mangoustani er	vrucht	fruit		
Garcinia gummi-gutta (L.) Roxb..	Clusiaceae	Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.	Guttegombom	guttier	gomhars	gomme-résine		
Gardenia jasminoides J. Ellis	Rubiaceae	Gardenia augusta (L.) Merr.	Gardenia	gardénie commun, jasmin du	hele plant	plante entière		

				cap				
Gastrodia elata Blume	Orchidaceae				hele plant	plante entière		
Gaultheria procumbens L.	Ericaceae		liggende bergthee	gaulthérie du canada	bovengron dse delen	parties aériennes		
Gelidium amansii J.V. Lamouroux	Gelidiaceae				thallus	thallus		
Gelidium sesquipedale (Clemente) Thuret	Gelidiaceae		agar agar	agar agar	thallus	thallus		
Gentiana lutea L.	Gentianaceae		gele gentiaan	grande gentiane, gentiane jaune	wortelstok , wortel	rhizome, racine		
Geranium maculatum L.	Geraniaceae				bovengron dse delen	parties aériennes		
Geranium pratense L.	Geraniaceae		beemdooievaarsbek	géranium des prés	bovengron dse delen	parties aériennes		
Geranium robertianum L.	Geraniaceae		robertskruid	géranium herbe à robert	bovengron dse delen	parties aériennes		
Geranium sanguineum L.	Geraniaceae		bloedooievaarsbek	géranium sanguin, herbe à becquet	bovengron dse delen	parties aériennes		
Geum rivale L.	Rosaceae		knikkend nagelkruid	benoîte des ruisseaux, benoîte des ruisseaux	hele plant	plante entière		
Geum urbanum L.	Rosaceae		geel nagelkruid	benoîte commune	hele plant	plante entière		
Ginkgo	Ginkgoaceae		ginkgo	ginkgo, arbre	blad	feuille	De	La portion

biloba L.	e			des pagodes, arbre aux quarante écus			aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van flavonolglyc osiden hoger dan 21,6 mg en van terpeenlacto nen hoger dan 5,4 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia. Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g.	journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de glycosides de flavonol supérieure à 21,6 mg et de lactones terpéniques supérieure à 5,4 mg. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Consulter votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagul ants. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement .
Glycine max (L.) Merr.	Leguminosa e		soja	soja	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse	La portion journalière recommand

							hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	ée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Glycyrrhiza glabra L.	Leguminosae		zoethout	réglisse	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizinique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque

							lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. Ex DC.	Leguminosae		chinees zoethout	réglisse de l'oural, réglisse de sibérie	wortel, wortelstok , stolon	racine, rhizome, stolon	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizin ezuur hoger dan 100 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide glycyrrhizique supérieure à 100 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter

							volgende waarschuwing bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical.
Gossypium herbaceum L.	Malvaceae		katoenplant, oosters katoen	cotonnier	pilus, wortel, zaad	pilus, racine, graine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n gossypol bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.
Gossypium hirsutum L.	Malvaceae		behaarde katoen	coton mexicain	zaad	graine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n gossypol bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en gossypol.
Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine	Gracilariaceae		knoopwier		thallus	thallus		

& W.F. Farnham								
Grindelia camporum Greene	Compositae		gomplant	grindélia	bovengron dse delen	parties aériennes		
Grindelia hirsutula Hook. & Arn.	Compositae	Grindelia humilis Hook & Ar.			Bovengron dse delen	parties aériennes		
Grindelia robusta Nutt.	Compositae		grindelia	grindélia robuste	bovengron dse delen	parties aériennes		
Grindelia squarrosa (Pursh) Dun.	Compositae		grindelia	grindélia	bovengron dse delen	parties aériennes		
Guaiacum officinale L.	Zygophyllac eae		guajakhout, echt pokhout	bois de gaiac	schors, hout	écorce, bois		
Guaiacum sanctum L.	Zygophyllac eae		guajakhout, pokhout	bois de gaiac	schors, hout	écorce, bois		
Guazuma ulmifolia Lamk.	Malvaceae			bois de hêtre, bois d'homme, bois d'orme	schors, blad, vrucht, zaad	écorce, feuille, fruit, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Gynostemma	Cucurbitac		jiaogulan	jiaogulan,	blad	feuille	De	L'étiquetage

pentaphyllum (Thunb.) Makino	eae			herbe de l'immortalité			etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling . Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.	doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Gypsophila paniculata L.	Caryophyllaceae		pluimgipskruid	gypsophile paniculée	wortel	racine		
Haematococcus pluvialis Flotow	Haematococcaceae		bloedregenalg	haematococcus pluvialis	ééncellig alg	algue unicellulaire		
Haematoxylum campechianum L.	Leguminosae		campechehout	bois de campêche	ongefermenteerd kernhout	duramen non fermenté		
Hamamelis virginiana L.	Hamamelidaceae		virginische toverhazelaar	hamamélis de virginie	schors, blad	écorce, feuille		
Haplopappus baylahuen Remy	Compositae				bovengronde delen	parties aériennes		

Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.	Pedaliaceae		duivelsklauw	griffe du diable	secundaire wortelknol	tubercule secondaire	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal iridoïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'iridoïdes totaux (exprimés en harpagoside) supérieure à 40 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.
Harpagophytum zeyheri Decne.	Pedaliaceae			griffe du diable, plante-grappin, araignée de bois	wortel, wortelknol	racine, tubercule	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal iridoïden (berekend als	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'iridoïdes totaux (exprimés en

							harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.	harpagoside) supérieure à 40 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.
Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen	Amaranthaceae	Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze	braziliaanse ginseng	suma, le ginseng brésilien, pfaffia	wortel	racine		
Hedeoma pulegioides (L.) Pers.	Lamiaceae		hedeoma	hédéome	bovengrondse delen	parties aériennes		
Hedera helix L.	Araliaceae		klimop	lierre	blad	feuille	Enkel de volgende preparaten zijn toegelaten, in overeenstemming met de volgende maximale dagelijkse dosis: a) droog extract (DER 4-8:1),	Seules les préparations suivantes sont autorisées, avec les doses journalières maximales correspondante : a) extrait sec (DER 4-8 :1), solvant

							extractie solvent ethanol 24- 30% m/m b) droog extract (DER 6-7:1), extractie solvent ethanol 40% m/m c) droog extract (DER 3-6:1), extractie solvent ethanol 60% m/m d) vloeibaar extract (DER 1:1), extractie solvent ethanol 70% v/v e) soft extract (DER 2.2- 2.9:1), extractie solvent ethanol 50% v/v: propylene glycol (98:2)	d'extraction éthanol 24- 30% m/m b) extrait sec (DER 6- 7 :1), solvant d'extraction éthanol 40% m/m c) extrait sec (DER 3- 6 :1), solvant d'extraction éthanol 60% m/m d) extrait fluide (DER 1 :1), solvant d'extraction éthanol 70% v/v e) extrait mou (DER 2.2-2.9 :1), solvant d'extraction éthanol 50% v/v : propylène glycol (98 :2)
							Maximale	Doses journalières

							dagelijkse dosis : Adolescente n vanaf 12 jaar en volwassenen : a) 31 mg b) 29 mg c) 46 mg d) 210 mg e) 84 mg Kinderen van 6 tot 11 jaar : a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg Kinderen van 3 tot 5 jaar : a) 16 mg b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg	maximales : Adolescents à partir de 12 ans et adultes : a) 31 mg b) 29 mg c) 46 mg d) 210 mg e) 84 mg Enfants de 6 à 11 ans : a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg Enfants de 3 à 5 ans : a) 16 mg b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg
Hedychium coronarium J. Koenig	Zingiberaceae				bloem, wortelstok	fleur, rhizome		
Helianthus annuus L.	Compositae		gewone zonnebloem	tournesol commun, grand soleil	bovengron dse delen	parties aériennes		
Helianthus tuberosus L.	Compositae		aardpeer	topinambour, hélianthe tubéreux	knol	tubercule		
Helichrysum	Compositae		strobloem,	immortelle	bovengron	parties		

arenarium (L.) Moench.			zandstrobloem	des sables	dse delen	aériennes		
Helichrysum italicum (Roth.) G. Don.	Compositae		kerrieplant	immortelle d'Italie	bovengron dse delen	parties aériennes		
Helichrysum stoechas (L.) Moench	Compositae		gele strobloem	immortelle stoechade	bovengron dse delen	parties aériennes		
Heracleum sphondylium L.	Apiaceae		gewone berenklaauw	berce commune	hele plant	plante entière		
Herniaria glabra L.	Caryophyllaceae		kaal breukkruid	herniaire glabre	hele plant	plante entière		
Herniaria hirsuta L.	Caryophyllaceae				bovengron dse delen	parties aériennes		
Hesperis matronalis L.	Brassicaceae		damastbloem	julienne des dames, girarde, giroflée des dames, violette de damas, aragone	bovengron dse delen	parties aériennes		
Hibiscus sabdariffa L.	Malvaceae		roselle, jamaïcazurin g	carcadé, oseille de guinée, oseille rouge, roselle, bissap	tak, bloem, blad, zaad	rameau, fleur, feuille, graine		
Hieracium pilosella L.	Compositae		muizenoor	epervière piloselle	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en

							Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	cas de grossesse ou d'allaitement
Hierochloe odorata (L.) Beauv.	Poaceae	Hierochloe odorata (L.) Wahl.	veenreukgras	hierochloë odorante	bovengronde delen	parties aériennes		
Himanthalia elongata (L.) S.F. Gray	Himanthaliaaceae		riemwier	spaghetti de la mer, haricot de mer	thallus	thallus		
Hippophae rhamnoides L.	Eleagnaceae		duindoorn	argousier	vrucht, olie van de bes	fruit, huile de baies	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Hizikia fusiformis (Harvey) Okamura	Sargassaceae		hai zao	hai zao, hijiki, hiziki	thallus	thallus		
Hordeum vulgare L.	Poaceae		incl. gewone gerst, zesrijige gerst	incl. orge carrée, orge à six rangs, escourgeon	zaad, wortel, scheut	graine, racine, germe		

Houttuynia cordata Thunb.	Saururaceae				hele plant	plante entière		
Humulus lupulus L.	Cannabaceae		hop	houblon	bloeiwijzen	inflorescences	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van 8-prenylnaringenine hoger dan 400 µg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de 8-prenylnaringénine supérieure à 400 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.	Lycopodiaceae	Lycopodium serratum Thunb.			bovengrondse delen	parties aériennes		
Hydrastis canadensis L.	Ranunculaceae		canadese geelwortel	hydraste du canada	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoléiniques (exprimée

							als berberine) hoger dan 10 mg.	en berbérine) supérieure à 10 mg.
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine	Acanthacea e				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine		
Hymenaea courbaril L.	Leguminose ae		lokusboom, gomcopal	courbaril	schors, fruit, blad, zaad, hars	écorce, fruit, feuille, graine, résine		
Hypericum perforatum L.	Hyperaceae		sint-janskruid	millepertuis perforé, millepertuis commun	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van hypericine hoger dan 700 µg. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'hypéricine supérieure à 700 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Informez votre

							bevatten : Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen uw arts of apotheker informereren.	médecin ou pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments.
Hyssopus officinalis L.	Lamiaceae		hyssop	hysope	bovengron dse delen	parties aériennes		
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.	Aquifoliaceae		mate	maté	blad	feuille		
Illicium verum Hook. f.	Schisandra ceae		chinese steranijs	anis étoilé de chine	schors, vrucht	écorce, fruit		
Impatiens balsamina L.	Balsaminaceae		tuinbalsemien	balsamine des jardins	bovengron dse delen	parties aériennes		
Indigofera tinctoria L.	Leguminosae		indigostruik	indigotier	blad	feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indospicine.
Inula britannica L.	Compositae		engelse alant	inule des fleuves, inule britannique	bovengron dse delen	parties aériennes		
Inula helenium L.	Compositae		griekse alant	inule grande aunée	blad, wortelstok , wortel	feuille, rhizome, racine		
Ipomoea	Convolvulac		zoete	patate douce	knol	tubercule		

batatas (L.) Poir	eae		aardappel					
Isatis tinctoria L.	Brassicaceae		wede	pastel	bovengron dse delen, sap	parties aériennes , jus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n indirubine bevat.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en indirubine.
Jasminum grandiflorum L.	Oleaceae		grootbloemig e jasmijn	jasmin à grandes fleurs	bloem	fleur		
Jasminum officinale L.	Oleaceae		gewone jasmijn	jasmin commun	bloem	fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de

							gebruiken tijdens de zwangerschap.	grossesse.
Jateorhiza palmata (Lam.) Miers	Menispermaceae	Menispermum palmatum Lam.	kolombo, calumbo	racine de colombo	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoléiniques (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Juglans cinerea L.	Juglandaceae		witte walnoot, boternoot	noyer cendré, noyer blanc, noyer à beurre	zaad	graine		
Juglans regia L.	Juglandaceae		okkernoot	noyer royal	bovengronde delen	parties aériennes		
Jumellea fragrans (Thouars) Schltr.	Orchidaceae				blad	feuille		
Juniperus communis L.	Cupressaceae		gewone jeneverbes	genévrier commun	vrucht, blad, hout	fruit, feuille, bois	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht : De	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fruit :

							etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies (maximum 6 weken). Niet gebruiken bij nierfunctiestoornissen.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste (maximum 6 semaines). Pas d'utilisation en cas d'insuffisance rénale.
Justicia adhatoda L.	Acanthaceae	Adhatoda vasica Nees	malabarnoot, adalsa, arusa	noix de malabar	hele plant	plante entière		
Justicia pectoralis Jacq.	Acanthaceae				bovengrondse delen	parties aériennes		
Kaempferia galanga L.	Zingiberaceae		kentjoer		wortelstok	rhizome		
Kavalama urens (Roxb.) Raf.	Malvaceae	Sterculia urens Roxb.			gom	gomme		
Kickxia spuria (L.) Dumort.	Plantaginaceae		eironde leeuwenbek	linaire bâtarde	bovengrondse delen	parties aériennes		
Knautia arvensis (L.) Coult.	Caprifoliaceae		beemdkroon	knautie des champs, scabieuse	bovengrondse delen	parties aériennes		

				des champs				
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Krameriaceae	Krameria triandra Ruiz & Pav.	ratanhia	ratanhia	wortel	racine		
Lactuca indica L.	Compositae		chinese sla		bovengron dse delen	parties aériennes		
Lactuca sativa L.	Compositae		sla	aitue, laitue cultivée, salade	bovengron dse delen	parties aériennes		
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.	Lythraceae		banaba	lilas des indes, queens crape myrtle, banaba	blad	feuille		
Laminaria digitata (Hudson) J.V. Lam.	Laminariaceae	Laminaria palmata Bory	gladgesteeld vingerwier	laminaire digitée	thallus	thallus		
Laminaria hyperborea (Gun.) Foslie	Laminariaceae		ruwgesteeld vinger wier	laminaire hyperboréale, goemon rouge	thallus	thallus		
Laminaria japonica J.E. Areschoug	Laminariaceae		kelp	Laminaire	thallus	thallus		
Lamium album L.	Lamiaceae		witte dovenetel	lamier blanc	bovengron dse delen	parties aériennes		
Larix decidua Mill.	Pinaceae		europese lork, lork	mélèze d'europe, mélèze, mélèze commun	bovengron dse delen, hars	parties aériennes, résine		
Larix	Pinaceae		west	mélèze de	hele plant	plante		

occidentalis Nutt.			amerikaanse lork	l'ouest		entière		
Laurus nobilis L.	Lauraceae		laurierboom	laurier-sauce	vrucht, blad	fruit, feuille		
Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.	Lamiaceae		lavendel	lavande	bovengron dse delen	parties aériennes		
Lavandula angustifolia Mill.	Lamiaceae	Lavandul a angustifol ia subsp. angustifol ia, Lavandul a officinalis Chaix, Lavandul a spica L.	lavendel	lavande	bloeiende top	sommités fleuries		
Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica (DC.) Guinea	Lamiaceae	Lavandul a vera DC.	lavendel	lavande des pyrénées	bloeiende top	sommités fleuries		
Lavandula latifolia Medik	Lamiaceae	Lavandul a hybrida E.Rev. ex Briq.	breedbladige lavendel, spijklavendel	lavande aspic	bovengron dse delen	parties aériennes		
Lavandula stoechas L.	Lamiaceae		franse lavendel	lavande stéchade, lavande papillon, lavande à toupet	bovengron dse delen	parties aériennes		
Lawsonia inermis L.	Lythraceae		henna	henné	blad	feuille	Analyse moet	L'analyse doit

							aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinon en bevat.	démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en naphtoquinones.
Ledum palustre L.	Ericaceae		moerasrozemarijn; moeraspalm	lédon, lédum des marais	bovengron dse delen	parties aériennes		
Lens culinaris Medik.	Leguminosae		linze	lentille cultivée	zaad	graine		
Leonurus cardiaca L.	Lamiaceae		hartgespan	agripaume	bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling .	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement

								contre l'hypertension.
Leonurus japonicus Houtt.	Lamiaceae	Leonurus artemisia (Lour.) S.Y.Hu, Leonurus heterophyllus Sweet			bovengronde delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling .	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension.
Lepidium campestre (L.) R. Br.	Brassicaceae		veldkruidkers	passerage champêtre	bovengronde delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant

							hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling , uw arts raadplegen.	un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae				bovengronde delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling , uw arts raadplegen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Lepidium latifolium L.	Brassicaceae		peperkers	grande passerage, passerage à feuilles larges	bovengronde delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la

							behandeling , uw arts raadplegen.	thyroïde, consultez votre médecin.
Lepidium meyenii Walp.	Brassicaceae	Lepidium peruvianum G. Chacón de Popovici	maca	maca	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloïden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Lepidium sativum L.	Brassicaceae		tuinkers	cresson alénois, passerage cultivé	hele plant	plante entière		
Leptospermum petersonii subsp. petersonii.	Myrtaceae	Leptospermum citratum (J.F.Bailey & C.T.White) Challinor, Cheel & A.R.Penfold			bloeiende toppen	sommités fleuries		
Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst.	Myrtaceae		manuka	manuka	schors, blad	écorce, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en

							Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	cas de grossesse.
Lespedeza capitata Michx.	Leguminosae		lespedeza	lespedeza	bovengronde delen	parties aériennes		
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.	Compositae		gewone margriet	marguerite, marguerite commune	bovengronde delen	parties aériennes		
Levisticum officinale W.D.J. Koch	Apiaceae		lavas	céleri perpétuel, livèche, herbe-à-maggi	hele plant	plante entière		
Ligusticum striatum DC.	Apiaceae	Ligusticum chuanxiong S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu. Ligusticum wallichii Franch.			wortel	racine	Het gehalte aan alkaloiden moet worden bepaald. Bij gebruik van de essentiële olie moet het gehalte aan progestogenen bepaald worden. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :	La teneur en alcaloïdes doit être déterminée. En cas d'utilisation de l'huile essentielle, la teneur en progestagènes doit être déterminée. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

							Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	
Lilium brownii F.E. Br. ex Miellez	Liliaceae				bol	bulbe	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Lindera aggregata (Sims) Kosterm.	Lauraceae				wortel	racine		
Linum usitatissimum L.	Linaceae		gekweekt vlas	lin cultivé	zaad	graine		
Liquidambar styraciflua L.	Altingiaceae		amerikaanse amberboom	copalme d'Amérique	schors	écorce		
Litchi chinensis Sonn.	Sapindaceae		lychee	litchi, letchi	vrucht, zaad	fruit, graine		
Lithothamnion calcareum (Pallas) Areschoug	Hapalidiaceae	Phymatolithon calcareum (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin ex	lithothamnion calcareum	lithothamne	thallus	thallus		

		Woelkeri ng & L.M.Irvin e.						
Litsea cubeba (Lour.) Pers.	Lauraceae				vrucht	fruit		
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Lobariacea e		longenmos	pulmonaire	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentratio n en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Lonicera japonica Thunb.	Caprifoliace ae		japanse kamperfoelie	chèvrefeuille du japon	bloem, steel	fleur, tige		
Lotus corniculatus L.	Leguminosa e		gewone rolklaver	lotier corniculé	hele plant	plante entière		
Lotus corniculatus subsp. corniculatus L.	Leguminosa e		gewone rolklaver	lotier corniculé	bovengron dse delen	parties aériennes		

Luma chequen (Molina) A.Gray	Myrtaceae	Eugenia chequen Mol.			blad	feuille		
Lycium barbarum L.	Solanaceae	Lycium halimifolium Mill.	boksdooorn	lyciet commun, lyciet de barbarie	vrucht	fruit		
Lycium chinense Mill.	Solanaceae		chinese boksdooorn	lyciet de chine	vrucht	fruit		
Lycopersicon esculentum Mill.	Solanaceae	Solanum lycopersicum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst.	tomaat	tomate	vrucht	fruit		
Lycopodium clavatum L.	Lycopodiaceae		grote wolfsklauw	lycopode en massue	bovengronde delen, spoor	Parties aériennes, spore		
Lycopus europaeus L.	Lamiaceae	L. mollis A.Kern., Lycopus menthifolius Mabilie	wolfspoot	lycope, lycopode d'europe, chanvre d'eau	bovengronde delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling, uw arts	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la

							raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Lycopus virginicus Michx.	Lamiaceae				bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling , uw arts raadplegen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Lysimachia vulgaris L.	Primulaceae		grote wederik	lysimaque commune, grande lysimaque	bovengron dse delen	parties aériennes		

Lythrum salicaria L.	Lythraceae		grote kattenstaart	salicaire commune	toppen	sommités	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Macadamia ternifolia F. Muell	Proteaceae		macadamiano ten	noyer du queensland	vrucht, zaad	fruit, graine		
Macrocystis pyrifera (L.) C.Ag.	Laminariac eae		kelp	kelp	thallus	thallus		
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliace ae	Michelia champac a L.			bloem	fleur		
Magnolia officinalis Rehder & Wilson	Magnoliace ae		magnolia	magnolia officinal	schors, bloem	écorce, fleur	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken tijdens de	L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Ne pas utiliser en cas de

							zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	grossesse. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
Malpighia glabra L.	Malpighiaceae	Malpighia punicifolia L.	west-indische kers, barbadoskers	cerise de barbade, acérola	vrucht	fruit		
Malus domestica Borkh.	Rosaceae	Malus sylvestris (L.) Mill. var. domestica (Borkh.) Mansf	eetappel	pommier commun	hele plant	plante entière		
Malus pumila Mill.	Rosaceae		paradijsappel boom	pommier paradis	knop, bloem, vrucht blad	bourgeon , fleur, fruit feuille		
Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris	Rosaceae		wilde appel	pommier sauvage	knop, bloem, vrucht, blad	bourgeon , fleur, fruit feuille		
Malva sylvestris L.	Malvaceae		groot kaasjeskruid, wilde malve	mauve sauvage, fromageon, petit fromage,	bovengron dse delen	parties aériennes		

				fouassier				
Mammea americana L.	Calophyllac eae		amerikaanse mammi-appel	abricotier des antilles, abricotier-pays	pulp van de vrucht	pulpe du fruit		
Mangifera indica L.	Anacardiaceae		mango	manguier	hele plant	plante entière		
Manihot esculenta Crantz	Euphorbiaceae		cassave, maniok	manioc	gekookte wortel	racine cuite		
Manilkara zapota (L.) P.Royen	Sapotaceae	Achras sapota L.	sapodilla	sapotillier	vrucht, bloem	fruit, fleur		
Maranta arundinacea L.	Marantaceae		pijlwortel	marante, dictame, herbe aux flèches	bol, wortelstok	buble, rhizome		
Marchantia polymorpha L.	Marchantiaceae		parapluitjes mos	hépatique des fontaines	thallus	thallus	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Marrubium vulgare L.	Lamiaceae		malrove	marrube	bovengron dse delen	parties aériennes		
Marsdenia cundurango	Apocynaceae	Marsdenia	condurango	condurango	schors	écorce		

Rchb.f.		reichenbachii Triana						
Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst.	Apocynaceae	Gymnema sylvestre (Retz) R.Br.			blad	feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry	Phyllophoraceae		kernwier		thallus	thallus		
Matricaria chamomilla L.	Compositae	Matricaria recutita L., Chamomilla recutita (L.) Rauscher t	echte kamille	matricaire camomille, camomille vulgaire	bovengrondse delen	parties aériennes	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de bloem of het blad : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la fleur ou la feuille : La portion journalière recommandée ne doit

							een inname van α -bisabolol hoger dan 1,9 mg en van apigenine-7-glucoside hoger dan 5,6 mg.	pas conduire à une ingestion d' α -bisabolol supérieure à 1,9 mg et d'apigénine-7-glucoside supérieure à 5,6 mg.
Medicago sativa L.	Leguminosae		luzerne, alfalfa	luzerne commune	bovengronde delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche)	Myrtaceae		theeboom, medicinale mirtehei	melaleuca, arbre à thé, mélaleuque	bovengronde delen	parties aériennes	De vluchtige olie van deze plant is niet	L'huile essentielle de cette plante n'est

Cheel							toegelaten in voedingssupplementen.	pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca cajuputi Powell	Myrtaceae		kajapoetboom, cajeputboom	cajeputier	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca leucadendra (L.) L.	Myrtaceae	Melaleuca leucadendron (L.) L.			blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires.
Melaleuca linariifolia Sm.	Myrtaceae			melaleuque à feuilles linéaires	blad	feuille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les compléments

								s alimentaires .
Melaleuca quinquenervi a (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae		niaouli	niaouli	blad, twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssup plementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les complément s alimentaires .
Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae		nerolina	nerolina, l'arbre à peau	blad twijg	feuille, brindille	De vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssup plementen.	L'huile essentielle de cette plante n'est pas autorisée dans les complément s alimentaires .
Melilotus altissimus Thuill.	Leguminosa e		goudgele honingklaver, gele honingklaver	grand mélilot	bovengron dse delen	parties aériennes		
Melilotus officinalis (L.) Lam.	Fabaceae		citroengele honingklaver, akkerhoningk laver	mélilot officinal	bloeiende top	sommité fleurie	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de

							gebruiken tijdens de zwangersch ap.	grossesse.
Melissa officinalis L.	Lamiaceae	f	citroenmeliss e	mélisse, mélisse officinale	bovengron dse delen	parties aériennes		
Melittis melissophyll um L.	Lamiaceae		bijenblad	mélitte à feuilles de mélisse	bovengron dse delen	parties aériennes		
Mentha aquatica L.	Lamiaceae		watermunt, aalkruid, bakkruid, boerenbalse m, vlooienkruid	menthe aquatique	hele plant	plante entière		
Mentha arvensis L.	Lamiaceae		aktermunt	menthe des champs	bovengron dse delen	parties aériennes		
Mentha spicata L.	Lamiaceae		aarmunt, groene munt	menthe en épi, menthe verte, menthe douce	bovengron dse delen	parties aériennes		
Mentha x piperita L.	Lamiaceae		pepermunt	menthe poivrée	bovengron dse delen	parties aériennes		
Mentzelia cordifolia Dombey ex Urb. & Gilg	Losaceae	Mentzelia scabra Kunth			hele plant	plante entière		
Menyanthes trifoliata L.	Menyantha ceae		waterdriebla d	trèfle d'eau	blad	feuille		
Mesembryan themum crystallinum L.	Aizoaceae	Gasoul crystallin um (L.) Rothm.; Cryophyt um	ijsplantje, ijskruid	ficoïde glaciale	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une

		crystallinum (L.) N.E.Br.					een inname van mesembrine alkaloiden hoger dan 90 µg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	ingestion d'alcaloïdes de type mesembrine supérieure à 90 µg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Mespilus germanica L.	Rosaceae		mispel	néflier, néflier commun	vrucht	fruit		
Mikania amara (Vahl.) Willd.	Compositae				schors, blad	écorce, fruit		
Mitchella repens L.	Rubiaceae				bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Momordica balsamina L.	Cucurbitaceae				vrucht, blad	fruit, feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient

							detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Momordica charantia L.	Cucurbitaceae		alsempeer, balsempeer, sopropo, bittere augurk, bittere komkommer	concombre amer, margose	vrucht, blad	fruit, feuille	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en lectine. La matière première doit être traitée à la chaleur.
Monarda didyma L.	Lamiaceae		bergamot, scharlaken monarda	monarde pourpre, thé d'oswego	bovengronde delen	parties aériennes		
Monarda punctata L.	Lamiaceae				bovengronde delen	parties aériennes		
Morinda citrifolia L.	Rubiaceae		noni, indische moerbei	noni, pomme-chien	puree en concentraat van vrucht, sap	purée et concentré de fruit, jus	Enkel de producten conform met de toelating als novel food	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel

							voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordeningen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Morinda officinalis F.C. How	Rubiaceae				hele plant	plante entière		
Moringa oleifera Lam.	Moringaceae		moringa	moringa	blad, vrucht, zaad	feuille, fruit, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 500 mg gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 500 mg de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas

							toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar.	administrer aux enfants de moins de 18 ans.
Morus alba L.	Moraceae		witte moerbei	mûrier blanc	vrucht, blad	fruit, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Morus nigra L.	Moraceae		zwarte moerbei	mûrier noir	knop, steel, schors, vrucht, blad	bourgeon , tige, écorce, fruit, feuille		
Murraya koenigii (L.) Spreng.	Rutaceae		kerrieboom	arbre à curry, calou pilé, murraya	schors, blad, wortel van de volwassen struik	écorce, feuille, racine d'un buisson adulte		
Musa x paradisiaca L. (pro sp.)	Musaceae	Musa x sapientu m L.	banaan	bananier	vrucht, blad, wortel	fruit, feuille, racine		
Myrciaria	Myrtaceae	Psidium	camu camu,	camu camu,	vrucht	fruit		

dubia (H.B.K.) McVaugh		dubium H.B.K.	rumbes	caçari, camo				
Myrica cerifera L.	Myricaceae			arbre à suif, appelé cirier, arbre à cire	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia. Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants. Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Myrica gale L.	Myricaceae		wilde gagel, was gagel	piment royal, myrte des marais, bois- sent-bon, myrique baumier	bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Myristica fragrans	Myristicace ae		nootmuskaat boom	muscadier	foelie, zaad	macis, graine		

Houtt.								
Myroxylon balsamum var. balsamum (L.) Harms	Leguminosae		tolubalsemboom	baumier de tolu	schors van de stam	écorce du tronc		
Myrtus communis L.	Myrtaceae		mirt	myrte	bovengronde delen	parties aériennes		
Nardostachys jatamansi (D. Don) DC.	Caprifoliaceae	Nardostachys grandiflora DC.	jatamansi, indisch aarborstelgras, narduskruid	jatamansi, nard indien	hele plant	plante entière		
Nasturtium officinale R. Brown	Brassicaceae		witte waterkers	cresson de fontaine	bovengronde delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van pulegone hoger dan 3,5 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de pulégone supérieure à 3,5 mg.
Nelumbo nucifera Gaertn.	Nelumbonaceae		lotus, indische lotusbloem, heilige lotus	lotus, lotus des indes, lotus sacré	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant

							anticoagula ntia.	d'anticoagul ants.
Nepeta cataria L.	Lamiaceae		wild kattekruid	herbe aux chats	bovengron dse delen	parties aériennes		
Nepeta tenuifolia Benth.	Lamiaceae	Schizone peta tenuifolia (Benth.) Briq.	japans kattenkruid	chataire japonaise	blad	feuille		
Nephelium lappaceum L.	Sapindacea e		ramboetan	ramboutan, litchi chevelu	vrucht	fruit		
Nigella sativa L.	Ranunculac eae		zwarte komijn	nigelle cultivée, cumin noir	koud geperste olie van het zaad	huile de la graine pressée à froid	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet geraffineerd e olie van deze plant bekomen door koude persing is instabiel en hoge dosissen zijn niet geschikt voor de consumptie door kwetsbare groepen, met name:	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : L'huile non raffinée de cette plante obtenue par pression à froid est instable et à haute dose ne convient pas pour la consommati on par des groupes vulnérables notamment : les enfants de moins de 12 ans, les adolescents de moins de

							kinderen onder 12 jaar, adolescenten onder 18 jaar, zwangere en lacterende vrouwen.	18 ans, les femmes enceintes ou allaitantes.
Ocimum basilicum L.	Lamiaceae		basilicum, baziélkruid	basilic, basilic commun	bovengronde delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'estrageol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Ocimum	Lamiaceae				bovengron	parties	De	La portion

gratissimum L.					dse delen	aériennes	aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsge- wicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwi- ng bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	journalière recommand- ée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissem- ent suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Ocimum tenuiflorum L.	Lamiaceae	Ocimum sanctum L.	heilige basilicum	basilic sacré	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsge-	La portion journalière recommand- ée ne doit pas conduire à une ingestion d'estragol supérieure à 0,05 mg/kg de poids

							wicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	corporel pour les enfants de moins de 12 ans. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Oenanthe aquatica (L.) Poiret	Apiaceae		watertorkruid, watervinkel	oenanthe phellandre, fenouil d'eau, oenanthe aquatique	rijpe vrucht	fruit mûr		
Oenothera biennis L.	Onagraceae		middelste teunisbloem	onagre bisanuelle	zaad	graine		
Olea europaea L.	Oleaceae		olijfboom	olivier	knop, vrucht, blad	bourgeon, fruit, feuille		
Olea europaea L. subsp. europaea	Oleaceae		olijfboom	olivier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Ononis spinosa L.	Leguminosae	Ononis vulgaris "Rouy, p.p.C"	kattedoorn	bugrane épineuse, arrête-bœuf	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion

							van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams	Leguminosae	Ononis arvensis L.	wild zoethout, stalkruid	bugrane des champs	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de

							lot van producten.	produits.
Onopordon acanthium L.	Compositae		wegdistel	chardon aux ânes, onopordon fausse- acanthé	bovengron dse delen	parties aériennes		
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.	Asparagace ae		japanse slangenbaard	barbe de serpent, muguet du japon	knol	tubercule	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants.
Opopanax chironius (L.) W.D.J.Koch	Apiaceae		opopanax	opopanax, opopanax de chiron	hele plant, gomhars	plante entière, gomme- résine		
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Cactaceae		vijgcactus	oponce, figuier de barbarie	cladode, bloem, vrucht	cladode, fleur, fruit		
Orchis mascula L.	Orchidacea e		mannetjesorc his	orchis mâle	wortelknol	tubercule		
Origanum compactum Bentham	Lamiaceae		origano	origan	bovengron dse delen	parties aériennes		
Origanum dictamnus L.	Lamiaceae		hopmarjolein, kandische majoraan	dictame de crête	bovengron dse delen	parties aériennes		

Origanum majorana L.	Lamiaceae	Majorana hortensis Moench.	marjolein, majoraan	marjolaine, amarique	bovengron dse delen	parties aériennes		
Origanum vulgare L.	Lamiaceae		wilde marjolein, orego	origan, origan vulgaire, marjolaine sauvage	bovengron dse delen	parties aériennes		
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.	Lamiaceae		javaanse nierthee	thé de java, moustaches de chat	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5,5 g gedroogde bladeren.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 5,5 g de feuilles séchées.
Orthosiphon aristatus var. aristatus	Lamiaceae		kattensnor	moustaches de chat	bovengron dse delen	parties aériennes		
Oryza sativa L.	Poaceae		rijst	riz	zaad, wortel	graine, racine		
Oxalis acetosella L.	Oxalidaceae		witte klaverzuring	oseille des bois	bovengron dse delen	parties aériennes		
Pachira aquatica Aubl.	Malvaceae		watercacao	marce, noisetier de la guyane, noix de malabar, arbre à monnaie	blad, zaad	feuille, graine		
Pachira	Malvaceae				zaad	graine		

insignis (SW.) Savigny								
Padus avium var. avium	Rosaceae	Prunus padus L.	gewone vogelkers	cerisier à grappes, merisier à grappes	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcy anide equivalente n (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalent s en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Paeonia lactiflora Pall.	Paeoniacea e	Paeonia albiflora Pall., Paeonia chinensis L. Vilmorin	chinese pioen	pivoine blanche, pivoine commune	bloem, wortel, zaad	fleur, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Paeonia officinalis L.	Paeoniacea e		boerenpioen	pivoine officinale	bloem, wortel	fleur, racine		
Paeonia x suffruticosa Andrews	Paeoniacea e		boompioen	pivoine en arbre	wortel	racine		
Palmaria palmata	Palmariacea	Fucus palmatus	rood lapwier	rhodyménie palmé	thallus	thallus		

(Linnaeus) Weber & Mohr		L., Rhodyme nia palmata (L.) Greville						
Panax ginseng C.A. Mey.	Araliaceae		ginseng	ginseng, mandragore coréenne	wortel, blad, bes	racine, feuille, baie	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panax notoginseng (Burkill) F.H. Chen.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de

							che behandeling .	traitement contre le diabète.
Panax pseudoginse ng Wall.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	feuille, racine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Panax quinquefoliu s L.	Araliaceae		amerikaanse ginseng	ginseng américain	wortel, blad, zaad	racine, feuille, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.

Panicum miliaceum L.	Poaceae		pluimgierst	millet commun, mil, millet cultivé, panic, panic millet	bloem, vrucht	fleur, fruit		
Panzerina lanata (L.) Soják	Leguminosae	Panzeria lanata (L.) Bunge.			bovengronde delen	parties aériennes		
Papaver rhoeas L.	Papaveraceae		grote klapproos	grand coquelicot	bloem	fleur		
Parietaria officinalis L.	Urticaceae		groot glaskruid	pariétaire officinale	bovengronde delen	parties aériennes		
Parmelia saxatilis (L.) Ach.	Parmeliaceae				thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Parthenium hysterophorus L.	Compositae				bovengronde delen	parties aériennes		
Parthenociss	Vitaceae	Ampelops	oosterse	vigne-vierge	bovengron	parties	Voor	Pour les

us tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.		is tricuspid ata Siebold et Zucc.	wingerd, oosterse wilde wingerd	à trois pointes	dse delen	aériennes	voedingssup plementen met bereidingen van de jonge scheut: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5% gedroogde plant.	complément s alimentaires avec des préparations de jeune pousse: La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 5% de plante séchée.
Passiflora edulis Sims	Passiflorace ae	Passiflora incarnata L.	passiebloem, passiekruid	passiflore sauvage	bovengron dse delen	parties aériennes		
Pastinaca sativa L.	Apiaceae		pastinaak	panais	wortel	racine		
Paullinia cupana Kunth	Sapindacea e		guarana	guarana	zaad	graine		
Pedanium murex L.	Pedaliaceae				bovengron dse delen	parties aériennes		
Pelargonium graveolens L'Herit	Geraniacea e		rozenpelargo nium, rozengeraniu m	pélargonium à forte odeur	bovengron dse delen	parties aériennes		
Pelargonium radens H.E. Moore	Geraniacea e	Pelargoni um radula			bovengron dse delen	parties aériennes		

		(Cav.) L'Hér.						
Perilla frutescens (L.) Britton	Lamiaceae		zwarte netel, perilla, japans sesam-zaad	perilla	zaad	graine		
Persea americana Mill.	Lauraceae		avocado boom	avocatier	blad, olie van het vruchtvlees	feuille, huile de la pulpe du fruit		
Persicaria bistorta (L.) Samp.	Polygonaceae	Polygonum bistorta L.	adderwortel, adderkruid	bistorte, renouée bistorte, serpentinaire, feillote	wortelstok	rhizome		
Persicaria maculosa Gray	Polygonaceae	Polygonum persicaria L.	perzikkruid	renouée persicaire	bovengronde delen	parties aériennes		
Petiveria alliacea L.	Phytolaccaceae		parelhoenkruid	herbe aux poules	blad, wortel	feuille, racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Apiaceae		tuinperselie	persil cultivé	hele plant	plante entière		
Peucedanum	Apiaceae		meesterworte	impératoire,	hele plant	plante		

ostruthium (L.) W. Koch			l, varkenskerve l	peucédan officinal		entière		
Peumus boldus Molina	Monimiace ae		boldo	boldo	blad	feuille		
Phaseolus vulgaris L.	Leguminosa e		gewone boon	haricot commun	gekookt of geweeekt zaad	graine cuite ou trempée		
Phellodendr on amurense Rupr.	Rutaceae		kurkboom	phellodendro n de l'amour, arbre au liège	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoléini ques (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phillyrea latifolia L.	Oleaceae			alavert à larges	blad	feuille		

				feuilles				
Phlebodium aureum (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polypodium leucatomos Poir.	blauwvaren		blad, wortelstok	feuille, rhizome		
Phoenix dactylifera L.	Arecaceae		dadelpalm	palmier dattier, dattier	vruchtvlees	pulpe du fruit		
Photinia melanocarpa (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps	Rosaceae	Aronia melanocarpa (Michaux.) S. Elliott	zwarte appelbes	amélanchier à fruits noirs, aronie à fruits noirs	vrucht	fruit		
Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) Moldenke	Verbenaceae	Lippia dulcis Trev.	azteeks zoetkruid	l'herbe sucrée des Aztèques	bovengronde delen	parties aériennes		
Phyllanthus amarus Schumacher & Thonn.	Phyllanthaceae				bloeiende top	Sommités fleuries	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phyllanthus emblica L.	Phyllanthaceae	Emblica officinalis Gaertn.	amalaki, amla	amalaki, amla, arbre de malacca	bovengronde delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas

							bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	utiliser en cas de grossesse.
Phyllanthus niruri L.	Phyllanthac eae				hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Phymatolitho n calcareum (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbi n	Hapalidiace ae			lithothamne	thallus	thallus		
Physalis alkekengi L.	Solanaceae		lampionplant, jodenkers	coqueret, coqueret alkékenge, lanterne chinoise	rijpe vrucht	fruit mûr		
Physalis peruviana L.	Solanaceae		goudbes, ananaskers, incabes, kaapse kruisbes	coqueret du pérou, groseille du cap	rijpe vrucht	fruit mûr		
Picea abies (L.) Karst.	Pinaceae		fijnspar, grote spar	epicéa commun, epicéa, faux	naald, top van de tak	aiguille, bout de branche		

				sapin, pesse, sapin élevé, sapin rouge				
Picramnia antidesma Sw.	Picramniac eae				schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïd es totaux* (exprimés en cascaroside A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

							jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Pimenta dioica (L.) Merr.	Myrtaceae	Pimenta officinalis Lindl.	piment, jamaicapeper	poivrier de la jamaïque, piment de la jamaïque	bes	baie		
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae		west-indische bay-boom, bay-rumboom, bay st.thomas	piment couronné, bois d'inde	blad	feuille		
Pimpinella anisum L.	Apiaceae		anijs	anis	zaad	graine		
Pimpinella major (L.) Huds.	Apiaceae		grote bevernel	grand boucage	wortel	racine		
Pimpinella saxifraga L.	Apiaceae		kleine bevernel	petit boucage	hele plant	plante entière		
Pinus koraiensis Siebold & Zucc.	Pinaceae		koreaanse den	pin de corée	naald, oliears, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
Pinus massoniana Lamb.	Pinaceae				naald, oliears, zaad	aiguille, oléorésine, graine		
Pinus mugo	Pinaceae	Pinus	bergden	pin	knop,	bourgeon		

Turra		montana Mill.		buissonnant, pin mugho	naald, scheut	, aiguille, pousse		
Pinus pinaster Ait.	Pinaceae	Pinus maritima Lam.	zeeden	pin maritime, pin des landes	schors, zaad, blad, knop (kegel)	écorce, graine, feuille, bourgeon (cône)		
Pinus pinea L.	Pinaceae		parasolden	pin parasol, pin pignon	naald, oliehars, zaad	aiguille, oléorésin e, graine		
Pinus sylvestris L.	Pinaceae		grove den	pin sylvestre, pin-sauvage	schors, knop, vrucht, blad, scheut	écorce, bourgeon , fruit, feuille, pousse		
Piper aduncum L.	Piperaceae	Piper angustifol ium Ruiz & Pav.	maticopeper	matico	bovengron dse delen	parties aériennes		
Piper longum L.	Piperaceae		lange peper	poivre long	vrucht	fruit		
Piper nigrum L.	Piperaceae		zwarte peper, witte peper	poivrier noir, poivrier blanc	vrucht, oliehars, olie	fruit, oléorésin e, huile		
Pistacia lentiscus L.	Anacardiaceae	Lentiscus vulgaris Fourr. , Terebinth us lentiscus (L.) Moench	mastiekboom	lentisque, pistachier lentisque	blad, hars, twijg	feuille, résine, brindille		
Pistacia terebinthus L.	Anacardiaceae		terpentijnboom	pistachier térébinthe, térébinthe	vrucht	fruit		
Pistacia vera L.	Anacardiaceae		pistache, pimpernoot	pistachier, pistachier	vrucht	fruit		

				commun, pistachier cultivé, pistachier vrai				
Pisum sativum L.	Leguminosa e		erwt	pois	peul, zaad	gousse, graine		
Plantago afra L.	Plantaginac eae	Plantago psyllium L.	vlozaad, weegbree	plantain psyllium, plantain pucier, herbe aux puces, plantain psyllion, pucier	zaadhuid, zaad	tégument de graine, graine	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmidd elen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Ne pas administrer concomitam ment avec des médicament s.
Plantago arenaria Waldst. et Kit.	Plantaginac eae		zandweegbre e	plantain de sables	zaad	graine		
Plantago lanceolata L.	Plantaginac eae		smalle weegbree	plantain lancéolé	bovengron dse delen	parties aériennes		
Plantago major L.	Plantaginac eae		grote weegbree	plantain à larges feuilles, grand plantain	bovengron dse delen	parties aériennes		
Plantago media L.	Plantaginac eae		ruige weegbree	plantain intermédiaire, langue d'agneau	hele plant	plante entière		
Plantago orbignyana	Plantaginac eae	Plantago ovata	vlozaad	plantain pucier,	zaad	graine		

Steinh. ex Decne.		Phil.		plantain des indes				
Plantago ovata Forssk.	Plantaginaceae	Plantago ispaghula Roxb. ex Fleming	vlozaad	plantain pucier, plantain des indes	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.
Platanus orientalis L.	Platanaceae		oosterse plataan	platane d'Orient	knop	bourgeon		
Platycodon grandiflorus (Jacquin) A. DC.	Campanulaceae		ballonklokje, chinese klokjesbloem, ballonbloem	platycodon à grandes fleurs	wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Langdurig gebruik kan de maag irriteren.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : L'usage prolongé peut irriter l'estomac.
Plectranthus barbatus Andrews	Lamiaceae	Coleus barbatus (Andrews) Benth			blad, wortel, knol	feuille, racine, tubercule	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser avec

							met hartmedicati e. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	des médicament s pour le cœur. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants.
Plukenetia volubilis L.	Euphorbiac eae				olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsing rediënt zijn toegelaten (verordenin gen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisatio n en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.	Lamiaceae		patchoeli	patchouli	blad	feuille		
Polygala senega L.	Polygalacea e		senegawortel , senecawortel ,	polygala de virginie, sénéga, laitier, herbe	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De etikettering moet de volgende	L'étiquetage doit comporter l'avertissem

			ratelslangwortel	au lait			waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	ent suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Polygala sibirica L.	Polygalaceae				wortel	racine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.
Polygala tenuifolia Willd.	Polygalaceae		siberische vleugeltjesbloem	polygala de chine	wortel	racine		
Polygala vulgaris L.	Polygalaceae	Polygala comosa Schkuhr	gewone vleugeltjesbloem	polygale commun	bovengrondse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste.

							advies.	
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	Liliaceae	Polygonatum officinale All.	welriekende salomonszegel	sceau de salomon odorant	wortelstok	rhizome		
Polygonum aviculare L.	Asparagaceae		varkensgras	renouée des oiseaux, traînasse	bovengronde delen	parties aériennes		
Populus alba L.	Salicaceae		witte abeel, zilverpopulier	peuplier blanc, peuplier argenté, abèle	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus balsamifera L.	Salicaceae		balsempopulier	peuplier baumier	schors, knop, blad	écorce, bourgeon, feuille	De etikettering moet de volgende waarschuwingen	L'étiquetage doit comporter les avertissements

							bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus nigra L.	Salicaceae		zwarte populier	peuplier noir	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et

							jaar.	adolescents de moins de 18 ans.
Populus tremula L.	Salicaceae		ratelpopulier	peuplier tremble	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Populus tremuloides Michx.	Salicaceae		amerikaanse ratelpopulier	peuplier faux-tremble	schors, knop	écorce, bourgeon	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre

							gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Porphyra umbilicalis Kützing	Bangiaceae		navelwier, purperwier	nori, porphyre	thallus	thallus		
Portulaca oleracea L.	Portulacaceae		postelein	pourpier, pourpier potager	bovengrondse delen	parties aériennes		
Potentilla anserina L.	Rosaceae		zilverschoon	potentille des oies, potentille ansérine	hele plant	plante entière		
Potentilla argentea L.	Rosaceae		viltganzerik	potentille argentée	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant

							behandeling . Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding	de traitement contre le diabète. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.	Rosaceae		tormentil, bloedwortel, zevenblad, zevenvingerkruid	tormentille, potentille dressée, potentille officinale, herbe de sainte catherine	hele plant	plante entière		
Potentilla reptans L.	Rosaceae		vijfvingerkruid	potentille rampante, quintefeuille	wortelstok	rhizome		
Prangos pabularia Lindl.	Apiaceae		prangos	yugan	vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12

							12 jaar.	ans.
Primula elatior Hill	Primulaceae		slanke sleutelbloem	primevère élevée, primevère des bois	bloem, wortel	fleur, racine		
Primula veris L.	Primulaceae	Primula officinalis (L.) Hill.	gulden sleutelbloem	primevère officinale	bloem, wortel	fleur, racine		
Prunella vulgaris L.	Lamiaceae		gewone brunel	brunelle commune	bovengronde delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken samen met contraceptiva.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser concomitamment avec des contraceptifs.
Prunus africana (Hook. f.) kalkman	Rosaceae	Pygeum africanum Hook. f.	rood stinkhout, afrikaanse kers, pygeum	mueri, pygeum, prunier d'afrique	schors	écorce		
Prunus armeniaca L.	Rosaceae		abrikoos	abricotier	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Prunus avium (L.) L.	Rosaceae		zoete kers	merisier, cerisier des oiseaux, cerisier, bigarreautier	vrucht, steel	fruit, pédoncule		
Prunus cerasus L.	Rosaceae	Cerasus vulgaris Mill.	zure kers	griottier	Fruit (namelijk zaad en pulp), bloemsteel	Fruit (dont graine et pulpe), pédoncule		

					, blad, schors, gom	e, feuille, écorce, gomme		
Prunus domestica L.	Rosaceae		pruimboom	prunier	schors, knop, bloem, vrucht, blad	écorce, bourgeon , fleur, fruit, feuille		
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb	Rosaceae	Amygdalus communis L., Prunus amygdalus Batsch.	amandelboom	amandier	knop, bladknop, zaad, bloem, vrucht, olie	bourgeon , bourgeon de feuille, graine, fleur, fruit, huile	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcy anide equivalente n (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalent s en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Prunus persica (L.) Stokes	Rosaceae		perzik	pêcher, pêcher commun	vrucht, blad, zaad	fruit, feuille, graine		
Prunus serotina Ehrh.	Rosaceae		amerikaanse vogelkers	cerisier tardif	schors, blad	écorce, feuille		
Prunus spinosa L.	Rosaceae		sleedoorn	prunellier, epine noire, prunier épineux	bovengron dse delen	parties aériennes		
Psidium guajava L.	Myrtaceae		g <u>ua</u> va	goyavier	schors, vrucht, blad, wortel	écorce, fruit, feuille, racine	Enkel het gebruik van waterige en licht	Seule l'utilisation des extraits aqueux et

							alcoholische (25%) extracten zijn toegelaten.	légèrement alcoolisés (25%) est autorisée.
Psidium guineense Sw.	Myrtaceae	Psidium araca Raddi	braziliaanse guave	goyavier du brésil	vrucht, blad	fruit, feuille		
Pterocarpus erinaceus Poir.	Leguminosae			vène	sap van het hout	jus du bois		
Pterocarpus indicus Willd.	Leguminosae				sap van het hout	jus du bois	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Pterocarpus marsupium Roxb.	Fabaceae		kinoboom, sandelboom, bastaardteak	kino de malobar	bloem, kernhout, blad, gomhars	fleur, duramen, feuille, gomme-résine		
Pterocarpus officinalis Jacq.	Leguminosae	Pterocarpus draco L.			hars	résine		
Pterocarpus	Leguminosae		rode	santal rouge	hout	bois		

santalinus L. f.	e		sandelboom					
Pueraria montana var. lobata (Willd.) Sanjappa & Pradeep	Leguminosae	Pueraria lobata (Willd.) Ohwi	kudzu	kudzu	bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Pueraria tuberosa (Willd.) DC.	Leguminosae				bloem, wortel	fleur, racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimées en glycoside du composant

							hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn.	Compositae		heelblaadjes	pulicaire dysentérique	hele plant	plante entière		
Pulmonaria officinalis L.	Boraginaceae		gevekt longkruid	pulmonaire officinale	wortel	racine	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidine alkaloiden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumge	Le complément alimentaire doit être conforme aux dispositions de la section 2.4 (alcaloïdes pyrrolizidiniques) de l'annexe du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales

							halten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatiedossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006. Le dossier de notification doit démontrer cette conformité par analyse.
Punica granatum L.	Lythraceae		granaatboom	grenadier	bloem, vrucht, zaad	fleur, fruit, graine		
Pyrola rotundifolia L.	Ericaceae		rond wintergroen, rondbladig wintergroen	pyrole à feuilles rondes	blad	feuille		
Pyropia tenera (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G.Choi	Bangiaceae	Porphyra tenera Kjellman			thallus	thallus		
Pyrus communis L.	Rosaceae		peer	poirier	schors, vrucht, blad	écorce, fruit, feuille		
Quercus alba	Fagaceae		amerikaanse	chêne blanc,	schors,	écorce,		

L.			witte eik	chêne blanc d'amérique	vrucht, galnoot, blad, bladknop	fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus coccifera L.	Fagaceae		hulsteik	chêne des garrigues, chêne kermès	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus ilex L.	Fagaceae		steeneik	chêne vert, yeuse	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus infectoria G. Olivier	Fagaceae				schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus petraea (Matt.) Liebl.	Fagaceae		wintereik	chêne sessile	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus pubescens Willd.	Fagaceae		donzige eik	chêne pubescent, chêne blanc	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus robur L.	Fagaceae		zomereik	chêne pédonculé	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	écorce, fruit, noix de galle, feuille, bourgeon		
Quercus serrata subsp.	Fagaceae	Quercus glandulif era	chinese eik	chêne à feuilles de chataîgnier	schors, vrucht, galnoot,	écorce, fruit, noix de galle,		

serrata		Blume			blad	feuille		
Quercus suber L.	Fagaceae		kurkeik	chêne-liège, corcier, surier, suv	schors, vrucht, galnoot, blad	écorce, fruit, noix de galle, feuille		
Quillaja saponaria Molina	Quillajaceae	Quillaja smegmad ermos DC.			schors	écorce		
Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin	Brassicaceae	Raphanus sativus var. niger (Mill.) J.Kern.	knopherik, wilde radijs	ravenelle, radis ravenelle, radis sauvage	hele plant	plante entière		
Raphanus sativus L.	Brassicaceae		tuinradijs	radis cultivé	hele plant	plante entière		
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl.	Arecaceae	Raphia pedunculata P.Beauv.			zetmeel afkomstig van het merg van de scheut	amidon de la moelle de la pousse		
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) DC.	Plantaginaceae		chinees vingerhoedsk ruid	digitale de chine, rehmannia	wortel	racine		
Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke	Polygonaceae	Polygonum multiflorum Thunb., Fallopia multiflora (Thunb.) K. Haraldson	knoopkruid	renouée à fleurs multiples	wortel, stengel, zaad	racine, tige, graine		
Rhamnus	Rhamnaceae		alpenwegedo	nerprun des	schors	écorce	De	La portion

alpina L.	e		orn	alpes			aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of	journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en équivalentes glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en
-----------	---	--	-----	-------	--	--	--	---

							borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rhamnus cathartica L.	Rhamnaceae		wegedoorn	nerprun purgatif	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en équivalents glucofranguline A) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

							ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	nts suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitemen t. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum australe D. Don	Polygonace ae	Rheum emodii Wall. ex Meisn.			blad, wortelstok	feuille, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. Het gehalte aan rhaponticosi den moet bepaald	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïd es totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. La teneur en rhaponticosi des doit être déterminée. Les résultats

							worden. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum x hybridum Murray	Polygonaceae		Tuinrabarber	rhubarbe	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire

							leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik	à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							zonder deskundig advies.	d'un spécialiste.
Rheum officinale Baill.	Polygonace ae		chinese rabarber	rhubarbe de chine, racine de rhubarbe officinale	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïd es totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre

							zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum palmatum L.	Polygonaceae		chinese rabarber, sierrabarber, turkse rabarber	rhubarbe de chine, rhubarbe palmée, rhubarbe décorative	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

							ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitemen t. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum rhabarbarum L.	Polygonace ae	Rheum undulatu m L.	rabarber	rhubarbe des jardins	wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De analyseresul taten moeten beschikbaar	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïd es totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque

							zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rheum rhaponticum L.	Polygonaceae				wortel, wortelstok	racine, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden*	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés

							(uitgedrukt als rhéine) hoger dan 25 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	en rhéine) supérieure à 25 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rhodiola crenulata	Crassulaceae		rozewortel	orpin rose	wortel	racine		

(Hook. f. & Thomson) Ohba								
Ribes nigrum L.	Grossularia ceae		zwarte aalbes	groseillier noir, cassis, cassissier	knop, vrucht, blad	bourgeon , fruit, feuille		
Ribes rubrum L.	Grossularia ceae		aalbes, trosbes	groseillier à grappes	vrucht, blad	fruit, feuille		
Ribes uva- crispa L.	Grossularia ceae		kruisbes	groseillier épineux, groseillier à maquereau	vrucht, blad	fruit, feuille		
Robinia pseudoacaci a L.	Leguminosa e		gewone robinia, valse acacia	robinier faux- acacia	gekookte bloem, gekookte zaad	fleur cuite, graine cuite		
Rocella phycopsis Ach.	Rocellaceae	Rocella tinctoria DC.			thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentratio n en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Rosa canina L.	Rosaceae		hondsroos	rosier des chiens,	bloem, vrucht,	fleur, fruit,feuil		

				eglantier commun	blad, zaad	le, graine		
Rosa x centifolia L. (pro sp.)	Rosaceae		franse provenceroos , provenceroos	rosier cent- feuilles, rose pâle	bloem, blad	fleur, feuille		
Rosa gallica L.	Rosaceae		franse roos	rosier de france, rosier de provins	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit,feuil le, graine		
Rosa moschata Mill.	Rosaceae		echte muskusroos	rosier musqué	bloem, vrucht, blad, zaad	fleur, fruit,feuil le, graine		
Rosa rubiginosa L.	Rosaceae		egellantier	rosier rouillé, rosier rubigineux, rosier églantier	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit,feuil le		
Rosa x damascena Mill.	Rosaceae	Rosa gallica f. trigintipe tala Dieck	damastroos	rosiers de damas	bloem, vrucht, blad	fleur, fruit,feuil le		
Rosmarinus officinalis L.	Lamiaceae		rozemarijn	romarin	bovengron dse delen	parties aériennes		
Rubia cordifolia L.	Rubiaceae		rubia cordifolia l.	rubiaceae	wortel	racine	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n lucidine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable de lucidine.
Rubus caesius L.	Rosaceae		dauwbraam	ronce bleue	bovengron dse delen	parties aériennes		

Rubus chingii var. suavissimus (S. Lee) L.T. Lu	Rosaceae	Rubus suavissimus S. Lee			vrucht	fruit		
Rubus fruticosus L.	Rosaceae		gewone braam	ronce commune, ronce des buissons, murier sauvage	hele plant	plante entière		
Rubus idaeus L.	Rosaceae		gewone framboos	framboisier commun, framboisier	blad, vrucht	feuille, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Rubus rosa L.H. Bailey	Rosaceae				blad, vrucht	feuille, fruit		
Rumex acetosa L.	Polygonaceae		veldzuring	oseille sauvage, oseille des prés, oseille, oseille commune	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine)	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoides totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à

							hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex acetosella L.	Polygonaceae		schapenzuring	petite oseille	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid	La portion journalière recommandée ne doit

							mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig	pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							gebruik zonder deskundig advies.	sans avis d'un spécialiste.
Rumex alpinus L.	Polygonace ae		alpenzuring	oseille des alpes	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïd es totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez

							12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex conglomeratus Murray	Polygonaceae	Rumex acutus Sm.	kluwenzuring	patience agglomérée	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements

							waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	nts suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex crispus L.	Polygonaceae		krulzuring	patience crépue, churelle	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analysesresultaten moeten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles

							beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex longifolius DC.	Polygonaceae				hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïdes	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux*

							n* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	(exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex	Polygonace		ridderzuring	patience à	hele plant	plante	De	La portion

obtusifolius L.	ae			feuilles obtuses, patience sauvage, rumex à feuilles obtuses		entière	aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts	journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïd es totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitemen
--------------------	----	--	--	--	--	---------	--	--

							raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	t. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex patientia L.	Polygonaceae		spinaziezuring	patience des moines, oseille épinard	hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants

							aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Rumex sanguineus L.	Polygonaceae		bloedzuring		hele plant	plante entière	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheïne) hoger dan 14 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en rhéine) supérieure à 14 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit

							etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae		stekelige muizendoorn	fragon, petit houx	hele plant	plante entière	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Ruscus hypoglossum	Asparagaceae				cladode, wortelstok	cladode, rhizome	De etikettering	L'étiquetage doit

L.							moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Sabatia angularis (L.) Pursh	Gentianaceae				bovengronde delen	parties aériennes		
Saccharina latissima (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders	Laminariaceae	Laminaria saccharina (L.) J.V. Lam.	suikerwier	laminaire sucrée, boudier de Neptune	thallus	thallus		
Saccharum officinarum L.	Poaceae		suikerriet	canne à sucre	tak, sap	branche, jus		
Salix alba L.	Salicaceae		schietwilg, knotwilg	saule blanc	schors, knop, bloem, blad	écorce, bourgeon, fleur, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les

							ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescente n onder 18 jaar.	avertisseme nts suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix caprea L.	Salicaceae		boswilg	saule marsault, saule des chèvres, marsaule, marseau	schors	écorce	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Consultez

							apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix fragilis L.	Salicaceae		kraakwilg	saule, fragile, saule cassant	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien

							anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix pentandra L.	Salicaceae		laurierwilg	saule laurier, saule à cinq étamines	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul

							en adolescente n onder 18 jaar.	ants. Ne pas administrer aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Salix purpurea L.	Salicaceae		bittere wilg	osier rouge, saule pourpre	schors, blad	écorce, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescente n onder 18 jaar.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de salicine supérieure à 96 mg. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants. Ne pas administrer aux enfants et

								adolescents de moins de 18 ans.
Salvia hispanica L.	Lamiaceae		chia	chia	olie van het zaad	huile de la graine	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordening (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisation en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Salvia miltiorrhiza Bunge	Lamiaceae		rode salie	sauge de chine	blad, wortel	feuille, racine		
Salvia officinalis L.	Lamiaceae		echte salie	sauge officinale	bovengron dse delen	parties aériennes		
Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams	Lamiaceae	Salvia lavandulifolia Vahl	lavendelsalie	sauge à feuilles de lavande	bovengron dse delen	parties aériennes		
Salvia pratensis L.	Lamiaceae		veldsalie, weidesalie	sauge commune, sauge des prés	bovengron dse delen	parties aériennes		
Salvia sclarea L.	Lamiaceae		scharlei	sauge sclarée	bovengron dse delen	parties aériennes		
Sambucus nigra L.	Adoxaceae		gewone vlier	sureau noir, sureau	hele plant	plante entière	De aanbevolen	La portion journalière

				commun			dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcy anide equivalente n (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalent s en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Sanguisorba minor Scop.	Rosaceae		kleine pimpernel	petite pimprenelle	bovengron dse delen	parties aériennes		
Sanguisorba officinalis L.	Rosaceae		grote pimpernel	sanguisorbe officinale, grande pimprenelle	hele plant	plante entière		
Sanicula elata Buch.- Ham. ex D. Don	Apiaceae	Sanicula europaea L.	heelkruid	sanicle, sanicle d'europe	blad, wortel	feuille, racine		
Santolina chamaecypa rissus L.	Asteraceae		heiligenblo em	santale petit cyprès	bloeiende top, blad, zaad	sommité fleurie, feuille, graine		
Saponaria officinalis L.	Caryophylla ceae		zeepkruid	saponaire officinale	hele plant	plante entière		
Saposhnikov i divaricata (Turcz.) Schischk	Apiaceae	Siler divaricat um (Turcz.) Benth. & Hook. f.		racine de silère	wortel	racine		
Sarcopoteriu m spinosum	Rosaceae	Poterium spinosum		racine de silère	wortelscho rs	écorce de racine	De etikettering	L'étiquetage doit

(L.) Spach		L.					moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Sargassum fusiforme (Harvey) Setchell	Sargassaceae	Hizikia fusiformis (Harvey) Okamura	hijiki, hiziki	hijiki, hiziki	thallus	thallus		
Sarracenia purpurea L.	Sarraceniaceae		paarse trompetbeker plant	sarracénie pourpre	blad, wortelstok	feuille, rhizome		
Satureja hortensis L.	Lamiaceae		bonenkruid	sarriette commune, sarriette, sarriette des jardins	bloeiende top, zaad	sommité fleurie, graine		
Satureja montana L.	Lamiaceae		winterbonenkruid, bergbonenkruid, bergsteentijm	sarriette des montagnes, sarriette vivace	bovengronde delen	parties aériennes		
Satureja thymbra L.	Lamiaceae				bovengronde delen	parties aériennes		
Saussurea	Asteraceae	Saussurea	costus	costus	wortel	racine		

costus (Falc.) Lipsch.		a lappa (Decne.) Sch. Bip.						
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.	Schisandra ceae		schisandra, wu wei zu	schisandra de chine	decoct van tak, gekookt jong blad, vrucht	décoction de branche, jeune feuille cuite, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants.
Schizochytri um microalgae	Thraustoch ytriaceae				olie	huile	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsing rediënt zijn toegelaten (verordenin gen (EG) nr. 258/97 en (EU) 2015/2283).	Seuls les produits conformes à l'autorisatio n en tant que nouvel ingrédient alimentaire sont autorisés (Règlements (CE) n° 258/97 et (UE) 2015/2283).
Scorzonera hispanica L.	Compositae		grote schorseneer	scorsonère d'espagne	wortel	racine		
Scrophularia ningpoensis	Scrophulari aceae		zwart helmkruid	scrophularia ningpoensis	wortel	racine		

Helmsl.				helmsl.				
Scutellaria baicalensis Georgi	Lamiaceae		baikalgliedkruid	scutellaire du lac baïkal	blad, wortel	feuille, racine		
Scutellaria lateriflora L.	Lamiaceae				hele plant	plante entière	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n furano neoclerodan en bevat. De voorwaarde tot analyse vervalt indien door een botanisch certificaat wordt aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en furano néo- clérodanes. Les analyses ne sont pas nécessaires s'il peut être démontré par un certificat botanique que les parties utilisées proviennent de cette plante
Secale cereale L.	Poaceae		rogge	seigle	hele plant	plante entière		
Sedum acre L.	Crassulacea e		muurpeper	orpin âcre	bovengron dse delen	parties aériennes		
Sedum album L.	Crassulacea e		wit vetkruid	orpin blanc, sédum blanc	blad	feuille		

Sedum roseum (L.) Scop.	Crassulaceae	Rhodiola rosea L.	rozenwortel	rhadiole rose, orpin rose	wortel	racine		
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose	Cactaceae	Cereus grandiflorus (L.) Mill.	koningin der nacht	reine de la nuit	bloem	fleur	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden narcissine bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en narcissine.
Sempervivum tectorum L.	Crassulaceae		gewone huislook	joubarbe des toits, barbe de jupiter	bovengronde delen	parties aériennes		
Senna alexandrina Mill.	Leguminosae	Cassia acutifolia Delile, Cassia alexandrina (Garsault) Thell., Cassia angustifolia M.Vahl, Cassia senna L., Senna acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandrina	alexandrijnse senna	séné d'alexandrie	blad, peul	feuille, gousse	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de

		Garsault, Senna angustifolia (Vahl) Batka.					lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna italica Mill.	Leguminosae	Cassia italica (Mill.) F.W.Andr ews			vrucht (peul), blad	fruit (gousse), feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en

							als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna obtusifolia	Fabaceae	Cassia obtusifolia			hele plant	plante entière	De aanbevolen	La portion journalière

(L.) H.S.Irwin & Barneby		a L.					dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts	recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïd es totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitemen
--------------------------------	--	------	--	--	--	--	--	---

							raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	t. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna occidentalis (L.) Link	Leguminosae			faux kinkéliba, café-nègre, café puant, café bâtard, casse-puante	blad	feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer

							toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Senna tora (L.) Roxb.	Leguminosae				blad, zaad	feuille, graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De analysesresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'anthranoïdes totaux* (exprimés en sennoside B) supérieure à 18 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.

							producten. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz	Taxodiaceae		mammoetboom	séquoia géant	jonge bebladerde scheuten	jeunes pousses feuillées	Enkel geglycerineerde koude maceraten zijn toegelaten waarvoor de aanbevolen dagelijkse dosis overeenstemt met	Seuls sont autorisés les macéras froids glycérinés pour lesquels la dose journalière recommandée correspond

							maximum 41 mg equivalent droge plant.	à maximum 41 mg d'équivalent plante sèche.
Serenoa repens (W.Bartram) Small	Arecaceae	Serenoa serrulata (Michx.) G. Nicholson ; Serenoa serrulata (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks .; Sabal serrulata (Michx.) Schult.f.	zaagpalm, zaagpalmetto	sabal, palmier de floride, chou palmiste, palmier d'amérique du nord	vrucht	fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van vetoplosbare bestanddelen hoger dan 256 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de constituants liposolubles supérieure à 256 mg. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin ou pharmacien.
Sesamum indicum L.	Pedaliaceae	Sesamum orientale L.	sesam	sésame	zaad	graine		
Seseli tortuosum L.	Apiaceae				bovengron dse delen	parties aériennes		
Sideritis scardica Griseb.	Lamiaceae		Grieks bergkruid, Griekse bergthee	Grecque The de Montagne, herbe de fer	bovengron dse delen	parties aériennes	Enkel het gebruik van waterige en licht	Seule l'utilisation des extraits aqueux et

				Grec, the du mont Olympe			alcoholische (20%) extracten is toegelaten.	légèrement alcoolisés (20%) est autorisée.
Sideritis syriaca L.	Lamiaceae		bergthee	Thé Grec des Montagnes	bovengron dse delen	parties aériennes	Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (20%) extracten is toegelaten.	Seule l'utilisation des extraits aqueux et légèrement alcoolisés (20%) est autorisée.
Sigesbeckia orientalis L.	Compositae	Sigesbeckia serrata DC.		herbe grasse, herbe divine, herbe saint-paul	blad, wortel	feuille, racine		
Silaum silaus (L.) Shinz Et Thell.	Apiaceae		weidekervel	silaüs des prés	vrucht, wortel	fruit, racine		
Silybum marianum (L.) Gaertn.	Compositae		mariadistel	chardon-marie	bovengron dse delen	parties aériennes		
Simmondsia chinensis (Link) C.K. Schneid.	Simmondsiaceae		jojoba	jojoba	zaad vrij van olie	graine sans huile	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij kinderen, adolescenten onder 18 jaar en tijdens de	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans, ni durant la grossesse.

							zwangerschap.	
Sisymbrium officinale (L) Scop.	Brassicaceae	Erysimum officinale L.	gewone raket	sisymbre officinal, herbe aux chantres, vélar	bovengronde delen	parties aériennes	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden cardioactieve steroïde glycoside bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en glycosides stéroïdes cardiotoniques.
Smilax aristolochiifolia Mill.	Smilacaceae	Smilax medica Schltdl. et Cham.			wortelstok, wortel	rhizome, racine		
Smilax aspera L.	Smilacaceae		struikwinde, s tekende winde	salsepareille d'Europe	wortelstok, wortel, wortelscheut	rhizome, racine, pousse de racine		
Smilax china L.	Smilacaceae		chinawortel	squine	hele plant	plante entière		
Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.	Smilacaceae				wortelstok, wortel	rhizome, racine		
Smilax glabra Roxb.	Smilacaceae				wortelstok, wortel	rhizome, racine		
Smilax officinalis Kunth	Smilacaceae	Smilax tonduzii Apt	echte sarsaparilla	salsepareille	wortel	racine		
Smilax	Smilacaceae	Smilax	ecuadoriaans	smilax	wortelstok	rhizome,		

purhampuy Ruiz	e	febrifuga Kunth	e sarsaparilla	febrifuga kunth	, wortel	racine		
Smilax regelii Killip & C.V. Morton	Smilacaceae		hondurese sarsaparilla, jamaicaanse sarsaparilla	salsepareille, salsepareille du honduras	wortelstok , wortel	rhizome, racine		
Solanum melongena L.	Solanaceae	Solanum ovigerum Dun.	aubergine	aubergine	vrucht, wortel	fruit, racine		
Solanum tuberosum L.	Solanaceae		aardappel	pomme de terre	knol	tubercule		
Solidago virgaurea L.	Compositae		echte guldenroede	solidage verge d'or	bovengron dse delen	parties aériennes		
Sorbus aucuparia L.	Rosaceae		wilde lijsterbes	sorbier des oiseleurs	bovengron dse delen	parties aériennes		
Sorghum bicolor (L.) Moench	Poaceae		kafferkoren, durra, kafir	sorgho commun	zaad, jonge scheut	graine, jeune pousse	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcy anide equivalente n (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalent s en cyanure d'hydrogène (libre et lié) supérieure à 5 mg.
Spatholobus suberectus Dunn.	Leguminosae				stam	tige	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une

							een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdc component) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Spargularia rubra (L.) J.Presl & C. Presl.	Caryophyllaceae		rode schijnspurrie	spargulaire rouge	bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Spinacia oleracea L.	Amaranthaceae		spinazie	epinard	blad	feuille		
Spirulina	Pseudanaba	Spirulina	spirulina	spiruline	ééncellige	algue		

major Kützing ex Gomont	enaceae	major Kützing			alg	unicellula ire		
Spirulina maxima (Setchell & Gardner) Geitler	Pseudanaba enaceae	Arthrospi ra maxima Setchell & Gardner	spirulina	spiruline	ééncellige alg	algue unicellula ire		
Spirulina platensis (Gomont) Geitler	Pseudanaba enaceae		spirulina platensis, platensis	spirulina platensis, platensis, spiruline, algue de vie	ééncellige alg	algue unicellula ire		
Stachys officinalis (L.) Trevis.	Lamiaceae	Betonica officinalis L.	betonie	bétoine	bovengron dse delen	parties aériennes		
Stachys recta L.	Lamiaceae		bergandoorn	épiaire droite	bovengron dse delen	parties aériennes		
Stachys sylvatica L.	Lamiaceae		bosandoorn	épiaire des bois, ortie puante	bovengron dse delen	parties aériennes		
Stellaria media (L.) Vill.	Caryophylla ceae		vogelmuur	stellaire intermédiaire, morgeline	bovengron dse delen	parties aériennes		
Stemmacant ha carthamoide s (Willd.) Dittrich	Asteraceae	Rhaponti cum carthamo ides (Willd.) Iljin		rhapontique des alpes	wortel	racine		
Styphnolobiu m japonicum (L.) Schott	Leguminosa e	Sophora japonica L.	honingboom	sophora du japon	gekookt jong blad, bloem, bloemknop , decoct van het	jeune feuille cuite, fleur, bouton floral,	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient

					zaad, decoct van de stengel	décoction de la graine, décoction de la tige	detecteerba re hoeveelhede n alkaloïden bevat.	aucune quantité détectable en alcaloïdes.
Symplocos racemosa Roxb.	Symplocace ae				bast	liber		
Syringa vulgaris L.	Oleaceae		sering	lilas commun, lilas français	bladknop	bourgeon de feuille		
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry	Myrtaceae	Caryophy llus aromatic us L., Eugenia caryophyl lata Thunb. (nom. illeg.) Mansfeld	kruidnagelbo om	girofle, girofler, gérofler	bloemknop	bourgeon de fleur		
Syzygium cumini (L.) Skeels	Myrtaceae		jambolan	jamblon, jamelonier	schors, vrucht, blad, zaad	écorce, fruit, feuille, graine		
Syzygium jambos (L.) Alston	Myrtaceae		rozenappel	jamrosat, jambrosade, jambosier, jam-rose, pomme rose	vrucht, blad	fruit, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van waterstofcy anide equivalente	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'équivalent s en cyanure d'hydrogène (libre et lié)

							n (vrij en gebonden) hoger dan 5 mg.	supérieure à 5 mg.
Syzygium malaccense (L.) Merr. Et L. M. Perry.	Myrtaceae		djamboe bol, maleisische rozenappel, maleisische wasappel	jambosier rouge	blad	feuille		
Tagetes erecta L.	Compositae		groot afrikaantje	rose d'inde	bovengron dse delen	parties aériennes		
Tagetes minuta L.	Compositae		geelgroen afrikaantje	tagète des décombres	bovengron dse delen	parties aériennes		
Tamarindus indica L.	Leguminosae		tamarindeboom	tamarinier	vrucht	fruit		
Tamarix gallica L.	Tamaricaceae		franse tamarisk	tamaris commun, tamaris de france, tamarix commun, tamarix de france	jonge bladscheut	jeunes pousse		
Tanacetum balsamita L.	Compositae		balsemwormkruid	menthe-coq	bovengron dse delen	parties aériennes		
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.	Compositae		moederkruid	grande camomille	bovengron dse delen	parties aériennes		
Tanacetum vulgare L.	Compositae		boerenwormkruid	tanaisie vulgaire	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de thuyone supérieure à

							mg.	6 mg.
Taraxacum campylodes G.E.Haglund	Asteraceae	Taraxacum officinale Web.	paardebloem	pissenlit, dent de lion	hele plant	plante entière		
Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae		bibhitaki, bastaard myrobalaan	bibhitaki	vrucht	fruit		
Terminalia chebula Retz.	Combretaceae		zwarte myrobalaan	badamier chebule, myrobalan chebule	vrucht	fruit		
Thalictrum flavum L.	Ranunculaceae		poelruit	pigamon	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoléiniques (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Theobroma cacao L.	Malvaceae		cacaoboom	cacaoyer	zaad	graine		
Thlaspi arvense L.	Brassicaceae		witte krodde, boerenkers	tabouret des champs, monnoyère	zaad	graine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion de

							hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Voor personen met hypothyreoïdie of onder schildklier behandeling , uw arts raadplegen.	progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Thymus satureioides Coss.	Lamiaceae		satureja tijd	thym saturéoïde	bovengron dse delen	parties aériennes		
Thymus serpyllum L.	Lamiaceae		wilde tijd, veldtijd, citroentijd	serpolet à feuilles étroites, piolet, thym	bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende	L'étiquetage doit comporter les

				sauvage, thym rouge			waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	avertisseme nts suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
Thymus vulgaris L.	Lamiaceae		echte tijm, hooitijm, roomse kwendel, tijmoes	thym commun, thym vrai, pouilleux, frigouille	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 4 g gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 4 g de plante séchée. L'étiquetage doit comporter les avertisseme nts suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

							ap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
Thymus zygis L.	Lamiaceae		spaanse tijm, rode tijm	thym d'espagne, thym rouge	bovengron dse delen	parties aériennes		
Tilia americana L.	Malvaceae		amerikaanse linde	tilleul d'amérique	bovengron dse delen	parties aériennes		
Tilia cordata Mill.	Malvaceae		winterlinde, kleinbladige linde	tilleul à petites feuilles, tilleul des bois, tilleul à feuilles en cœur	hele plant	plante entière		
Tilia platyphyllos Scop.	Malvaceae		zomerlinde, grootbladige linde	tilleul à larges feuilles	hele plant	plante entière		
Tilia tomentosa Moench	Malvaceae	Tilia argentea DC.	zilverlinde	tilleul argenté	hele plant	plante entière		
Tilia x europaea L.	Malvaceae	Tilia x vulgaris B. Heyne	hollandse linde	tilleul de hollande, tilleul commun	schors, bloem, blad, zaad	écorce, fleur, feuille, graine		
Tinospora cordifolia (Willd.) Miers	Menispermaceae				wortel, stengel, blad	racine, tige, feuille	Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte delen afkomstig	Un certificat botanique doit démontrer que les parties utilisées proviennent de cette

							zijn van deze plant. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	plante. La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'alkaloïdes isoquinoléiniques (exprimée en berbérine) supérieure à 10 mg.
Trachyspermum ammi (L.) Sprague	Apiaceae		ajowan	ajowan	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Tragopogon porrifolius L.	Compositae		paarse morgenster, boksbaard	salsifis cultivé	wortel	racine		
Tribulus terrestris L.	Zygophyllaceae		tribulus	croix-de-malte, tribule terrestre	gekookte plantendelen van de hele plant	parties de plantes cuites de la plante	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire

						entière	leiden tot een inname van saponinen hoger dan 15 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling of antidiabetische behandeling . Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 21	à une ingestion de saponines supérieure à 15 mg. L'étiquetage doit comporter les avertissements suivants : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre l'hypertension ou le diabète. Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 21 ans.
--	--	--	--	--	--	---------	--	---

Trichilia catigua A. Juss.	Meliaceae		catuaba	catuaba	schors	écorce	jaar. Een gedetailleer de botanische identificatie is vereist. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n tropaan alkaloïden bevat.	Une identificatio n botanique détaillée est requisse. L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en alcaloïdes tropolitaniques.
Trichosanthe s kirilowii Maxim.	Cucurbitac eae		chinese komkommer	concombre chinois	vrucht (pericarp en zaad)	fruit (péricarp e et graine)	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n trichosanthi ne bevat.	L'analyse doit démontrer que la préparation ne contient aucune quantité détectable en trichosanthi ne.
Tridax procumbens L.	Compositae				bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez

							bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagul ants.
Trifolium arvense L.	Leguminosa e		hazenpootje	pied-de- lièvre, trèfle des champs, trèfle	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcompo nent) hoger dan 40 mg. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trifolium campestre Schreb.	Leguminosa e		liggende klaver	trèfle des champs	bovengron dse delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire

							leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdc component) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trifolium pratense L.	Leguminosae		rode klaver	trèfle des prés, trèfle rouge, triolet	bovengronde delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdc component) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles

							beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	pour chaque lot de produits.
Trifolium repens L.	Leguminosae		witte klaver	trèfle rampant, trèfle blanc, coucou	bovengronde delen	parties aériennes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg. De analyseresultaten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'isoflavones (exprimés en glycoside du composant principal) supérieure à 40 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits.
Trigonella caerulea (L.) Ser.	Leguminosae		zevengetijdeklaver	trigonelle bleue	bovengronde delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.

							zwangerschap.	
Trigonella foenum-graecum L.	Leguminosae		fenegriek	fenugrec	zaad	graine	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Trillium erectum L.	Melanthiaceae		drieblad, boslelie	trille rouge, trille dressé	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Triticum aestivum L.	Poaceae	Triticum vulgare Vill. ; Triticum sativum Lam.	gewone tarwe	blé commun, froment	bovengronde delen	parties aériennes		
Triticum dicoccon (Schrank.) Schübl.	Poaceae		emmertarwe, emmer, tweekoren	amidonnier	vrucht	fruit		
Triticum	Poaceae	Triticum	harde tarwe	froment dur	scheut,	pousse,		

durum Desf.		turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husnot			zaad	graine		
Triticum spelta L.	Poaceae		spelt	épeautre	scheut, zaad	pousse, graine		
Triticum turgidum L.	Poaceae		engelse tarwe	blé barbu, gros blé	scheut, zaad	pousse, graine		
Tropaeolum majus L.	Tropaeolac eae		oost-indische kers	grande capucine	bovengron dse delen zonder vrucht	parties aériennes sans fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Voor personen	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Pour les personnes en

							met hypothyreoï die of onder schildklier behandeling , uw arts raadplegen.	hypothyroïdi e ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Tropaeolum minus L.	Tropaeolac eae				bovengron dse delen zonder vrucht	parties aériennes sans fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De analyseresul taten moeten beschikbaar zijn voor elk lot van producten. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Voor personen	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion de progoitrine supérieure à 20 mg et de goitrine supérieure à 5 mg. Les résultats d'analyse doivent être disponibles pour chaque lot de produits. L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Pour les personnes en

							met hypothyreoï die of onder schildklier behandeling , uw arts raadplegen.	hypothyroïdi e ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin.
Tsuga canadensis (L.) Carrière	Pinaceae		oostelijke, canadese hemlockspar	pruche du canada, pruche de l'est	blad, hars	feuille, résine		
Turnera diffusa Wild. ex Schult.	Passiflorace ae		damiaanblad, damiana	feuilles de damiana, turnéra	bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	L'étiquetage doit comporter l'avertissem ent suivant : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre le diabète.
Ulmus glabra Huds.	Ulmaceae	Ulmus campestri s L.; Ulmus scabra Mill.	ruwe olm, ruwe iep, bergiep	orme des montagnes, orme rude, orme blanc	schors, knop	écorce, bourgeon		
Ulmus	Ulmaceae		siberische iep	orme de	schors,	écorce,		

pumila L.				sibérie	blad	feuille		
Ulmus rubra Muhl.	Ulmaceae	Ulmus fulva Michx.	rode iep	orme rouge	schors	écorce		
Ulva lactuca L.	Ulvaceae		zeesla	laitue de mer	thallus	thallus		
Uncaria gambir (Hunter) Roxb.	Rubiaceae		cachou, gambir, gambirstruik	cachou gambir, arbre catechu	bovengron dse delen	parties aériennes		
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil.	Rubiaceae	Nauclea rhynchophylla Miq.			haak	crochet		
Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.	Rubiaceae		katsklauw	griffe de chat	schors, stam, wortel	écorce, tige, racine		
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar	Alariaceae	Alaria pinnatifida Harvey	wakame	wakamé	thallus	thallus		
Urtica dioica L.	Urticaceae		grote brandnetel	ortie dioïque, grande ortie	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une

							hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.
Urtica urens L.	Urticaceae		kleine brandnetel	ortie brûlante, petite ortie	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de la racine ou le rhizome: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente

							met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	à 3,2 g de rhizome séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.
Usnea barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Parmeliaceae		baardmos	usnée, barbe de saint-antoine, barbe de jupiter	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Usnea longissima Ach.	Parmeliaceae		baardmos	usnée, mousse d'espagne	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid	La portion journalière recommandée ne doit

							mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Usnea plicata Wiggers	Parmeliaceae				thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van usninezuur hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion d'acide usnique supérieure à 30 mg. La concentration en acide usnique dans le produit fini ne peut pas dépasser 3 %.
Vaccinium myrtilloïdes Michx.	Ericaceae	Vaccinium angustifol		airelle fausse-myrtille,	vrucht, blad	fruit, feuille		

		ium var. myrtilloides (Michx.) House		bleuet, bleuet sauvage				
Vaccinium corymbosum L.	Ericaceae		blauwe bes	myrtille arbustive, grande myrtille, myrtille américaine, bleuet géant, corymbelle	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium macrocarpon Aiton	Ericaceae		grote veenbes, cranberry	canneberge à gros fruits, airelle à gros fruits	bes	baie		
Vaccinium myrtillus L.	Ericaceae		blauwe bosbes	myrtille commune, myrtillier, baies de myrtille	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium oxycoccus L.	Ericaceae	Oxycoccus palustris Pers.	kleine veenbes	canneberge des marais, airelle canneberge, canneberge ou atocas	vrucht	fruit		
Vaccinium uliginosum L.	Ericaceae		rijsbes	myrtille des marais	vrucht, blad	fruit, feuille		
Vaccinium vitis-idaea L.	Ericaceae		rode bosbes	airelle, airelle vigne d'ida, airelle rouge	vrucht, blad	fruit, feuille	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une

							een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 6,8 g gedroogd blad. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	ingestion supérieure à la quantité équivalente à 6,8 g de feuille séchée. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Valeriana jatamansi Jones	Valerianaceae	Valeriana wallichii DC.	indische valeriaan	valériane d'inde	wortel	racine	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g gedroogde wortel. De in te nemen bereiding	La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g de racine séchée. La forme finale à consommer

							mag geen valepotriate n bevatten.	ne peut pas contenir de valépotriate s.
Valeriana officinalis L.	Caprifoliace ae		echte valeriaan	valériane officinale, valériane des collines, valériane à petites feuilles	ondergron dse delen	parties souterrai nes	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g gedroogde ondergronds e delen. De in te nemen bereiding mag geen valepotriate n bevatten.	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 3,6 g des parties souterraines séchées. La forme finale à consommer ne peut pas contenir de valépotriate s.
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Caprifoliace ae	Valeriana locusta L.	veldsla, korensla, ezelsoor	mâche, blanchette, boursette, clairette, raiponce, oreillette, salade de blé	blad	feuille		
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews	Orchidacea e		vanille- orchidee	vanille	vrucht, oliehars	fruit, oléorésin e		
Verbascum	Scrophulari		stalkaars	bouillon	bovengron	parties		

densiflorum Bertol.	aceae			blanc à grandes fleurs, molène à fleurs denses, bonhomme, molène	dse delen	aériennes		
Verbascum phlomoides L.	Scrophulariaceae		keizerskaars	molène faux-phlomis	bloem	fleur		
Verbascum thapsus L.	Scrophulariaceae		koningskaars	bouillon blanc à petites fleurs	bovengron dse delen	parties aériennes		
Verbena officinalis L.	Verbenaceae		ijzerhard	verveine sauvage, verveine officinale	bovengron dse delen	parties aériennes	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse.
Veronica anagallis-aquatica L.	Plantaginaceae		blauwe waterereprijs	véronique mouron d'eau, mouron aquatique	hele plant	plante entière		
Veronica beccabunga L.	Plantaginaceae		beekpunge	véronique des ruisseaux, cresson de cheval, salade de	bovengron dse delen	parties aériennes		

				chouette				
Veronica chamaedrys L.	Plantaginaceae		gewone ereprijs, gamander-ereprijs	véronique petit-chêne, fausse germandrée	hele plant	plante entière		
Veronica officinalis L.	Plantaginaceae		mannetjesereprijs	véronique officinale, thé d'europe	bovengron dse delen	parties aériennes		
Viburnum lantana L.	Adoxaceae		wollige sneeuwbal	viorne mancienne, viorne lantane, mansienne	bovengron dse delen	parties aériennes		
Viburnum opulus L.	Adoxaceae		gelderse roos	viorne obier, boule-de-neige	bovengron dse delen	parties aériennes		
Vicia faba L.	Leguminosae		tuinboon, labboon	fèves, féverolles	gekookt zaad	graine cuite	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij favisme.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de favisme.
Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi	Leguminosae	Phaseolus chrysanthos Savi	adzukiboon	haricot azuki	gekookt of geweekt zaad	graine cuite ou trempée		
Viola calcarata L.	Violaceae		langsporig viooltje	pensée des alpes	bovengron dse delen	parties aériennes		
Viola odorata L.	Violaceae		maarts viooltje	violette odorante	bovengron dse delen	parties aériennes		
Viola palustris L.	Violaceae		moerasviooltje	violette des marais	bovengron dse delen	parties aériennes		

Viola tricolor L.	Violaceae		driekleurig viooltje	pensée sauvage, violette tricolore des jardins, pensée tricolore	bovengronde delen	parties aériennes		
Viscum album L.	Santalaceae		maretak	gui	tak, blad	branche, feuille		
Vitex agnus-castus L.	Lamiaceae		monnikkenpeper, kuisboom	gatillier, agneau-chaste	hele plant	plante entière	Voor voedingssupplementen met bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 96 mg gedroogde vrucht. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken	Pour les compléments alimentaires avec des préparations de fruit: La portion journalière recommandée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 96 mg de fruit séché. L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou

							tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	d'allaitement.
Vitex trifolia L.	Lamiaceae				vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	L'étiquetage doit comporter l'avertissement suivant : Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Vitis vinifera L.	Vitis Vitaceae		druif, wijnstok, wijngaardstok	vigne cultivée, vigne vinifère	vrucht, bladknop, blad, zaad	fruit, bourgeon de feuille, feuille, graine		
Withania somnifera (L.) Dunal	Solanaceae		ashwagandha , indiase ginseng	ashwagandha, ginseng indien	hele plant	plante entière		
Xeranthemum annuum L.	Compositae		papierbloem	immortelle	bloem	fleur		
Yucca filamentosa L.	Asapragaceae		palmlelie	yucca filamenteux	bovengronde delen	parties aériennes		
Yucca schidigera Roetz ex Ortgies	Asapragaceae				bovengronde delen	parties aériennes		
Zea mays L.	Poaceae		maïs	maïs	bloem,	fleur,		

					vrucht, haarwortel s van gekiemde zaad	fruit, radicelles de graine germée		
Zingiber officinale Rosc.	Zingiberace ae		gementer	gingembre, amome des indes	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 1,5 g gedroogde wortelstok voor adolescente n en volwassenen en de hoeveelheid equivalent met 0,75 g gedroogde wortelstok voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet	La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à la quantité équivalente à 1,5 g de rhizome séché pour adolescents et adultes et à la quantité équivalente à 0,75 g de rhizome séché pour les enfants de 6 à 12 ans. La portion journalière recommand ée ne doit pas conduire à une ingestion supérieure à 1 g de

							leiden tot een inname hoger dan 1 g gedroogde wortelstok voor zwangere vrouwen (extracten zijn niet toegelaten). Het gebruik voor kinderen onder 6 jaar is niet toegestaan.	rhizome séché pour les femmes enceintes (les extraits ne sont pas autorisés). L'utilisation pour les enfants de moins de 6 ans n'est pas autorisée.
Ziziphus jujuba Mill.	Rhamnaceae		jujubeboom, chinese dadel	jujubier, dattier chinois	bovengronde delen	parties aériennes		

* Het "totaal" gehalte aan anthranoiden dient berekend te worden via bepaling van de gehalten in de afzonderlijke grondstoffen en vervolgens, op basis van de toegediende mengverhoudingen, gesommeerd te worden. Bij mengsels van verschillende plantensoorten is het totaal gehalte te beperken tot de maximale dosis toegelaten voor het ingrediënt waarvoor de laagste dosis geldt bij enkelvoudig gebruik.

* Pour calculer la teneur "totale" en anthranoides, il faut déterminer les teneurs de chaque composant séparément et ensuite, en fonction des dosages administrés, en faire la somme. Pour les mélanges de différentes espèces de plantes, la teneur totale est limitée à la dose maximale autorisée de l'ingrédient auquel s'applique la dose la plus faible en cas d'utilisation simple.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 december 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 décembre 2023 modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.

Van Koningswege:

Par le Roi:

De Minister van Landbouw,

Le Ministre de l'Agriculture,

David CLARINVAL

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

Frank VANDENBROUCKE
