

Kingdom of Belgium

**FEDERAL PUBLIC SERVICE (FPS)
PUBLIC HEALTH, FOOD CHAIN
SAFETY AND ENVIRONMENT**

**Royal Decree amending the Royal
Decree of 31 August 2021 on the
manufacture of and trade in foods
composed of or containing plants or
plant preparations**

PHILIPPE, King of the Belgians,

To all those present and to come,
Greetings.

Having regard to Article 2 of the Law of
24 January 1977 on the protection of
consumer health in relation to foods and
other products, Article 2,
subparagraphs 1 to 3;

Having regard to the Royal Decree of
31 August 2021 on the manufacture of
and trade in foods composed of or
containing plants or plant preparations;

Having regard to the communication to
the European Commission on XXX, [date]
pursuant to Article 5(1) of Directive (EU)
2015/1535 of the European Parliament
and of the Council of 9 September 2015
laying down a procedure for the provision
of information in the field of technical
regulations and of rules on Information
Society services;

Having regard to the opinion of the
Advisory Council on food policy and use
of other consumer products, issued on
27 May 2025;

Having regard to the opinion of the
Advisory Commission for Plant
Preparations, issued on 24 June 2025;

Having regard to the opinion of the

Having regard to Opinion xxx of the Council of State issued on [date], pursuant to Article 84(1), first subparagraph, point 2 of the consolidated laws on the Council of State of 12 January 1973;

Considering Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004;

Considering Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 establishing the Union list of novel foods in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods;

Considering Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006;

Considering that plants, whether or not listed in the Annex, for which human consumption remained negligible until 15 May 1997 in the European Union, fall under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament

and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001;

On the proposal of the Minister for Agriculture and the Minister for Public Health,

WE HAVE DECREED AND DECREE
HEREWITH:

Article 1. In Article 3(2) of the Royal Decree of 31 August 2021 on the manufacture of and trade in foods composed of or containing plants or plant preparations, in the French text the first subparagraph is replaced by the following:

‘It shall be prohibited to manufacture and place on the market plant preparations obtained from plants listed in List 1 of the Annex to this Decree as such or as components incorporated in foodstuffs’.

Article 2. Article 4(1) of the same Decree is replaced by the following:

(1) It shall be prohibited to manufacture and place on the market as such or as components incorporated into foodstuffs:

(a) mushrooms that are not included in List 2 of edible mushrooms in the Annex to this Decree;

(b) foodstuffs containing mushrooms that are not included in List 2 of edible mushrooms in the Annex to this Decree;

(c) mushrooms included in List 2 of edible mushrooms in the Annex to this Decree and

(1) whose state of freshness may constitute a health hazard, or

(2) which contain insects, parts of insects or insect debris or other organic waste;

(d) wild mushrooms included in List 2 of edible mushrooms in the Annex to this Decree and

(1) which are in pieces or damaged to the extent that their species is no longer recognisable to the naked eye; if these mushrooms undergo treatment that alters their appearance, the species must be recognisable to the naked eye prior to such treatment, or

(2) which are placed on the market fresh, packaged or in bulk, whole or in pieces, whether or not mixed with other

ingredients and

- for which the use-by date is not indicated, or

- whose species name (the 'Scientific name', the 'Dutch name' and/or the 'French name'), as set out in List 2 of edible mushrooms in the Annex to this Decree, is not indicated;

Article 3. In the same Decree, the Annex is replaced by the Annex attached to this Decree.

Article 4. Foodstuffs that do not meet the conditions referred to in this Decree but do meet the conditions that applied before the entry into force of this Decree may be placed on the market until no later than two years after the date of entry into force of this Decree.

Article 5 The Minister in charge of food chain safety and the Minister in charge of public health are responsible, each one insofar as it concerns them, for the execution of this Decree.

(Place), (date).

By the King:

The Minister for Agriculture,

David CLARINVAL

The Minister for Public Health,

Frank VANDENBROUCKE

BIJLAGE bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

Lijst 1 : Gevaarlijke planten die niet als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden

ANNEX to the Royal Decree amending the Royal Decree of 31 August 2021 on the manufacture of and trade in foods composed of or containing plants or plant preparations

ANNEX to the Royal Decree of 31 August 2021 on the manufacture of and trade in foods composed of or containing plants or plant preparations

List 1: Dangerous plants that cannot be used as such or in foodstuffs

Wetenschappelijke naam / Scientific name	Familie / Family	Synoniemen / Synonyms	Nederlandse naam / Dutch name	Franse naam / English name	Beperkingen en afwijkingsvoorwaarden	Restrictions and conditions of derogation
Abrus precatorius L.	Leguminosae		weesboontje	rosary pea		
Aconitum spp.	Ranunculaceae		monnikskap	monkshood		
Actaea spicata L.	Ranunculaceae		christoffelkruid	baneberry		
Adenium spp.	Apocynaceae					
Adonis spp.	Ranunculaceae		voorjaarsadonis	spring adonis		
Aethusa cynapium L.	Apiaceae		hondspeterselie	fool's parsley		
Agapanthus spp.	Amaryllidaceae		afrikaanse lelie	African lily		
Agrostemma githago L.	Caryophyllaceae		bolderik	corncockle		
Aletris farinosa L.	Nartheciaceae					
Aleurites spp.	Euphorbiaceae		o.a. houtolieboom	wood oil tree, among others		
Aleurites moluccana (L.)	Euphorbiaceae		kemiri, kukui	kemiri, kukui	Een afwijking voor het gebruik van	A derogation may be requested for

Willd.					niet geraffineerde olie kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat phorbolesters en/of eleostearinezuur bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze phorbolesters en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor eleostearinezuur.	use of the unrefined oil and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing phorbol esters and/or eleostearic acid, regardless of its source, does not lead, respectively, to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these phorbol esters and the scientifically established DNEL value of the eleostearic acid.
Alkanna spp.	Boraginaceae		alkanna	alkanna		

Amaryllis spp.	Amaryllidaceae		amaryllis	amaryllis		
Ammi majus L.	Apiaceae		groot akkerscherm	Bishop's weed		
Anacyclus officinarum Hayne	Anacyclus		duitse bertram	German bertram		
Anacyclus pyrethrum (L.) Link.	Anacyclus		roomse bertram	Roman bertram		
Anadenanthera spp.	Leguminosae					
Anagallis arvensis L.	Primulaceae		guichelheil	pimpernel		
Anamirta cocculus (L.) Wight and Arn.	Menispermaceae		kokkelkorrelstruik	cockle grain bush		
Anchusa spp.	Boraginaceae		ossentong	ox tongue		
Andromeda spp.	Ericaceae		lavendelhei	bog-rosemary		
Anemone spp.	Ranunculaceae		anemoon	anemone		
Galipea officinalis Hancock, Cusparia officinalis (Hancock.) Engl. (zie ook lijst 3/see also List 3)		Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias, Cusparia trifoliata (Willd) Engl.	angusturaboom	angustura tree		
Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. Coul.	Cactaceae	Anhalonium lewinii Henning	peyote, peyotl	peyote, peyotl		
Annona spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Annonaceae		o.a. zuurzakboom	graviola tree, among others		
Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.	Moraceae		upas	upas		
Aquilegia vulgaris L.	Ranunculaceae		wilde akelei	wild columbine		

Areca catechu L.	Arecaceae		areka, betelnootpalm	areka, betel nut palm		
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.	Compositae	Chrysanthemum frutescens L.	struikmargriet	bush daisy		
Arisaema spp.	Araceae		o.a. drakeraap	dragon monkey, among others		
Aristolochia serpentaria	Aristolochiaceae		pijpbloem	pipe flower		
Arnica chamissonis Less.	Compositae		valkruid	arnica		
Arnica montana L.	Compositae		valkruid	arnica		
Artemisia annua L.	Compositae		zomeralsem	summer wormwood		
Arum maculatum L.	Araceae		gevlekte aronskelk	lords-and-ladies		
Asarum canadense L.	Aristolochiaceae		Canadese mansoor	Canadian mansoor		
Asarum europaeum L.	Aristolochiaceae		mansoor	mansoor		
Aspidosperma spp.	Apocynaceae					
Athyrium filix- femina (L.) Roth	Athyriaceae		wijfjesvaren	female fern		
Atractylis gummifera (L.) Less.	Compositae					
Atropa spp.	Solanaceae					
Aucuba japonica Thunb.	Garryaceae		broodboom	locust tree		
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.	Compositae	Eupatorium triplinerve Vahl				
Baccharis spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Compositae					

Baptisia spp.	Leguminosae					
Baptisia tinctoria (L.) R.Br.	Leguminosae		wilde indigo, verflupine	wild indigo, verflupine	Een afwijking voor het gebruik van de wortel kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat cytisine bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor cytisine.	A derogation may be requested for use of the root and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing cytisine, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of cytisine.
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb.	Iridaceae	Belamcanda chinensis (L.) DC.	luipaardbloem	leopard flower		
Borago spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Boraginaceae		incl. bernagie	incl. borage	Het gebruik van kleine hoeveelheden bloemen van <i>Borago officinalis</i> L. in culinaire bereidingen is toegelaten.	The use of small quantities of flowers of <i>Borago officinalis</i> L. in culinary preparations is authorised.

Brachyglottis spp.	Compositae					
Brayera anthelmintica Kunth	Rosaceae	Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel.	kosoboom	kosso tree		
Brugmansia spp.	Solanaceae					
Brunfelsia spp.	Solanaceae					
Bryonia sp.	Cucurbitaceae		o.a. heggerank	bryony		
Buxus sempervirens L.	Buxaceae		palmboompje	Common box		
Caladium spp.	Araceae			Caladium		
Calea zacatechichi Schltdl	Compositae		droomkruid	dream herb		
Calla palustris L.	Araceae		slangewortel	bog arum, snakeroot		
Caltha palustris L.	Ranunculaceae		dotterbloem	marsh marigold		
Canarium indicum L.	Burseraceae		nangainoten	nangai nuts	Voor de gedroogde noten zijn enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënten toegelaten (uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470).	For dried nuts, only products complying with the authorisation as a novel food ingredient are authorised (Implementing Regulation (EU) 2017/2470).
Cannabis sativa L.	Cannabaceae		hennep	hemp	Het gebruik van hennepzaden en daarvan afgeleide producten kan worden toegestaan indien het voedingsmiddel voldoet aan de	The use of hemp seeds and products derived therefrom may be authorised if the food complies with the provisions of Section 2.6 (delta-

					bepalingen van sectie 2.6 (delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ^9 -THC)-equivalenten) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Deze conformiteit dient te worden aangetoond voor elk lot van hennepzaad of hennepolie.	9-tetrahydrocannabinol (Δ^9 -THC) equivalenten) of Annex I to Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006. This compliance must be demonstrated for each batch of hemp seeds or hemp oil.
Caragana arborescens Lam.	Leguminosae		erwtenstruik	pea bush		
Carlina spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Compositae					
Caryota spp.	Arecaceae			e.g. palmier céleri		
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl.	Celastraceae		qat	qat, khat		
Catharanthus roseus (L.) G.Don	Apocynaceae		roze maagdenpalm	pink periwinkle, Madagascar/Cap		

				e periwinkle		
Caulophyllum thalictrifolium (L.) Michx.	Berberidaceae		blauwe zilverkaars	blue cohosh		
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L.Andersson	Rubiaceae	Cephaelis acuminata Karst., Uragoga granatensis Baill., Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill., Cephaelis ipecacuanha (Brot.) Tussac	braakwortel	Ipecac		
Erysimum × cheiri (L.) Crantz	Brassicaceae	Cheiranthus x cheiri L.	muurbloem	wallflower		
Cestrum spp.	Solanaceae					
Ceterach officinarium DC.	Aspleniaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidinge n indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat ptaquiloside bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing ptaquiloside, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the

					de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor ptaquiloside.	scientifically established DNEL value of ptaquiloside.
Chamaelirium luteum (L.) A. Gray	Melanthiaceae		helonias	helonias		
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	Chenopodium ambrosioides L.	welriekende ganzevoet	fragrant goosefoot		
Cibotium barometz (L.) J. Sm.	Dicksoniaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat ptaquiloside bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor ptaquiloside.	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing ptaquiloside, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of ptaquiloside.
Cicuta virosa L.	Apiaceae		waterscheerling	water hemlock		

Cineraria spp.	Compositae			Cineraria		
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.	Cucurbitaceae	Cucumis colocynthis L.	kolokwint	colocynth		
Clivia miniata (Lindl.) Bosse	Amaryllidaceae		clivia, sint-Jozefsbloem	clivia, St. Joseph Flower		
Clusia rosea Jacq.	Clusiaceae					
Cnidioscolus spp.	Euphorbiaceae					
Colchicum autumnale L.	Colchicaceae		herfsttijloos	colchicum		
Colutea arborescens L.	Leguminosae		europese blazenstruik	bladder senna		
Comandra spp.	Santalaceae					
Conium maculatum L.	Apiaceae		gevlekte scheerling	spotted hemlock		
Convallaria majalis L.	Asparagaceae		lelietje-van-dalen, meiklokje	lily-of-the-valley		
Convolvulus arvensis L.	Convolvulaceae		akkerwinde	bindweed		
Convolvulus scammonia L.	Convolvulaceae		purgeerwinde	purple bindweed		
Coriaria myrtifolia L.	Coriariaceae		looiersstruik	tanner's bush		
Coriaria thymifolia Humb. and Bonpl.	Coriariaceae					
Corydalis spp.	Papaveraceae		helmbloem, o.a. holwortel	corydalis, including hollowroot		
Corydalis solidia (L.) Clairv.	Papaveraceae	Corydalis bulbosa (L.) DC.	vingerhelmbloem	solid-rooted fumewort	Een afwijking voor het gebruik van de wortelstok kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van	A derogation may be requested for use of the rhizome and shall be assessed by the Advisory Commission for

					advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing alkaloids, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these alkaloids.
Corynanthe spp.	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
Cotoneaster spp.	Rosaceae		dwergmispel	cotoneaster		
Crinum asiaticum L.	Amaryllidaceae		lelie	Asiatic poisonbulb		
Crotalaria spp.	Leguminosae					
Croton spp.	Euphorbiaceae					
Cryptostegia spp.	Apocynaceae					
Cycas spp.	Cycadaceae		cycaspalm, varenpalm	cycas palm, fern palm		
Cynodon dactylon (L.) Pers.	Poaceae		handjesgras	Bermuda grass		
Cynoglossum spp.	Boraginaceae		hondstong	dog tongue		
Cypripedium	Orchidaceae		vrouwenschoentje	lady's slipper		

calceolus L.			e			
Cytisus spp.	Leguminosae					
Dalechampia scandens Jacq.	Euphorbiaceae					
Daphne spp.	Thymelaeaceae					
Datura spp.	Solanaceae					
Delphinium spp.	Ranunculaceae		ridderspoor	delphinium		
Derris spp.	Leguminosae					
Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara		Dicentra spectabilis (L.) Lem.	Gebroken hartje	bleeding heart		
Dichondra repens J.R. Forst. And G. Forst.	Convolvulaceae			dichondra rampant		
Dictamnus albus L.	Rutaceae		vuurwerkplant, essenkruid	Burningbush, Dittany, Fraxinella		
Dieffenbachia spp.	Araceae		dieffenbachia	dieffenbachia		
Digitalis spp.	Plantaginaceae		vingerhoedskruid	foxglove		
Tamus communis L.	Dioscoreaceae	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	spekwortel	black bryony		
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.	Leguminosae		tonkabonen boom	tonka bean tree		
Dirca palustris L.	Thymelaeaceae			eastern leatherwood		
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Dryopteridaceae		mannetjesvaren	male fern		
Duboisia spp.	Solanaceae					
Durio zibethinus L.	Malvaceae		doerian	durian		
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.	Cucurbitaceae		springkomkomm er	squirting cucumber		

Echium spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Boraginaceae		o.a. slangekruid	viper's bugloss, blueweed among others		
Ephedra spp.	Ephedraceae		o.a. zeedruif	Sea grape, among others		
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.	Ranunculaceae		winterakoniet	winter aconite		
Erechthites spp.	Compositae					
Erythrina spp.	Brassicaceae		erythrina	erythrina		
Erythroxylum coca Lam.	Leguminosae		cocastruik	coca		
Euonymus atropurpureus Jacq.	Celastraceae		vuurkardinaalsm uts	burningbush, bitter ash		
Euonymus europaeus L.	Celastraceae		wilde kardinaalsmuts	common spindle		
Euphorbia spp.	Euphorbiaceae		o.a. wolfsmelk, kerstster	spurge, poinsettia among others		
Tetradium ruticarpum (A.Juss.) T.G.Hartley	Rutaceae	Euodia ruticarpa (A. Juss.) Benth., Evodia ruticarpa (A.Juss.) Hook.f. & Thomson (A. Juss.) Benth				
Excoecaria agallocha L.	Euphorbiaceae					
Ficaria verna Huds.	Ranunculaceae	Ficaria renunculoides Monch.	speenkruid	celandine		
Forestiera spp.	Oleaceae					
Fritillaria imperialis L.	Liliaceae		keizerskroon	fritillary		

Galanthus spp.	Amaryllidaceae		o.a. sneeuwklokje	snowdrop, among others		
Galega officinalis L.	Leguminosae		galega	galega	Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat galegine en/of peganine bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor galegine en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL waarde voor peganine.	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing galegine and/or peganine, regardless of its source, does not lead, respectively, to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of galegine and the scientifically established DNEL value of peganine.
Garcinia hanburyi Hook. f.	Clusiaceae					
Geissospermum	Apocynaceae					

spp.						
Gelsemium spp.	Gelsemiaceae					
Genista tinctoria L.	Leguminosae		verfbrem	dye's greenweed		
Glechoma hederacea L.	Lamiaceae		hondsdrif	ground ivy		
Globularia alypum L.	Plantaginaceae		drietandkogelblo em			
Globularia vulgaris L.	Plantaginaceae		gewone kogelbloem			
Gloriosa superba L.	Colchicaceae		prachtlelie			
Gratiola officinalis L.	Plantaginaceae		genadekruid	gratiole		
Griffonia simplicifolia (DC.) Baill.	Leguminosae	Bandeiraea simplicifolia (DC.) Benth.	griffonia	griffonia		
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir.	Hypericaceae	Haronga madagascariens is L. (Lam. ex Poir.) Choisy	haronga boom	haronga tree		
Heimia spp.	Lythraceae					
Heliotropium spp.	Boraginaceae		heliotroop, zonnewende	Heliotrope, solstice		
Helleborus spp.	Ranunculaceae		nieskruid, o.a. kerstroos	hellebore, among others, Christmas rose		
Hepatica nobilis Mill. -	Ranunculaceae		leverbloempje	liverleaf flower		
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier	Apiaceae		reuzenberenklau w	giant hogweed		
Hippomane mancinella L.	Euphorbiaceae		manchineel	manchineel		
Homalomena spp.	Araceae					

Hura crepitans L.	Euphorbiaceae		zandkokerboom	sandbox tree		
Hyacinthus orientalis L.	Asparagaceae		hyacint	Hyacinth		
Hyoscyamus spp.	Solanaceae					
Ilex aquifolium L.	Aquifoliaceae		hulst	holly		
Illicium anisatum L.	Schisandraceae	Illicium religiosum Siebold & Zucc.	japanse steranijs	Japanese star anise		
Ipomoea spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Convolvulaceae		pronkwinde	morning glory	Het gebruik van de knol en de bladeren van de plant <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir is toegelaten in levensmiddelen.	Use of the tuber and leaves of the plant <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir is authorised as food.
Iris spp.	Iridaceae		o.a. lis	among others, iris		
Jatropha curcas L.	Euphorbiaceae		purgeernoot	jatropha		
Juglans nigra L.	Juglandaceae		zwarte walnoot	black walnut		
Juniperus sabina L.	Cupressaceae		sabijnse jeneverbes	Sabina juniper		
Kalmia latifolia L.	Ericaceae		lepelboom	mountain laurel		
Laburnum anagyroides Medik.	Leguminosae	Cytisus laburnum L.	gewone goudenregen	common laburnum		
Lactuca virosa L.	Compositae		gifsla	wild lettuce, bitter lettuce		
Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville	Papaveraceae		creosootstruik	creosote bush		
Leopoldia comosa (L.) Parl.	Asparagaceae	Muscari comosum (L.) Mill.	kuifhyacint	crested hyacinth		
Leucojum vernum L.	Amaryllidaceae		lenteklokje	spring snowflake		

Ligustrum vulgare L.	Oleaceae		wilde liguster	wild privet		
Linaria vulgaris Mill.	Plantaginaceae		vlasbekje	toadflax	Een afwijking kan worden gevraagd aan, en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat quinazoline alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze quinazoline alkaloiden.	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing quinazoline alkaloids, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these quinazoline alkaloids.
Liriope spp.	Asparagaceae					
Lithospermum spp.	Boraginaceae		o.a. parelzaad	among others, gromwell		
Lobelia inflata L.	Campanulaceae		gezwollen lobelia	swollen lobelia		
Lonchocarpus spp.	Leguminosae					
Lonicera	Caprifoliaceae		tuinkamperfoelie	garden		

caprifolium L.				honeysuckle		
Lupinus spp.	Cactaceae		lupine	Lupin, lupine	Enkel de cultivars met lage gehalten aan alkaloiden van de planten Lupinus angustifolius L. en Lupinus albus L. kunnen worden toegelaten in voedingsmiddelen indien aangetoond werd dat het zaad en het meel van de planten maximum 200 mg/kg totaal alkaloiden en geen anagryne bevatten.	Only cultivars of the plants Lupinus angustifolius L. and Lupinus albus L. with a low alkaloid content may be authorised in food if it has been demonstrated that the seeds and flour of the plants contain a maximum of 200 mg/kg total alkaloids and no anagryne.
Lycoris spp.	Amaryllidaceae					
Lyonia spp.	Ericaceae					
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt	Asparagaceae		dalkruid	May lily		
Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae		kamalaboom	Kamala tree		
Mandragora officinarum L.	Solanaceae		alruin	Alruina, Mediterranean mandrake		
Meconopsis spp.	Papaveraceae		schijnpapaver			
Menispermum canadense L.	Menispermaceae		Canadees Maanzaad.	Canadian poppy seeds		
Mercurialis annua L.	Euphorbiaceae		tuinbingelkruid	annual mercury		

Mercurialis perennis L.	Euphorbiaceae		bosbingelkruid	dog's mercury		
Mesembryanthemum spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Aizoaceae		o.a. middagbloem, ijskruid	including afternoon flower, common ice plant		
Mesembryanthemum tortuosum L.		Sceletium tortuosum (L.) N.E.Br.				
Mimosa spp.	Leguminosae			mimosa		
Mitragyna speciosa Korth.	Rubiaceae	Nauclea speciosa (Korth.) Miq; Stephegyne speciosa (Korth.) Korth.	kratom	kratom		
Mosannonia depressa (Baill.) Chatrou	Annonaceae	Guatteria gaumeri Greenm.	yumel	yumel		
Mucuna pruriens (L.) DC.	Leguminosae	Dolichos pruriens L.			Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat harmaan alkaloiden, levodopa, lectines	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing harmane alkaloids and/or levodopa and/or lectins

					en/of niet proteïnogene aminozuren bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze harmaan alkaloiden, de wetenschappelijk onderbouwde DNEL waarde voor levo-dopa, de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze lectines en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze niet proteïnogene aminozuren.	and/or non-proteinogenic amino acids, regardless of its source, does not lead, respectively, to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these harmane alkaloids, the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these lectins and the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these non-proteinogenic amino acids.
Myoporum laetum G. Forst.	Scrophulariaceae		Ngaio boom	Mousehole tree		

Narcissus spp.	Amaryllidaceae		witte narcis, dichtersnarcis	white narcissus, poet's daffodil		
Nerium spp.	Apocynaceae		oleander	oleander		
Nicotiana spp.	Solanaceae		o.a. tabak	tobacco		
Nigella damascena L.	Ranunculaceae		juffertje-in-'t- groen	love in a mist		
Nymphaea alba L.	Nymphaeaceae		witte waterlelie	white waterlily		
Nymphaea odorata Ait.	Nymphaeaceae		geurende waterlelie	fragrant water lily		
Ochrosia spp.	Apocynaceae					
Ophioglossum vulgatum L.	Ophioglossaceae		addertong	adderstongue	Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidinge n indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat ptaquiloside bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor ptaquiloside.	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing ptaquiloside, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of ptaquiloside.
Ornithogalum spp.	Asparagaceae		vogelmelk	Star-of- Bethlehem		

Orobanche spp.	Orobanchaceae		bremraap	broomrape		
Oxalis spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Oxalidaceae		klaverzuring	oxalis		
Paeonia spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Paeoniaceae		pioen	peony		
Papaver somniferum L.	Papaveraceae		slaapbol, papaver, maankop	poppy, opium poppy	Het zaad (maanzaad) mag verkocht worden aan de eindverbruiker of mag gebruikt worden op of in bakkerijproducten of in kaas indien het voedingsmiddel voldoet aan de bepalingen van sectie 2.5 (opiumalkaloïden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006.	The seed (poppy seed) may be sold to the final consumer or used on or in bakery products or in cheese if the foodstuff complies with the provisions of Section 2.5 (opium alkaloids) of the Annex to Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in foodstuffs and repealing Regulation (EC) No 1881/2006.

Paris quadrifolia L.	Melanthiaceae		eenbes	herb Paris		
Parthenocissures quinquefolia (L.)	Vitaceae		vijfbladige wingerd	five-leaved vine		
Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille	Rubiaceae		yohimbe	yohimbe		
Peganum harmala L.	Nitrariaceae		harmala	harmal		
Petasites spp.	Compositae		hoefblad	coltsfoot		
Petunia violacea Lindl.	Solanaceae					
Pfaffia spp.	Amaranthaceae					
Philodendron spp.	Araceae					
Physostigma venenosum Balf.	Leguminosae		calabarbonen	calabar beans		
(Phytolacca sp.)	Phytolaccaceae		karmozijnbes	pokeweed		
Pieris formosa (Wall.) D. Don	Ericaceae			Piérís andromède		
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don Murr.	Ericaceae					
Pilocarpus spp.	Rutaceae					
Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb	Araceae		Driebladige pinellia	Trifold pinellia	Een afwijking voor het gebruik van de wortel kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidinge n indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen	A derogation may be requested for the use of the root and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the

					dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat 3,4-dihydroxybenzaldehyde en/of pinelline bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot, respectievelijk, een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor 3,4-dihydroxybenzaldehyde en de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor pinelline. De voorwaarde tot analyse vervalt indien kan worden aangetoond dat de bereiding volledig conform de methode volgens de Chinese Pharmacopée wordt uitgevoerd.	recommended daily portion of the finished product containing 3,4-dihydroxybenzaldehyde and/or pinelline, regardless of its source, does not lead, respectively, to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of 3,4-dihydroxybenzaldehyde and the scientifically established DNEL value of pinelline. Analyses are not required if it can be demonstrated that the preparation is carried out according to the Chinese Pharmacopoeia method in all respects.
Piper methysticum Forster f.	Piperaceae		kava, kawa	kava, kawa		
Piscidia piscidula (L.) Sarg.	Leguminosae	Piscidia erythrina	piscidia	piscidia		

		(Loefl.) L.				
Podophyllum peltatum L.	Berberidaceae		Voetblad, eendevoet	Mayapple, wild mandrake		
Poncirus trifoliata (L.) Raf.	Leguminosae		driebladcitrus	three-bladed citrus		
Psoralea spp.	Rubiaceae					
Psychotria viridis Ruiz. & Pav.	Dennstaedtiaceae		Chacruna	Chacruna		
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.	Olacaceae		adelaarsvaren	bracken		
Ptychopetalum spp.	Ericaceae					
Pyrularia pubera Michx.	Santalaceae		buffelnoot			
Quassia spp.	Simaroubaceae					
Quillaja saponaria Molina. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Quillajaceae		zeephoutboom	soap timber tree		
Ranunculus spp.	Ranunculaceae		boterbloem	buttercup		
(Rauvolfia sp.)	Apocynaceae					
Rhododendron spp.	Ericaceae		rododendron	rhododendron		
Rhodomyrtus spp.	Myrtaceae					
Rhus spp.	Anacardiaceae		sumak	sumac		
Rhus aromatica Aiton	Anacardiaceae		welriekende sumac	fragrant sumac	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij culinaire bereidingen.	Only the use of small unconcentrated quantities of fruit is authorised for culinary preparations.
Rhus coriaria L.	Anacardiaceae		sumak	sumac	Enkel het gebruik	Only the use of

					van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij culinaire bereidingen.	small unconcentrated quantities of fruit is authorised for culinary preparations.
Rhus glabra L.	Anacardiaceae		gladde sumak	smooth sumac	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij culinaire bereidingen.	Only the use of small unconcentrated quantities of fruit is authorised for culinary preparations.
Rhynchosia spp.	Leguminosae					
Richardia scabra L.	Rubiaceae		valse ipecacuanha	Mexican clover		
Ricinus communis L.	Euphorbiaceae		wonderboom	castor bean plant		
Rivina humilis L.	Phytolaccaceae					
Roemeria hybrida L. DC.	Papaveraceae					
Rubia tinctorum L.	Rubiaceae		meekrap	madder		
Ruta spp.	Rutaceae					
Salvia divinorum Epling & Játiva	Lamiaceae		centraal Amerikaanse salie	divining sage, salvia		
Sanguinaria canadensis L.	Papaveraceae		bloedwortel	bloodroot		
Sansevieria spp.	Asparagaceae		vrouwentongen	mother-in-law's tongue		
Santalum album L.	Santalaceae		sandelboom	sandalwood tree		

Sassafras albidum (Nutt.) Nees	Lauraceae	Sassafras officinale T. Nees & C.H. Eberm.	Sassafrashout	Sassafras wood		
Saussurea spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Compositae					
Schefflera spp.	Araliaceae					
Schinus molle L.	Anacardiaceae		peruviaanse peperboom	Peruvian pepper tree	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij culinaire bereidingen.	Only the use of small unconcentrated quantities of fruit is authorised for culinary preparations.
Schinus terebinthifolius Raddi.	Anacardiaceae		braziliaanse peperboom	Brazilian pepper tree	Enkel het gebruik van kleine niet-geconcentreerde hoeveelheden van de vruchten is toegelaten bij culinaire bereidingen.	Only the use of small unconcentrated quantities of fruit is authorised for culinary preparations.
Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A.Gray	Melanthiaceae	Sabadilla officinalis (Schltdl.) & Cham.) Standl. Brandt. & Ratzeb.	Sabadilkruid	Sabadil herb		
Scindapsus spp.	Araceae					
Scopolia spp.	Solanaceae					
Scrophularia spp. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Scrophulariaceae		helmkruid	figwort		
Scutellaria	Lamiaceae		Baikalglidkruid	Baikal skullcap	Het gebruik van	Use of the root

baicalensis Georgi (zie ook lijst 3/see also List 3)					de wortel afkomstig van deze plant is toegelaten in voedingsmiddelen.	from this plant is authorised in food.
Scutellaria lateriflora L. (zie ook lijst 3/see also List 3)	Lamiaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidinge n indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat furano neoclerodanen bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze furano neoclerodanen. De voorwaarde tot analyse vervalt indien door een botanisch	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing furano neoclerodanes, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these furano neoclerodanes. Analyses are not required if it can be demonstrated by a botanical certificate that the parts used come from that plant.

					certificaat wordt aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	
Scutellaria spp.	Lamiaceae		blauw glidkruid	blue skullcap		
Securigera varia (L.) Lassen	Leguminosae	Coronilla varia L.	bont kroonkruid	fur crown herb		
Senecio spp.	Compositae		kruiskruid	groundsel		
Sesbania spp.	Leguminosae					
Sida cordifolia L.	Malvaceae		bala	bala		
Sida rhombifolia L.	Malvaceae					
Simarouba amara Aubl.	Simaroubaceae					
Solandra grandiflora Sw.	Solanaceae			showy chalicevine		
Solanum americanum Mill.	Solanaceae		Amerikaanse zwarte nachtschade,	American black nightshade		
Solanum nigrum L.			Zwarte nachtschade	Black nightshade		
Solanum dulcamara L.	Solanaceae		bitterzoet	bittersweet, bittersweet nightshade, woody nightshade		
Solenostemma argel (Delile) Hayne	Apocynaceae					
Sorbus domestica L.	Rosaceae		peervormigelijste rbes	service tree	Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations

					plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoon dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat parasorbinezuur bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor parasorbinezuur. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 1 mg. Indien het product bestemd is voor kinderen jonger dan 12 jaar, mag de inname niet	if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing parasorbic acid, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of parasorbic acid. The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 1 mg of hydrogen cyanide equivalents (free and bound), regardless of the source. If the product is intended for children under 12 years of age, ingestion must not exceed 0.5 mg/day.
--	--	--	--	--	---	--

					hoger zijn dan 0.5 mg/dag.	
Spartium junceum L.	Leguminosae		spaanse brem	Spanish broom		
Spathiphyllum spp.	Araceae					
Spigelia anthelmia L.	Loganiaceae			West Indian pinkroot, wormbush, wormgrass		
Spigelia marilandica (L.) L.	Loganiaceae					
Sprekelia spp.	Amaryllidaceae		goudlelie	golden-rayed lily, among others		
Stephanotis spp.	Apocynaceae		bruidsbloem	bridal veil, Madagascar jasmine		
Sternbergia spp.	Amaryllidaceae					
Strophanthus spp.	Apocynaceae					
Strychnos spp.	Loganiaceae					
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake	Caprifoliaceae		sneeuwbes	snowberry		
Symphytum spp.	Boraginaceae		smeerwortel	Comfrey		
Tabebuia spp.	Bignoniaceae					
Tabernanthe iboga Bailell.	Apocynaceae		ibogo	Ibogo		
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip	Compositae	Chrysanthemum cinerariifolium (Trevir) Vis.	dalmatisch vlooienkruid	pyrethrum, Dalmatian pyrethrum		
Taxus spp.	Taxaceae		taxus	yew		
Tephrosia spp.	Leguminosae					
Tetralinis articulata (Vahl.)	Cupressaceae	Callitris quadrivalvis	sandarak, kamercipres	sandarak, sictus tree		

Mast.		Vent. Callitris quadrivalvis Rich. & A.Rich.				
Teucrium chamaedrys L.	Lamiaceae		echte gamander	wall germander		
Teucrium polium L.	Lamiaceae			poley		
Thevetia spp.	Lamiaceae		o.a. gele oleander	yellow oleander, among others		
Thuja occidentalis L.	Apocynaceae		westerse levensboom	white cedar		
Trichocereus spp.	Cactaceae					
Trichodesma incanum Bunge	Boraginaceae					
Trollius europaeus L.	Ranunculaceae		europese trollius	European globeflower		
Tulipa spp.	Liliaceae		tulp	tulip		
Turbina corymbosa (L.) Raf.	Convolvulaceae					
Tussilago spp.	Compositae		klein hoefblad	coltsfoot		
Tylophora asthmatica Wight & Arn.	Apocynaceae					
Urginea spp.	Asparagaceae		zeeajuin	Drimia maritima, sea squill		
Veratrum spp.	Melanthiaceae		nieswortel	false hellebore		
Viburnum prunifolium L.	Adoxaceae		amerikaanse sneeuwbal	Black haw		
Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Apocynaceae	Vincetoxicum officinale Moench	witte engbloem	white swallow- wort, German ippecac		
Wikstroemia spp.	Thymelaeaceae					
Wisteria floribunda (Willd.) DC.	Leguminosae		japanse blauwereggen	Japanese wisteria		

Wisteria sinensis (Sims) Sweet.	Leguminosae		chinese blauwereggen	Chinese wisteria		
Xysmalobium undulatum (L.) R. Br.	Apocynaceae		uzara	milkbush		
Zanthoxylum acanthopodium DC.	Rutaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing alkaloids, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these alkaloids.
Zanthoxylum americanum Mill.	Rutaceae				Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory

					de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing alkaloids, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these alkaloids.
Zanthoxylum armatum DC.	Rutaceae	Zanthoxylum alatum Roxb.	geelhout	winged prickly-ash	Een afwijking kan worden gevraagd aan en wordt beoordeeld door de Commissie van advies voor plantenbereidingen indien het dossier middels analyse aantoont dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct	A derogation may be requested and shall be assessed by the Advisory Commission for Plant Preparations if the file demonstrates by means of analysis that the recommended daily portion of the finished product containing

					dat alkaloiden bevat, ongeacht de bron ervan, niet leidt tot een inname hoger dan de wetenschappelijk onderbouwde DNEL-waarde voor (elk van of de meest toxische van) deze alkaloiden.	alkaloids, regardless of its source, does not lead to ingestion exceeding the scientifically established DNEL value of (each of or the most toxic of) these alkaloids.
Zigadenus spp.	Melanthiaceae		alkaligras	camas, death camas		

Lijst 2: Eetbare paddenstoelen

List 2: Edible mushrooms

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
Agaricus arvensis Schaeff.		SC/WG	Gewone anijschampignon	Horse mushroom		
Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach; incl. - var. albidus (J.E. Lange) Singer - var. avellaneus (J.E. Lange) Singer	Agaricus hortensis (Cooke) S. Imai; Agaricus brunnescens Peck	C/G	Parijse champignon, Kastanjechampignon; incl. witte en bruine variëteiten (o.m. portobello)	Cultivated mushroom, including white and blonde varieties (including portobello, chestnut)		
Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc.		SC/WG	Straatchampignon	Pavement mushroom, torq, banded agaric		
Agaricus blazei Murrill		C/G	Himematsutake	Almond mushroom, sun mushroom, Himematsutake		
Agaricus campestris L.	Agaricus campester L.	SC/WG	Gewone weidechampignon	Field mushroom		
Agaricus subrufescens Peck		C/G	Bladhoopchampignon, Amandelpaddenstoel	Almond mushroom		
Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck	Agaricus silvicola	SC/WG	Slanke anijschampignon	Wood mushroom		

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
	(Vittad.) Peck					
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel	<i>Peziza aurantia</i> Pers.	S/W	Grote oranje bekerzwam	Orange peel fungus		
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.		S/W	Keizersamaniet	Caesar's mushroom		
<i>Amanita rubescens</i> Pers.		S/W	Parelamaniet	Blusher		
<i>Amanita ponderosa</i> Malençon & R. Heim		S/W		Heavy amidella		
<i>Antrodia camphorata</i> (M. Zang & C.H. Su) Sheng H. Wu et al.	Taiwanofun gus camphoratu s (M. Zang & C.H. Su) Sheng H. Wu et al.; <i>Antrodia</i> <i>cinnamomea</i> T.T. Chang & W.N. Chou; <i>Ganoderma</i> <i>camphoratu</i> m M. Zang & C.H. Su				Voor het mycelium in poedervorm, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingredië nten zijn toegelaten (uitvoeringsveror dening (EU) 2017/2470).	For mycelium powder, only products complying with the authorisation as a novel food ingredient are authorised (Implementing Regulation (EU)) 2017/2470).
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. s.l.	<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.	S/W	Honingzwam s.l.	Honey fungus s.l.		

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél.	<i>Hirneola auricula-judae</i> (Bull.) Berk.	SC/WG	Echt judasoor	Wood ear, jelly ear, Jew's ear		
<i>Auricularia nigricans</i> (Sw.) Birkebak et al.	<i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc.	C/G		Cloud ear fungus		
<i>Boletus aereus</i> Bull.		SC/WG	Bronskleurig eekhoorntjesbrood	Queen bolete, dark cep		
<i>Boletus edulis</i> Bull.		S/W	Gewoon eekhoorntjesbrood	Cep, penny bun		
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	SC/WG	Vroeg eekhoorntjesbrood	Summer cep		
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek		SC/WG	Denneneekhoorntjesbrood	Pine bolete, pinewood king bolete		
<i>Boletus rex-veris</i> D. Arora & Simonini		C/G		Spring king bolete		
<i>Bovista plumbea</i> Pers.		S/W	Loodgrijze bovist	Tumbling puffball, paltry puffball	Enkel het gebruik van het vruchtlichaam is toegelaten.	Only the use of the sporophore is authorised.
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk	<i>Tricholoma georgii</i> (L.) Quél.	S/W	Voorjaarspronkridde r	St George's mushroom, may mushroom		
<i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd	<i>Langermannia gigantea</i> (Batsch)	SC/WG	Reuzenbovist	Giant puffball		

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
	Rostk.					
Cantharellus cibarius Fr.		S/W	Gewone hanenkam ; Dooierzwam ; Cantharel	Common chanterelle; Girolle		
Cantharellus cinereus Pers.	Craterellus cinereus (Pers.) Pers.	S/W	Grauwe cantharel	Ashen chanterelle		
Cantharellus pallens Pilát	Cantharellus subpruinosis Eyssart. & Buyck	S/W	Bleke cantharel			
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.		S/W	Groene anijstrechtterzwam	Aniseed funnel, aniseed toadstool		
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.		S/W	Grote molenaar	The miller		
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.		SC/WG	Geschubde inktzwam	Shaggy ink cap		
Craterellus cornucopioides (L.) Pers.	Cantharellus cornucopioides (L.) Fr.	S/W	Hoorn-van-overvloed	Horn of Plenty, trumpet of death, black chanterelle		
Craterellus lutescens (Fr.) Fr.	Cantharellus lutescens Fr.; Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper	S/W	Rimpelige cantharel	Yellow foot, yellow-stemmed foot		

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Fr.) Quél.	Cantharellus tubaeformis Fr.	S/W	Trechtercantharel	Funnel chanterelle		
<i>Cyclocybe aegerita</i> (V. Brig.) Vizzini incl. <i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini	<i>Agrocybe aegerita</i> (V. Brig.) Singer; <i>Pholiota aegerita</i> (V. Brig.) Quél. <i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire	SC/WG	Populierleemhoed	Poplar Fieldcap		
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With.		S/W	Biefstukzwam			
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer	<i>Collybia velutipes</i> (Curtis) P. Kumm.	SC/WG	Gewoon fluweelpootje	Velvet shank		
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.		SC/WG	Gesteelde lakzwam	Lacquered bracket		
<i>Ganoderma tsugae</i> Murrill		C/G				
<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray		SC/WG	Eikhaas	Hen of the woods		
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.		SC/WG	Pruikzwam	Bearded tooth		
<i>Hydnum albidum</i> Peck		S/W		White hedgehog		
<i>Hydnum repandum</i> L.		S/W	Gele stekelzwam	Wood		

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
				hedgehog; hedgehog fungus		
<i>Hydnum rufescens</i> Pers.		S/W	Rossige stekelzwam	Terracotta hedgehog		
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire		S/W	Valse hanenkam ; Valse cantharel	False chanterelle		
<i>Hypsizygus tessulatus</i> (Bull.: Fr.) Sing.		C/G	Buna Shimeji	Buna Shimeji	Enkel gekweekte exemplaren mogen in de handel worden gebracht.	Only cultivated specimens may be placed on the market.
<i>Hypsizygus ulmarius</i> (Bull.) Redhead	<i>Lyophyllum ulmarium</i> (Bull.) Kühner	SC/WG	Iepenzwam	Elm leech, elm mushroom, elm oyster		
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini	<i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr.; <i>Xerocomus badius</i> (Fr.) E.-J. Gilbert	S/W	Kastanjeboleet	Bay bolete		
<i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bull.) Harmaja	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull.) Quél.	S/W	Grote trechterzwam	Trooping funnel		
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.	<i>Pholiota mutabilis</i> (Schaeff.) P. Kumm.	SC/WG	Stobbenzwammetje; Kleine bundelzwam	Sheathed Woodtuft		
<i>Laccaria amethystina</i>		S/W	Rodekoolzwam;	Amethyst		

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
Cooke			Amethistzwam	deceiver; amethyst laccaria; red cabbage mushroom		
Laccaria laccata (Scop.) Cooke		S/W	Gewone fopzwam	Deceiver		
Lactarius deliciosus (L.) Gray	Agaricus deliciosus L.	S/W	Smakelijke melkzwam; Oranjegroene melkzwam	Saffron milkcap		
Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair		S/W	Zilverparmelmelkzwam			
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.		S/W	Wijnrode melkzwam	Bloody milkcap		
Lactarius semisanguifluus R. Heim & Leclair		S/W	Vaalrode melkzwam			
Laetiporus sulphureus (Bull.) Merrill	Polyporus sulphureus (Bull.) Fr.	SC/WG	Zwavelzwam	Sulphur polypore, chicken of the woods		
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray	Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel	S/W	Eikenboleet	Orange Oak Bolete		
Lentinula edodes (Berk.) Pegler	Lentinus edodes (Berk.) Singer	C/G	Shiitake	Shiitake	De consumptie van rauwe of licht gekookte Shiitake kan leiden tot huidreacties. Het	Consumption of raw or poorly cooked Shiitake can cause

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
					is aanbevolen om de Shiitake ongeveer 20 minuten te koken voor consumptie of het te verwarmen tot een temperatuur van 130 - 150 °C. De gedroogde paddenstoelen zouden voldoende moeten worden gehydrateerd vóór het koken.	cutaneous reactions It is recommended to cook shiitake for approximately 20 minutes before consuming it or heat it to a temperature of 130 to 150 °C. Dried mushrooms must be sufficiently hydrated before cooking.
<i>Lentinus sajor-caju</i> (Fr.) Fr.	<i>Pleurotus sajor-caju</i> (Fr.) Singer	C/G				
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr.		S/W	Tijgertaaiplaat	Tiger sawgill		
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke	<i>Rhodopaxillus nudus</i> (Bull.) Maire	SC/WG	Paarse schijnridderzwam	Wood blewit		
<i>Lepista personata</i> (Fr.) Cooke		SC/WG	Paarse schijnridderzwam	Field blewit		
<i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer		S/W	Vaalpaarse schijnridderzwam	Sordid blewit		
<i>Limacellopsis guttata</i>	<i>Limacella</i>	SC/WG	Grote kleefparasol			

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
(Pers.) Zhu L. Yang et al.	guttata (Pers.) Konrad & Maubl.					
Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo		C/G	Hon-Shimeji	Hon-Shimeji		
Macrolepiota procera (Scop.) Singer		S/W	Grote parasolzwam	Parasol mushroom		
Marasmius oreades (Bolton) Fr.		S/W	Weidekringzwam	Fairy ring champignon, fairy ring marasmius		
Morchella angusticeps Peck		S/W		Black morel		
Morchella conica Pers. sensu lato		SC/WG	Kegelmorielje	Morel, yellow morel		
Morchella esculenta (L.) Pers sensu lato	Morchella rotunda (Pers.) Boud.	SC/WG	Gewone morielje	Morel, yellow morel		
Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn	Boletus erythropus Pers.	S/W	Gewone heksenboleet	Scarletina bolete		
Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H. Sung et al.	Hirsutella hepiali C.T. Chen & N.Y. Shen; cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.;	C/G			Enkel het gebruik in voedingssupplementen is toegelaten.	Only use in food supplements is authorised.

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
	<i>Sphaeria sinensis</i> Berk.					
<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini	<i>Lepista inversa</i> (Scop.) Pat.	S/W	Roodbruine schijnridderzwam; Roodbruine trechterzwam	Tawny funnel cap		
<i>Pholiota nameko</i> (T. Itô) S. Ito & S. Imai		C/G	Nameko			
<i>Pleurotus citrinopileatus</i> Singer		C/G	Goudkleurige oesterzwam	Golden oyster mushroom		
<i>Pleurotus columbinus</i> Quél.		C/G				
<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet) Quél		SC/WG	Trechteroesterzwam	Branched oyster mushroom		
<i>Pleurotus cystidiosus</i> O.K. Mill.		C/G				
<i>Pleurotus djamor</i> (Rumph. ex Fr.) Boedijn	<i>Pleurotus salmoneostramineus</i> Lj.N. Vassiljeva; <i>Pleurotus leptogramme</i> (Berk. & Broome) Sacc.	C/G	Zalmoesterzwam	Salmon oyster mushroom		
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél. Incl. - var. <i>ferulae</i> (Lanzi)	<i>Pleurotus tuoliensis</i> (C.J. Mou) M.R. Zhao &	SC/WG	Kruisdisteloesterzwam	King oyster mushroom		

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
Sacc - var. tuoliensis (C.J.Mou)	Jin X. Zhang					
Pleurotus flabellatus Sacc.		C/G				
Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél.,		SC/WG				
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.;		SC/WG	Gewone oesterzwam	Common oyster mushroom		
Pleurotus ostreatus f. florida Cetto		C/G	Floridazwam	Florida oyster mushroom		
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.		SC/WG	Bleke oesterzwam	Oyster mushroom		
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.	Grifola umbellata (Pers.) Pilát; Dendropolyporus umbellatus (Pers.) Jülich	SC/WG	Schermpjeseikhaas	Umbrella Polypore		
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.		S/W	Regenboogrussula	Charcoal burner		
Russula vesca Fr.		S/W	Smakelijke russula	Bare-toothed russula, the flirt		
Russula virescens (Schaeff.) Fr.		S/W	Ruwe russula	Green brittlegill		
Sparassis crispa (Wulfen) Fr.		S/W	Grote sponszwam	Wood cauliflower		
Stropharia		C/G	Blauwplaatstrophari	Burgundy		

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
rugosoannulata Farl. ex Murrill			a	mushroom		
Suillus granulatus (L.) Roussel		S/W	Melkboleet	Weeping bolete		
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer	Suillus elegans (P. Karst.) Snell	S/W	Gele ringboleet	Greville's bolete		
Suillus luteus (L.) Roussel		S/W	Bruine ringboleet	Slippery jack		
Tremella fuciformis Berk.		S/W	Witte trilzwam	Snow ear		
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken		S/W	Matsu-take	Matsutake		
Tricholoma portentosum (Fr.) Quél		S/W	Glanzende ridderzwam	Coalman		
Tricholoma terreum- (Schaeff.) P. Kumm.		S/W	Donkergrijze ridderzwam	Dark gray knight		
Tuber aestivum (Wulfen) Spreng.		SC/WG	Zomertruffel	Summer truffle		
Tuber borchii Vittad.		SC/WG	Bleke truffel			
Tuber brumale Vittad.		SC/WG		Winter truffle		
Tuber magnatum Picco		SC/WG	Witte truffel	White truffle		
Tuber melanosporum Vittad.		SC/WG	Perigordtruffel	Perigord truffle		
Tuber indicum Cooke & Massee		SC/WG	Chinese of Aziatische truffel	Chinese or Asian truffle		
Tuber uncinatum Chatin		SC/WG	Bourgognetruffel	Burgundy truffle		
Ustilago maydis (DC.) Corda	Mycosarcoma maydis	C/G	Maïsbrand	Corn smut		

Scientific name Wetenschappelijke naam	Synonym Synoniem	Wild (S) Cultivated (C) / Wild (W) Gekweekt (G)	Dutch name Nederlandse naam	English name Franse naam	Beperkingen en voorwaarden	Limits and conditions
	(DC.) Bref.					
Volvariella volvacea (Bull.) Singer	Volvaria volvacea (Bull.) P. Kumm.	C/G	Rijststrozwam, Tropische beurszwam	Paddy straw mushroom, straw mushroom		
Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini et al.	Volvariella speciosa (Fr.) Singer	S/W	Gewone beurszwam	Stubble rosegill		
Wolfiporia extensa (Peck) Ginns	Poria cocos Wolf	S/W		China root, Poria	Enkel het gebruik van het sclerotium is toegelaten.	Only the use of the sclerotium is authorised.

Lijst 3: Te notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm

List 3: Plants to be notified if in pre-dosed form

Botanische naam / Botanical name	Familie / Family	Synoniem / Synonym	Naam	Name	Toegelaten plantendeel of specifieke bereiding	Parts of plant authorised or particular preparation	Voorwaarde n	Conditions
Abelmoschus esculentus (L.) Moench	Malvaceae		oker, okra	ocher, okra, gumbo	vrucht	fruit		
Abelmoschus moschatus Medik.	Malvaceae		ambrettezaad , muskuszaad	ambrette seed, musk seed	zaad	seed		
Abies alba Mill.	Pinaceae		gewone zilverspar, grote spar, zilverspar	regular silver fir, large fir, silver fir	schors, tak, naald, knop, zaad, hars	bark, branch, needle, button, seed, resin		
Abies balsamea (L.) Mill.	Pinaceae		balsemspar, canadabalsem	balsam fir, Canadian balsam	schors, naald, hars, twijg	bark, needle, resin, twigs		
Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen	Pinaceae	Abies pectinata Dc. Var. Equi-Trojani Asch. & Sint. Ex Boiss	nordmann-spar, kaukasische spar, krimspar	Nordmann fir, Caucasian fir, Crimean fir	schors, naald	bark, needle		
Abies	Pinaceae		siberische	Siberian fir	schors,	bark,		

sibirica Ledeb.			zilverden		tak, naald, hars	branch, needle, resin		
Abroma augusta L. f	Malvaceae				wortelscho rs	root bark	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken bij de zwangersch ap of borstvoedin g. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant or breastfeedin g. Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Acacia catechu (L.f.) Willd.	Leguminosa e			Black cutch	gom	gum		
Acacia decurrens Willd.	Leguminosa e				gom	gum		
Acacia nilotica (L.) Delile	Leguminosa e	Acacia arabica (Lam.) Willd.	echte acacia, gom-acacia	Egyptian acacia	schors, vrucht, gom	bark, fruit, gum		

Acacia senegal (L.) Willd.	Leguminosae		arabische gom	Arabic gum	schors, gom	bark, gum		
Acacia seyal Delile	Leguminosae				gom	gum		
Acanthus mollis L.	Acanthaceae		stekelige berenklaauw	soft acanthus, broad-leaved acanthus	hele plant	whole plant		
Acer campestre L.	Sapindaceae		Spaanse aak, veldesdoorn	Camel maple	knop	bud	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden hypoglycines bevat. De voorwaarde tot analyse vervalt indien door een botanisch certificaat wordt aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of hypoglycins. Analyses are not required if it can be demonstrated by a botanical certificate that the parts used come from that plant.
Acer	Sapindaceae		vederesdoorn	box elder,	schors	bark	Analyse	the analysis

negundo L.	e			box elder maple, ash leaf maple, American maple			moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n hypoglycine s bevat.	must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of hypoglycins.
Acer saccharinum L.	Sapindaceae		witte esdoorn of zilveresdoorn	silver maple	bast, hout	liber, wood	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n hypoglycine s bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of hypoglycins.
Achillea ageratum L.	Compositae			Sweet yarrow, English mace	bovengron dse delen	aerial parts		
Achillea atrata L.	Compositae		dofzwart duizendblad	black yarrow	bovengron dse delen	aerial parts		
Achillea erba-rotta All.	Compositae			simple- leaved milfoil	bovengron dse delen	aerial parts		
Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) I. Richardson	Compositae		duizendblad, hemdsknoopjes, muskusduizendblad	musk milfoil	bovengron dse delen	aerial parts		

Achillea maritima (L.) Ehrende. & Y.P.Guo	Compositae	Diotis candidiss ima Desf., Otanthus maritimu s (L.) Hoffmann s & Link			bovengron dse delen	aerial parts		
Achillea millefolium L.	Compositae		gewoon duizendblad	common yarrow	bovengron dse delen	aerial parts		
Achillea nana L.	Compositae		wilde bertram	dwarf milfoil	bovengron dse delen	aerial parts		
Achillea ptarmica L.	Compositae		wilde bertram	sneezewort	bovengron dse delen	aerial parts		
Achyranthes bidentata Blume	Amaranthac eae		dubbelgetand e amarant	achyranthes bidentata blume	wortel	root		
Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen	Compositae		parakres, kiespijknop penkruid, braziliaanse cresson	para cress, toothache plant	bovengron dse delen	aerial parts		
Acorus calamus L.	Acoraceae		kalmoes, echte kalmoes	sweet-flag	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van beta- asarone	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 115 µg of beta- asarone,

							hoger dan 115 µg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	regardless of the source. The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Actaea heracleifolia (Kom.) J.Compton	Ranunculaceae	Cimicifuga heracleifolia Kom.			wortel, wortelstok	root, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg	The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 30 mg of dried rhizome. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor on the use and duration of

							uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken bij leveraandoeningen.	consumption . Do not use if you have liver disease.
<i>Actaea cimicifuga</i> var. <i>racemosa</i> (Regel) J.Compton.	Ranunculaceae	<i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt.	zwarte Amerikaanse slangenwortel, <i>zilverkaars</i>	black cohosh	wortel, wortelstok	root, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 30 mg gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts over het gebruik en innameperiode. Niet gebruiken	The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 30 mg of dried rhizome. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor on the use and duration of consumption . Do not use if you have liver disease.

							bij leveraandoe ningen.	
Actinidia chinensis Planch.	Actinidiace ae		kiwi, chinese kruisbes	kiwi, Chinese gooseberry	vrucht, knop	fruit, bud		
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguso n	Actinidiace ae		kiwi	kiwi	vrucht, knop	fruit, bud		
Adansonia digitata L.	Malvaceae		baobab	baobab	vrucht	fruit		
Adiantum capillus- veneris L.	Pteridaceae		europes venushaar	European maidenhair	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling	The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant or breastfeedin g. Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.

Adiantum pedatum L.	Adiantaceae		hoefijzervaren	horseshoe fern	hele plant gekookt of gedroogd	boiled or dried whole plant	. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant or breastfeeding. Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Adoxa moschatellina L.	Adoxaceae		muskuskruid	musk root	hele plant	whole plant		
Aegopodium podagraria L.	Apiaceae		zevenblad	ground elder	blad	leaf		
Aesculus hippocastanum L.	Hippocastanaceae		witte paardekastanje	Horse chestnut	zaad, bladknop	seed, leaf bud	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct	The recommended daily portion of the finished product

							mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van triterpene glycosiden van het type aescine (uitgedrukt als aescine) hoger dan 75 mg.	must not lead to the ingestion more than 75 mg of aescin-type triterpenic glycosides (expressed as aescin), regardless of the source.
Aframomum angustifolium (Sonn.) K.Schum.	Zingiberaceae	Amomum angustifolium Sonn.	madagascar cardamom	Madagascar cardamom	vrucht, zaad	fruit, seed		
Aframomum excapum (Sims) Hepper	Zingiberaceae				vrucht, zaad	fruit, seed		
Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans	Rutaceae	Barosma betulina (P.J.Bergius) Bartl. et H.L. Wendl.	bucco, boeche	buchu	blad	leaf		
Agathosma crenulata (L.) Pillans	Rutaceae	Barosma crenulata (L.) Hook., Barosma serratifolia (Curtis) Willd.	eironde buchu		blad	leaf		
Agathosma	Rutaceae				blad	leaf		

serratifolia (Curtis) Spreeth								
Agave americana L.	Asparagace ae		honderdjarig e aloë	American agave	bloemsten gel	flower stem		
Agave sisalana Perrine	Asparagace ae		sisal	sisal	bloemsten gel, wortel	flower stem, root		
Agave tequilana F.A.C. Weber	Asparagace ae		blauwe agave	Blue agave, tequila agave	bloemsten gel, blad	flower stem, leaf		
Agrimonia eupatoria L.	Rosaceae		gewone agrimonie	common agrimony	hele plant	whole plant		
Agrimonia repens L.	Rosaceae	Agrimoni a odorata Mill.	welriekende agrimonie	fragrant agrimony	bovengron dse delen	aerial parts		
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.	Lamiaceae		akkerzenegro en	yellow bugle	bovengron dse delen	aerial parts		
Ajuga iva (L.) Schreb.	Lamiaceae			southern bugle	bovengron dse delen	aerial parts		
Ajuga reptans L.	Lamiaceae		kruipend zenegroen	creeping bugle	bovengron dse delen	aerial parts		
Albizia julibrissin Durazz.	Leguminosa e		perzische slaapboom, zijdeboom	Persian silk tree, pink silk tree	schors	bark	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.

Alcea rosea L.	Malvaceae	Althaea rosea (L.) Cav	stokroos	common hollyhock	bloem	flower		
Alchemilla vulgaris L.	Rosaceae	Alchemilla xanthochlora Rothm.	spitslobbige vrouwemantel	intermediate lady's mantle	hele plant	whole plant		
Alisma plantago-aquatica L.	Alismataceae		grote waterweegbreed	common water plantain	wortel	root		
Alisma plantago-aquatica subsp. orientale (Sam.) Sam.	Alismataceae	Alisma orientale (Sam.) Juz.	waterweegbreed	Asian water plantain	wortelstok , knol	rhizome, tuber		
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	Sisymbrium alliaria (L.) Scop.	look-zonder-look	garlic mustard	hele plant	whole plant		
Allium ampeloprasum L.	Amaryllidaceae	Allium porrum L.	oerprei	wild leek	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.

Allium ascalonicum L.	Amaryllidaceae		sjalot	shallot	bol	bulb	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Allium cepa L.	Amaryllidaceae		ui	onion	bol	bulb	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Allium sativum L.	Amaryllidaceae		knoflook	garlic	bol	bulb	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten :	The labelling must include the following warning: Consult your

							Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Allium schoenoprasum L.	Amaryllidaceae		bieslook	chives	blad	leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Allium ursinum L.	Amaryllidaceae		daslook	ramson	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagula

							ntia.	nts.
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Betulaceae		zwarte els	alder, black alder	schors, bladknop, blad, gom	bark, leaf bud, leaf, gum		
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Betulaceae		grauwe els, witte els, grijze els	grey alder, hoary alder	schors, bladknop	bark, leaf bud		
<i>Aloe africana</i> Mill.	Xanthorrhoeaceae				blad, gel, latex (sap)	leaf, gel, latex (juice)	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmidde	The food supplement must comply with the provisions of Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods. The labelling must include the following

							len.De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	warnings: Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding.
Aloe arborescens Mill.	Xanthorrhoeaceae		kandelaaraloe	Candelabra aloe	blad, gel	leaf, gel	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen	The food supplement must comply with the provisions of Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances

							en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	to foods. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding.
Aloe ferox Mill.	Xanthorrhoeaceae		kaapse aloë	Cape aloe	blad	leaf	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december	The food supplement must comply with the provisions of Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins

							2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmidde len.De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen.	and minerals and of certain other substances to foods. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor if you are pregnant or breastfeedin g.
Aloe perryi Baker	Xanthorrhoeaceae				blad, gel	leaf, gel	Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006	The food supplement must comply with the provisions of Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament

							van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding.
Aloe plicatilis (L.) Mill.	Xanthorrhoeaceae		waaieraalwijn, waaieraloë	fan aloë	blad, gel	leaf, gel	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de	The food supplement must comply with the provisions of Annex III to

							bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen.	Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding.
--	--	--	--	--	--	--	---	---

Aloe vera (L.) Burm. f.	Xanthorrhoeaceae	Aloe barbadensis Mill.	echte aloë	common aloe vera	blad	leaf	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :	The food supplement must comply with the provisions of Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding.
-------------------------	------------------	------------------------	------------	------------------	------	------	---	--

							Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen.	
Aloysia citriodora Palau	Verbenacea e	Lippia citriodora (Lam.) Kunth, Aloysia triphylla (L'Hér) Britton	geurig ijzerhard, citronelle	cedron, lemon verbena	blad	leaf		
Alpinia galanga (L.) Willd.	Zingiberace ae		grote galgant	greater galangal	wortelstok	rhizome		
Alpinia hainanensis K.Schum.	Zingiberace ae	Alpinia katsumad ae Hayata			hele plant	whole plant		
Alpinia officinarum Hance	Zingiberace ae		kleine galgant	lesser galangal, Chinese ginger	wortelstok	rhizome		
Alpinia oxyphylla Miq.	Zingiberace ae				vrucht, wortelstok	fruit, rhizome		
Althaea officinalis L.	Malvaceae		echte heemst, witte malve, witte maluw	marsh mallow	hele plant	whole plant		
Amaranthus caudatus L.	Amaranthac eae		kattenstaarta marant	loosestrife amaranth	blad, zaad	leaf, seed		
Amaranthus cruentus L.	Amaranthac eae		paarse amarant	purple amaranth	zaad	seed		
Ammi	Apiaceae		fijn	toothpickwee	vrucht	fruit		

visnaga Lam.			akkerscherm, khella	d, khella				
Amomum villosum var. xanthioides (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.J.Chen	Zingiberace ae	Amomum xanthioid es Wall. ex Baker			zaad	seed		
Amorphopha llus konjac K. Koch	Araceae		konjac	konjac, devil's tongue	wortel	root		
Amyris balsamifera L.	Rutaceae		amyris, sandelhout west, west- indisch rozenhout	Balsam amyris, Balsam torchwood, West Indian- sandalwood, West Indian rosewood	hout, oliehars	wood, oil resin		
Ananas comosus (L.) Merr.	Bromeliace ae		ananas	pineapple	vrucht	fruit		
Andrographi s paniculata (Burm. f.) Nees	Acanthacea e		justicie, indiase gentiaan	creat, green chiretta	blad	leaf		
Anemarrhen a asphodeloide s Bunge	Asparagace ae				wortelstok	rhizome		
Anethum graveolens L.	Apiaceae		dille	dill	vrucht	fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct	The recommend ed daily portion of the finished product

							mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor de andere consumenten dient de hoeveelheid estragol zo laag mogelijk te blijven. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	must not lead to the ingestion of more than 0.05 mg of estragole/kg bodyweight by children under 12 years of age, regardless of the source. For other consumers, the amount of estragole must remain as low as possible. The labelling must include the following warning: Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Angelica archangelica L.	Apiaceae		grote engelwortel	Garden angelica	hele plant	whole plant		

Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & SAV.	Apiaceae		aziatische engelwortel, bai zhi	Dahurian angelica, Chinese angelica, bai zhi	wortel	root		
Angelica keiskei	Apiaceae				Sap van de stengel	Stem juice	Voor het sap van de stengel zijn enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënten toegelaten (uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470).	For the stem juice, only products complying with the authorisation as a novel food ingredient are authorised (Implementing Regulation (EU) 2017/2470).
Angelica pubescens Maxim.	Apiaceae		shishiudo, du huo	shishiudo, du huo	hele plant	whole plant		
Angelica sinensis (Oliv.) Diels.	Apiaceae		chinese engelwortel, dong quai	Chinese angelica, dong quai	hele plant	whole plant		
Angelica sylvestris L	Apiaceae		gewone engelwortel	wild angelica	blad, wortel, zaad	leaf, root, seed		
Angostura trifoliata (Willd.) T.S.Elias	Rutaceae	Cusparia officinalis Engl.; Cusparia trifoliata	angusturaboom	angostura tree	schors	bark		

		(Willd.) Engl., Galipea officinalis Hancock						
Annona muricata L.	Annonaceae		zuurzak, guanábana	soursop	vrucht rijpe	ripe fruit	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n acetogenine s bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of acetogenins.
Annona reticulata L.	Annonaceae		custardappel, ossenhart	custard apple, ox heart	vrucht rijpe	ripe fruit	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n acetogenine s bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of acetogenins.
Annona squamosa L.	Annonaceae		zoetzak, suikerappel, kaneelappel of schubappel	sweetsop, sugar apple	vrucht rijpe	ripe fruit	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable

							hoeveelheden acetogenines bevat.	quantity of acetogenins.
Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd.	Combretaceae				bast, gom	liber, gum		
Anredera baselloides (Kunth) Baill.	Basellaceae				blad, wortel	leaf, root	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Compositae		rozenkransje	mountain everlasting	bovengron dse delen	aerial parts		
Anthemis tinctoria L.	Compositae		gele kamille	Yellow chamomile	hele plant	whole plant		
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Apiaceae		echte kervel	garden chervil.	bloeiende toppen	flowering tops		
Anthyllis vulneraria L.	Leguminosae		wondklaver	common kidney vetch	hele plant	whole plant		
Antirrhinum	Plantaginac		grote	common	bovengron	aerial		

majus L.	eae		leeuwenbek	snapdragon	dse delen	parts		
Aphanes arvensis L.	Rosaceae	Alchemilla arvensis (L.) Scop.	grote leeuwenklauw	parsley-piert, breakstone	bovengron dse delen	aerial parts		
Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault	Nostocaceae		klamath, AFA		hele plant	whole plant	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden marine toxines bevat en dat het gehalte aan microcystine in het eindproduct lager is dan 1 µg/g.	The analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable amount of marine toxins and that the content of microcystin in the finished product is less than 1 µg/g.
Apium graveolens L.	Apiaceae		selderij	celery	hele plant	whole plant		
Arachis hypogaea L.	Leguminosae		aardnoot	groundnut, peanut	zaad, vette olie	seed, fat oil		
Aralia elata (Miq.) Seem.	Araliaceae		japanse engelenboom	Japanese angel tree	blad, wortelschors	leaf, root bark	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet	The labelling must include the following warning: Do not use if you are

							gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	pregnant or breastfeeding.
Aralia racemosa L.	Araliaceae		trosaralia, Amerikaanse nardus	American spikenard,	wortelstok , wortel	rhizome, root	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Arbutus unedo L.	Ericaceae		aardbeiboom	strawberry tree	vrucht, blad	fruit, leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Arctium lappa L.	Compositae		amerikaanse nardus	beggar's-buttons	hele plant	whole plant		

Arctium minus (Hill) Bernh.	Compositae	Lappa minor Hill	kleine klit	beggar's-button	hele plant	whole plant		
Arctium tomentosum Mill.	Compositae		donzige klit	Hairy burdock	hele plant	whole plant		
Argania spinosa (L.) Skeels	Sapotaceae		arganboom	Argan tree	vrucht, pitolie	fruit, kernal oil	Voor de pitolie, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470).	For kernel oil, only products that comply with the authorisation as a novel food ingredient are authorised (Implementing Regulation (EU) 2017/2470).
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Brassicaceae		mierikswortel, mierik	horseradish	wortel	root		
Artemisia abrotanum L.	Compositae	Artemisia procera Willd.	citroenkruid	Lad's-love, southern wormwood	bovengrondse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than

							een inname van thujon hoger dan 6 mg.	6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia absinthium L.	Compositae		absintalsem		bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia capillaris Thunb.	Compositae		welriekende alsem	Capillary wormwood	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia dracunculus	Compositae		dragon	tarragon	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen	The recommend

L.							dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia frigida Willd.	Compositae		westerse bijvoet	Estafiata, fringed-sage, pasture sage, wormwood-sage	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia genipi Weber ex Stechm.	Compositae		alpenbijvoet	rock wormwood	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of

							leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia glacialis L.	Compositae				bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia judaica L.	Compositae				bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia	Compositae		kleine alsem,	small	bovengron	aerial	De	The

pontica L.			pontische alsem	absinthe, Roman wormwood, green-ginger	dse delen	parts	aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia umbelliformi s Lam.	Compositae		kleine alpenabsint	white Genepi, alpine wormwood	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia vallesiaca All.	Compositae				bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the

							bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia verlotiorum Lamotte	Compositae				bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Artemisia vulgaris L.	Compositae		bijvoet	mugwort	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.

Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg	Moraceae		broodboom	Breadfruit tree	vrucht, zaad, hout	fruit, seed, wood	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n lectine bevat. Er kan van deze voorwaarde worden afgeweken indien wetenschap pelijk kan worden aangetoond dat de toegepaste hittebehand eling de beoogde stoffen effectief vernietigt.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of lectins. This condition may be waived if scientific evidence is submitted showing that the heat treatment applied effectively destroys the substances targeted.
Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis	Fucaceae		knotswier	knotted wrack	thallus	thallus		
Asimina triloba (L.) Dunal	Annonaceae		pawpaw	pawpaw	vrucht rijpe	ripe fruit	Analyse moet aantonen dat de bereiding	the analysis must demonstrate that the preparation

							geen detecteerbare hoeveelheden acetogenines bevat.	does not contain any detectable quantity of acetogenins.
Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren	Leguminosae		aspalathus, rooibos thé	Aspalathus, rooibos tea	bovengronde delen	aerial parts		
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.	Asparagaceae		chinese asperge	Chinese asparagus	wortel	root		
Asparagus officinalis L.	Asparagaceae		asperge	Asparagus	wortel, scheut	root, shoot		
Asparagus racemosus Willd.	Asparagaceae		satavari, satavar, shatamull		wortelstok	rhizome		
Astracantha adscendens (Boiss. & Hausskn.) Podlech	Leguminosae	Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn.			gom	gum		
Astracantha cretica (Lam.) Podlech	Leguminosae	Astragalus creticus Lam.			gom	gum		
Astracantha gummifera (Labill.) Podlech	Leguminosae	Astragalus gummifer Labill.			gom	gum		
Astracantha microcephala (Willd.)	Leguminosae	Astragalus microcephalus			gom	gum		

Podlech		halus Willd.						
Astragalus membranaceus Fisch. ex. Bunge	Leguminosae				wortel	root		
Astragalus membranaceus Moench	Leguminosae		astragalus	astragalus	wortel	root		
Astrantia major L.	Apiaceae		zeeuws knoopje, groot sterrenscherm	Greater masterwort	bovengrondse delen	aerial parts		
Athamanta macedonica (L.) Spreng.	Apiaceae				vrucht, blad	fruit, leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Atractylodes lancea (Thunb.) DC.	Compositae				wortelstok , wortel	rhizome, root	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of

							gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	concomitant use of anticoagulants.
Atractylodes macrocephala Koidz.	Compositae				wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Atractylodes ovata (Thunb.) DC.	Compositae				wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Avena fatua L.	Poaceae		oot	common wild oat	bovengronde delen	aerial parts		
Avena sativa	Poaceae		haver,	oats,	bovengron	aerial		

L.			gekweekte haver	cultivated oats	dse delen	parts		
Baccharis trimera (Less.) DC.	Compositae	Baccharis genistello ides var. trimera (Less.) Baker	carqueja	baccharis	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Bacopa monnieri (L.) Wettst.	Plantaginac eae	Bacopa monnieri (L.) Pennell	kleinbladige bacopa, brahmi	Coastal water hyssop, bacopa, Indian- pennywort	hele plant	whole plant		
Bactris gasipaes Kunth	Arecaceae		perzikipalm	peach palm	vrucht	fruit		
Balanites aegyptiaca (L.) Delile	Zygophyllac eae			desert date	hele plant	whole plant		
Ballota nigra L.	Lamiaceae		stinkende ballote	horehound	bovengron dse delen	aerial parts		
Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek	Lamiaceae		stinkende ballote	horehound	hele plant	whole plant		

Bambusa bambos (L.) Voss	Poaceae	Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.	bamboe	bamboo	scheut, stengel	shoot, stem	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan. Er dient een wetenschappelijk bewijs te worden voorgelegd dat de toegepaste voorbehandeling het vrijkomen van waterstofcyanide vanuit de cyanogene glycosiden verhindert.	The raw material must be heat treated. Scientific evidence must be submitted showing that the pre-treatment applied prevents the release of hydrogen cyanide from cyanogenic glycosides
Bambusa vulgaris Schrad.	Poaceae		bamboe	bamboo	scheut, stengel	shoot, stem	De grondstof moet een hittebehandeling ondergaan. Er dient een wetenschappelijk bewijs te worden voorgelegd dat de toegepaste voorbehandeling	The raw material must be heat treated. Scientific evidence must be submitted showing that the pre-treatment applied prevents the

							eling het vrijkomen van waterstofcy anide vanuit de cyanogene glycosiden verhindert.	release of hydrogen cyanide from cyanogenic glycosides
Barbarea verna (Mill.) Asch.	Brassicaceae		vroeg barbarakruid	early winter cress	bovengron dse delen	aerial parts		
Barbarea vulgaris R.Br.	Brassicaceae		gewoon barbarakruid	common wintercress	bovengron dse delen	aerial parts		
Bellis perennis L.	Compositae		madeliefje	common daisy	bovengron dse delen	aerial parts		
Berberis aquifolium Pursh.	Berberidaceae	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	mahonia aquifolium (pursh) nutt.	hollyleaved barberry	wortel	root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	the recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as berberine)–.
Berberis aristata DC.	Berberidaceae				wortel	root	De aanbevolen dagelijkse	the recommended daily

							hoeveelheid van het eindproduct mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as berberine).
Berberis vulgaris L.	Berberidaceae		zuurbes	barberry	wortel	root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	the recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as berberine).
Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae		paranoot, bazielennoten, Amazoniannoten	Brazil nut, Amazonia nut	noot	nut		
Beta vulgaris L.	Amaranthaceae		gekweekte biet	cultivated beetroot	hele plant	whole plant		

Betula alleghaniensis Britton	Betulaceae		gele berk	yellow birch	schors, blad	bark, leaf		
Betula lenta L.	Betulaceae		suikerberk	sweet birch	schors, blad, sap	bark, leaf, sap		
Betula pendula Roth	Betulaceae		ruwe berk	silver birch	knop, schors, blad, teer, sap	bud, bark, leaf, tar, sap		
Betula pubescens Ehrh.	Betulaceae		zachte berk, gewone berk	downy birch, common birch	knop, schors, blad, sap	bud, bark, leaf, sap		
Bixa orellana L.	Bixaceae		orleaanboom	achiote, lipsticktree	blad, vrucht, zaad	leaf, fruit, seed		
Bainvillea acmella (L.) Philipson	Compositae	Spilanthes acmella (L.) Murray, Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen	champagneblad, abc-kruid, parakers	toothache plant, paracress	bovengrondse delen	aerial parts		
Borago officinalis L.	Boraginaceae		bernagie, komkommerkruid	borage, starflower	bloem, zaad	flower, seed	Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidine alkaloiden) van de bijlage van	The food supplement must comply with the provisions of Section 2.4 (pyrrolizidine alkaloids) of the Annex to Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April

							verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatie-dossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006. The notification file must demonstrate this compliance by analysis.
Boronia megastigma Nees ex Bartlett	Rutaceae		boronia	boronia	bovengron dse delen	aerial parts		
Boswellia sacra Flueck.	Burseraceae		wierookboom	frankincense tree	gomhars	gum resin		
Boswellia serrata	Burseraceae		wierookboom	frankincense tree	oliehars, gomhars	oil resin, gum		

Roxb. ex Colebr.						resin		
Brassica cretica Lam.	Brassicaceae				bovengron dse delen	aerial parts		
Brassica napus L.	Brassicaceae	Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.	koolzaad	coleseed	wortel, zaad	root, seed		
Brassica nigra (L.) K.Koch	Brassicaceae		zwarte mosterd	black mustard	bovengron dse delen	aerial parts		
Brassica oleracea L.	Brassicaceae		incl. tuinkool	including garden cabbage	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoï	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of progoitrin or more than 5 mg of goitrin, regardless of the source. The labelling must include the following warning: For people

							die of schildklierb ehandeling: raadpleeg uw arts.	with hypothyroidi sm or taking thyroid treatment, consult your doctor.
Brassica rapa L.	Brassicacea e	Sinapis juncea L.	raapzaad	rapeseed	hele plant	whole plant		
Buglossiodes arvensis	Boraginace ae				olie van het zaad	seed oil	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsing rediënt zijn toegelaten (uitvoerings verordening (EU) 2017/2470).	Only products complying with the authorisatio n as a novel food ingredient are authorised (Implementi ng Regulation (EU) 2017/2470).
Bupleurum chinense DC.	Apiaceae		sikkelgoudsc herm	sickle hare's ear	wortel	root	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of

							anticoagulantia of antidiabetische behandeling	anticoagulants or treatment for diabetes.
Bupleurum rotundifolium L.	Apiaceae		doorwas	hound's ear	bovengronde delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of antidiabetische behandeling	The labelling must include the following warning: consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants or treatment for diabetes.
Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch.	Burseraceae				vrucht, schors	fruit, bark	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden podophyllotoxine en	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of podophyllotoxine or analogues.

							analogen bevat.	
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.	Leguminosa e		grijze knikkernoot	grey marble nut	schors, zaad	bark, seed		
Cakile maritima Scop.	Brassicacea e		zeeraket	sea rocket	blad, wortel	leaf, root		
Calendula arvensis (Vail.) L.	Compositae		akkeroudsbl oem	field marigold	bloem	flower	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken bij zwangersch ap. Niet gebruiken bij leverproble men.	The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant. Do not use if you have liver problems.
Calendula officinalis L.	Compositae		tuigoudsbl oem	calendula, garden marigold	bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken bij zwangersch ap. Niet gebruiken	The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant. Do not use if you have liver problems.

							bij leverproble men.	
Calluna vulgaris (L.) Hull	Ericaceae		struikhei	heather	bovengron dse delen	aerial parts		
Camelina sativa (L.) Crantz	Brassicacea e		huttentut, dederzaad, vlasdodder, vlasdotter	camelina, gold-of- pleasure, false flax, linseed dodder	zaad	seed		
Camellia sinensis (L.) Kuntze	Theaceae		theestruik	tea shrub	blad	leaf	Het voedings- supplement dat extracten bevat die worden vermeld in bijlage III van verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen	The food supplement containing extracts listed in Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods

							en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen, dient te voldoen aan de bepalingen van ditzelfde reglement. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het voedings-supplement dat andere extracten of ongeëxtraheerde bladeren bevat, mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van epigallocatechine-3-gallaat hoger dan 300 mg. Het notificatiedo	must comply with the provisions of that Regulation. The recommended daily portion of the food supplement containing other extracts or leaves without extraction, must not lead to the ingestion of more than 300 mg of epigallocatechin-3 gallate, regardless of the source. The notification file must demonstrate this compliance by analysis. Only the use of the
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							ssier dient deze conformiteit middels analyse aan te tonen. Enkel het gebruik van volgende extractievlo eistoffen zijn toegelaten: water, alcohol met een maximumge halte van 25 %.	following extraction solvents is accepted: water; alcohol with a maximum content of 25 %.
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson	Annonaceae		ylang-ylang	ylang-ylang	bloem	flower	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van saffrol hoger dan 0,6 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 0.6 mg of saffrole, regardless of the source.
Canarium acutifolium (DC.) Merr.	Burseraceae				noot	nut		
Canarium	Burseraceae		pilinoten	pili nuts	gedroogde	dried nut	Enkel de	Only

ovatum Engl.	e				noot		producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënten zijn toegelaten (uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470).	products complying with the authorisation as a novel food ingredient are authorised (Implementing Regulation (EU) 2017/2470).
Capparis spinosa L.	Capparaceae		kappertjes	capers	bovengronde delen	aerial parts		
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Brassicaceae		gewoon herderstasje	shepherd's purse	bovengronde delen	aerial parts		
Capsicum annuum L.	Solanaceae	Capsicum indicum var. vulgatum Dierb	spaanse peper, chilipepers, paprika, groene peper, rode peper	chilli, chilli peppers, bell pepper, green pepper, red pepper	vrucht	fruit		
Capsicum frutescens L.	Solanaceae	Capsicum annuum var. frutescens	tabasco peper	tabasco pepper	Vrucht	fruit		
Carex arenaria L.	Cyperaceae		zandzegge	sand sedge	blad, wortelstok	leaf, rhizome		
Carica papaya L.	Caricaceae		papaja, meloenboom	papaya, melon tree	vrucht	fruit		
Carissa	Apocynaceae		kristusdoorn	Karanda,	vrucht,	fruit, leaf		

carandas L.	e			Bengal- currant, carandas plum	blad			
Carlina acaulis L.	Compositae		zilverdistel	silver thistle	wortel	root	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n carlina oxide bevat. De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedings- supplement en.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of Carlina oxide. Isolated essential oil from this plant is not authorised in food supplements .
Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G.Martens	Compositae		hoge zilverdistel		wortel	root	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n carlina oxide bevat. De	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of Carlina oxide. Isolated

							geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedings-supplementen.	essential oil from this plant is not authorised in food supplements .
Carpinus betulus L.	Betulaceae		haagbeuk	hornbeam	knop, blad	bud, leaf		
Carthamus lanatus L.	Compositae			downy safflower	olie van het zaad, bloem	seed oil, flower		
Carthamus tinctorius L.	Compositae		saffloer	Dyer's-saffron	bloem, zaad	flower, seed		
Carum carvi L.	Apiaceae		echte karwij	caraway, meadow cumin	vrucht	fruit		
Cassia fistula L.	Leguminosae		indische goudenregen	Indian golden chain	vrucht (peul), blad	fruit (pod), leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 18 mg of total anthranoids* (expressed as sennoside B), regardless of the

							18 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for longer than 14 days without specialist advice.
Castanea sativa Mill.	Fagaceae		tamme kastanje	sweet chestnut	schors, bladknop, blad, zaad	bark, leaf bud, leaf, seed		
Catalpa bignonioides Walter	Bignoniaceae		groene trompetboom	Catawba, Indian-bean tree, cigartree	blad	leaf		
Ceanothus americanus L.	Rhamnaceae		amerikaanse sering	new jersey tea	blad	leaf	Analyse moet aantonen dat de bereiding	the analysis must demonstrate that the preparation

							geen detecteerbare hoeveelheden peptide alkaloiden bevat.	does not contain any detectable quantity of peptide alkaloids.
Cecropia peltata L.	Urticaceae			Pumpwood, trumpet tree	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Cedrus libani A. Rich.	Pinaceae		libanonceder, libanese ceder	cedar of lebanon	kegelvrucht, blad, hout	cone, leaf, wood		
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Malvaceae		kapokboom	Kapok tree	bast, blad, olie van het zaad	liber, leaf, seed oil		
Centaurea behen L.	Compositae				bloem	flower		
Centaurea calcitrapa L.	Compositae		kalketrip	Red star-thistle	bloem	flower		
Centaurea centaurium L.	Compositae		centaurie, groot duizendgulde	centaury, large centaury	bloem	flower		

			nkruid					
Centaurea cyanus L.	Compositae		korenbloem	Cornflower	bloem	flower		
Centaurea jacea L.	Compositae		knoopkruid	brown knapweed	bloem	flower		
Centaurea montana L.	Compositae		bergcentaurie	Mountain cornflower	bloem	flower		
Centaurium erythraea Rafn	Gentianaceae	Erythraea centaurium (L.) Pers.	echt duizendguldenkruid	common centaury, gentian	bovengrondse delen	aerial parts		
Centella asiatica (L.) Urb.	Apiaceae	Hydrocotyle asiatica L.	gotu kola	gotu kola, Asian pennywort	bovengrondse delen	aerial parts		
Centranthus ruber (L.) DC	Caprifoliaceae		rode spoorbloem, rode valeriaan	red valerian	wortel	root	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden valepotriaten bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of valepotriates.
Cerasus mahaleb (L.) Mill.	Rosaceae		weichselboom	mahaleb cherry	zaad	seed		
Ceratonia siliqua L.	Leguminosae		johannesbroodbroom	carob	vrucht, zaad	fruit, seed		
Cercis siliquastrum L.	Leguminosae		judasboom	Judas tree	vrucht, gom van het zaad	fruit, seed gum		

Cetraria islandica (L.)	Parmeliaceae		ijslands mos	Icelandic moss	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van usninezuure quivalenten hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 30 mg of usnic acid equivalents, regardless of the source. The concentration of usnic acid in the finished product must not exceed 3 %.
Chaenomeles speciosa Nakai	Rosaceae		chinese sierkwee	Chinese quince	vrucht	fruit		
Chamaemelum nobile (L.) All.	Compositae	Anthemis nobilis L.	roomse kamille	Roman chamomile	bovengrondse delen	aerial parts		
Chamaecrista nomame (Sieber) H. Ohashi	Leguminosae	Cassia nomame (Sieber) Honda			vrucht (peul), blad	fruit (pod), leaf		
Chelone glabra L.	Plantaginaceae		schildpadbloem	turtle flower	bovengrondse delen	aerial parts		
Chenopodium quinoa	Amaranthaceae		quinoa	quinoa	gewassen zaden	washed seeds		

Willd.								
Chenopodium vulvaria L.	Amaranthaceae		stinkende ganzenvoet	stinking goosefoot	hele plant	whole plant	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of ascaridole.
Chimaphila umbellata (L.) Nutt.	Ericaceae	Chimaphila cymosa J.Presl & C.Presl	pipsissewa	pipsissewa	hele plant	whole plant		
Chiococca alba (L.) Hitchc.	Rubiaceae			David's milkberry,	wortel	root		
Chionanthus virginicus L.	Oleaceae		sneeuwvlokkenboom	fringetree, old-man's-beard	wortelschors	root bark		
Chlorella vulgaris Beijerinck	Chlorellaceae	Chlorella communis Artari	chlorella	chlorella	ééncellig alg	single-cell algae		
Chondrus crispus Stackhouse	Gigartinales		iers moswier	Irish moss	thallus	thallus		
Chrysanthellum americanum (L.) Vatke	Compositae				bloeiende toppen	flowering tops		
Chrysanthellum indicum subsp. afroamericanum B.L.	Asteraceae		gele kamille		bovengrondse delen	aerial parts		

Turner								
Chrysophyllum cainito L.	Sapotaceae		cainito, sterappel	star apple	vrucht	fruit		
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty	Poaceae		vetiver	vetiver	wortel	root		
Cichorium endivia L.	Compositae		andijvie	endive	blad	leaf		
Cichorium intybus L.	Compositae		wilde cichorei	wild chicory	hele plant	whole plant		
Cinchona calisaya Wedd.	Rubiaceae	Cinchona ledgeriana (Howard) Bern.Moench ex Trimen	kinaboom, quinaboom	Chinabark, quinine, yellow cinchona	schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 100 mg of quinine, regardless of the source. The labelling must include the following warning: Do not administer to children under 12 years of age.
Cinchona	Rubiaceae				schors	bark	De	The

lancifolia Mutis							aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	recommen ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 100 mg of quinine, regardless of the source. The labelling must include the following warning: Do not administer to children under 12 years of age.
Cinchona micrantha Ruiz & Pav.	Rubiaceae				schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van kinine	The recommen ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 100 mg of quinine,

							hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	regardless of the source. The labelling must include the following warning: Do not administer to children under 12 years of age.
Cinchona nitida Ruiz & Pav.	Rubiaceae				schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 100 mg of quinine, regardless of the source. The labelling must include the following warning: Do not administer to children

							kinderen jonger dan 12 jaar.	under 12 years of age.
Cinchona officinalis L.	Rubiaceae		kinaboom, quinaboom	lojabark, quinine	schors, blad	bark, leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 100 mg of quinine, regardless of the source. The labelling must include the following warning: Do not administer to children under 12 years of age.
Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd.	Rubiaceae				schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the

							bron, niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	ingestion of more than 100 mg of quinine, regardless of the source. The labelling must include the following warning: Do not administer to children under 12 years of age.
Cinchona pubescens Vahl	Rubiaceae		rode kinaboom, rode kinine	red cinchona, red quinine	schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van kinine hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 100 mg of quinine, regardless of the source. The labelling must include the following

							bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	warning: Do not administer to children under 12 years of age.
Cinnamomu m camphora (L.) J.Presl	Lauraceae		kamferboom	Camphor tree	hele plant	whole plant		
Cinnamomu m cassia (Nees & T.Nees) J.Presl	Lauraceae	Cinnamo mum aromatic um Nees	chinese kaneel	Chinese cinnamon	bovengron dse delen	aerial parts		
Cinnamomu m verum J.Presl.	Lauraceae	Cinnamo mum zeylanicu m Blume, Cinnamo mum zeylanicu m Nees	kaneelboom, ceylonkaneel	cinnamon tree, Ceylon cinnamon	schors, blad	bark, leaf		
Cistanche salsa (C.A. Mey.) G. Beck	Orobanchac eae				stengel	stem		
Cistus creticus L.	Cistaceae	Cistus ladanifer us Stokes	rotsroos	hoary rock- rose, pink rock-rose	vrucht, blad, hars	fruit, leaf, resin		
Cistus × incanus L.	Cistaceae		cistusroos	hairy rock- rose	hele plant	whole plant		
Cistus monspeliensi s L.	Cistaceae		rotsroos	Montpellier cistus	vrucht, blad, hars	fruit, leaf, resin		
Citrullus lanatus	Cucurbitac eae		watermeloen	watermelon	vrucht, zaad	fruit, seed		

(Thunb.) Matsum. & Nakai								
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle	Rutaceae		limoen	Egyptian lime	vrucht	fruit		
Citrus aurantium L.	Rutaceae	Citrus aurantiu m L. ssp. amara Engl., Citrus aurantiu m L. ssp. sinensis L., Citrus aurantiu m L. ssp. aurantiu m L, Citrus aurantiu m var. dulcis	bittere oranje appelboom curaçao oranjeappel	Orange, Seville orange	bloem, vrucht, pericarp	flower, fruit, pericarp	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van para- synephrine hoger dan 20 mg. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n meta- synephrine bevat. De etikettering moet de volgende	The recommen ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of para- synephrine, regardless of the source. the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of meta- Synephrine. The labelling must include

							waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Niet gebruiken door personen die behandeld worden voor hypertensie. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij tekenen van onrust of nervositeit, de inname van het product stoppen. Het gelijktijdig gebruik van cafeïne kan de bijwerkingen van dit	the following warnings: Do not use if you are pregnant or breastfeeding. Do not use if you are taking anti-hypertensive treatment. Do not administer to children under 12 years of age. Stop using the product if you experience agitation or restlessness. The concomitant use of caffeine may increase the side effects of this product.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							product versterken.	
Citrus x limon (L.) Osbeck	Rutaceae		citroenboom, limoen	lemon, lemon tree	bovengron dse delen	aerial parts		
Citrus maxima (Burm.) Merr.	Rutaceae	Citrus grandis (L.) Osbeck, Citrus decuman a L.	pompelmoesb oom	Shaddock, pomelo tree	vrucht, blad, zaad	fruit, leaf, seed		
Citrus medica L.	Rutaceae		sucade- citroen, cedraat, citroenboom	citron tree, cedrate	vrucht, zaad	fruit, seed		
Citrus myrtifolia Raf.	Rutaceae	Citrus aurantiu m var. myrtifolia Ker Gawl.	chinotto	myrtle-leaf orange	vrucht, pericarp	fruit, pericarp		
Citrus nobilis Lour.	Rutaceae				vrucht	fruit		
Citrus paradisi Macfad.	Rutaceae		grapefruit	grapefruit	bovengron dse delen	aerial parts		
Citrus reticulata Blanco	Rutaceae		mandarijn, tanquerine, satsuma, clementine	mandarin, tangerine, clementine	bovengron dse delen	aerial parts		
Citrus x sinensis (L.) Osbeck	Rutaceae		sinaasappel	Sweet orange tree	bloem, blad, vrucht	flower, leaf, fruit		
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H.	Cladoniace ae		echt rendiermos	reindeer lichen, caribou lichen	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid	The recommen ded daily portion of

Wigg.							van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van usninezuure quivalenten hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	the finished product must not lead to the ingestion of more than 30 mg of usnic acid equivalents, regardless of the source. The concentration of usnic acid in the finished product must not exceed 3 %.
Clematis armandii Franch.	Ranunculaceae		bosrank		gedroogde stengel	dried stem	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. De voorwaarde tot analyse vervalt indien door een	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of aristolochic acid. Analyses are not required if it can be demonstrated by a botanical certificate

							botanisch certificaat wordt aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	that the parts used come from that plant.
Clematis chinensis Osbeck	Ranunculaceae		chinese clematis		gedroogde wortel	dried root	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden aristolochiazuur bevat. De voorwaarde tot analyse vervalt indien door een botanisch certificaat wordt aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of aristolochic acid Analyses are not required if it can be demonstrated by a botanical certificate that the parts used come from that plant.

							deze plant.	
Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Req.) Govaerts	Lamiaceae	Calamint ha nepeta subsp. glandulos a (Req.) P.W.Ball			blad	leaf		
Clinopodium vulgare L.	Lamiaceae	Calamint ha vulgaris (L.) Druce	borstelkrans	cushion calamint, dogmint	bovengron dse delen	aerial parts		
Clitoria ternatea L.	Leguminosa e		kittelbloem	butterfly pea, blue pea, blue pea vine, Asian pigeonwings	bloem	flower		
Cnicus benedictus L.	Compositae		gezegende distel	Blessed thistle	bovengron dse delen	aerial parts		
Cochlearia officinalis L.	Brassicacea e		echt lepelblad	common scurvy grass	bovengron dse delen	aerial parts		
Cocos nucifera L.	Arecaceae		kokospalm	coconut palm	zaad, vette olie	seed, fatty oil		
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.	Campanula ceae		codonopsis	codonopsis, (pilose) bellflower	wortel	root		
Coffea arabica L.	Rubiaceae		koffie (boom)	coffee (tree)	zaad	seed		
Coffea canephora Pierre ex Froehner	Rubiaceae	Coffea robusta Lind. ex De Wild	robusta koffieplant	robusta coffee tree	zaad	seed		
Coix lacryma-jobi	Poaceae		jobstranen	Job's tears, adlay millet	zaad	seed		

L.								
Coix lacryma-jobi var. ma-yuen (Rom.Caill.) Stapf	Poaceae	Coix ma-yuen Rom. Caill.	jobstranen	Job's tears, adlay millet	zaad, olie van het zaad	seed, seed oil		
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott and Endl.	Malvaceae		kolaboom	Kola nut, kola tree	zaad	seed		
Cola nitida (Vent.) Schott and Endl.	Malvaceae		kolaboom	Kola nut, kola tree	zaad	seed		
Coleus forskohlii (Poir.) Briq.	Lamiaceae				bovengron dse delen, wortel	aerial parts, root	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warnings: Do not use with heart medication. Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Combretum micranthum	combretaceae		kinkeliba	kinkéliba	blad	Leaf	De etikettering	The labelling

G.Don							moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Combretum sundaicum Miq.	Combretaceae				blad, bladsteel	leaf, peduncle		
Commiphora africana (A.Rich.) Endl.	Burseraceae		afrikaanse mirre	African myrrh	gomhars	gum resin	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Commiphora habessinica (O.Berg) Engl.	Burseraceae				gomhars	gum resin	De etikettering moet de volgende waarschuwi	The labelling must include the following

							ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g.	warning: Do not use if you are pregnant or breastfeedin g.
Commiphora mukul Engl.	Burseracea e		guggul	Indian bdellium- tree, guggul	olie- gomhars	oil gum resin	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeedin g.
Commiphora myrrha (Nees) Engl.	Burseracea e	Commiph ora molmol (Engl.) Engl. ex Tschirch	mirre	myrrh	olie- gomhars	oil gum resin	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeedin g.

Commiphora schimperi (O.Bergman) Engl.	Burseracea e				gomhars	gum resin	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeedin g.
Conyza canadensis (L.) Cronquist	Compositae	Erigeron canadens is L.	canadese fijnstraal	Canadian fleabane, Canadian horseweed	hele plant	whole plant		
Copaifera langsdorffii Desf.	Leguminosa e				oliehars van de schors	bark oil resin		
Coptis japonica (Thunb.)	Ranunculac eae				wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as coptisin), regardless

							coptisine) hoger dan 10 mg.	of the source.
Coptis teeta Wall.	Ranunculac eae				wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als coptisine) hoger dan 10 mg.	The recommen ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as coptisin), regardless of the source.
Coptis trifolia (L.) Salisb.	Ranunculac eae				wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt	The recommen ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as coptisin),

							als coptisine) hoger dan 10 mg.	regardless of the source.
Corallina officinalis L.	Corallinace ae				thallus	thallus		
Cordia myxa L.	Boraginace ae		sebestenboo m		vrucht	fruit	Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidin e alkaloïden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumge halten aan bepaalde verontreinig ingen in levensmidde len en tot intrekking van	The food supplement must comply with the provisions of Section 2.4 (pyrrolizidin e alkaloids) of the Annex to Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006. The notification file must demonstrate this compliance by analysis.

							Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatiedossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae		koriander	coriander	bovengron dse delen, olie van het zaad	aerial parts, seed oil	Voor de olie van het zaad, enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470).	For seed oil, only products complying with the authorisation as a novel food ingredient are authorised (Implementing Regulation (EU) 2017/2470).
<i>Cornus florida</i> L.	Cornaceae		grootbloemig e amerikaanse kornoelje	dogwood, flowering dogwood, American box-wood	vrucht, schors	fruit, bark		
<i>Cornus mas</i> L.	Cornaceae		gele kornoelje	yellow dogwood	vrucht	fruit		
<i>Cornus officinalis</i> Siebold &	Cornaceae		japanse kornoelje	Japanese dogwood	vrucht	fruit		

Zucc.								
Cornus sanguinea L.	Cornaceae		rode kornoelje	Bloodtwig/ bloody dogwood, red dogwood, common dogwood, pegwood	knop, vrucht, blad	bud, fruit, leaf		
Corrigiola telephiifolia Pourr.	Molluginaceae				wortel	root		
Corylus avellana L.	Betulaceae		hazelaar	cobnut, common filbert	bladknop, blad, vrucht, zaad	leaf bud, leaf, fruit, seed		
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S. Johnson	Myrtaceae	Eucalyptus citriodora Hook.	citroen eucalyptus	lemon eucalyptus	blad	leaf		
Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr.	Menispermaceae				wortel, stengel	root, stem	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as

							als berberine) hoger dan 10 mg.	berberine), regardless of the source.
Crambe maritima L.	Brassicaceae		zeekool	sea kale	hele plant	whole plant		
Crataegus azarolus L.	Rosaceae		azarooldoorn	azarole	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, leaf, flowering tops	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidin es hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	The recommend ed daily portion must not lead to the ingestion of more than 22.5 mg of oligomeric procyanidin es or 2.6 mg of flavonoids.
Crataegus curvisepala Lindm.	Rosaceae		koraalmeidoorn	coral hawthorn	vrucht, blad, bloeiende top	fruit, leaf, flowering tops	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidin es hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan	The recommend ed daily portion must not lead to the ingestion of more than 22.5 mg of oligomeric procyanidin es or 2.6 mg of flavonoids.

							2,6 mg.	
Crataegus laevigata (Poir.) DC.	Rosaceae	Crataegus oxyacantha auct.	tweestijlige meidoorn	midland hawthorn	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	leaf bud, leaf, flowering tops, seed	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	The recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than 22.5 mg of oligomeric procyanidines or 2.6 mg of flavonoids.
Crataegus monogyna Jacq.	Rosaceae		eenstijlige meidoorn	hawthorn	bladknop, blad, bloeiende top, zaad	leaf bud, leaf, flowering tops, seed	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	The recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than 22.5 mg of oligomeric procyanidines or 2.6 mg of flavonoids.
Crataegus pentagyna Waldst. & Kit.	Rosaceae				vrucht, blad, bloeiende top	fruit, leaf, flowering tops	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid	The recommended daily portion must

							mag niet leiden tot een inname van oligomere procyanidines hoger dan 22,5 mg en van flavonoiden hoger dan 2,6 mg.	not lead to the ingestion of more than 22.5 mg of oligomeric procyanidines or 2.6 mg of flavonoids.
Crithmum maritimum L.	Apiaceae		zeevenkel	samphire	blad	leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Crocus sativus L.	Iridaceae		saffraankrokus	saffron	bloem	flower	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg	The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant. Consult your doctor or pharmacist in the event

							uw arts of apotheker bij gelijktijdige behandeling met anti-depressiva.	of concomitant use of treatment for depression.
Crossostephium chinense (A.Gray ex L.) Makino	Compositae				bovengronde delen	aerial parts		
Cruciata laevipes Opiz	Rubiaceae	Galium cruciata (L.) Scop.	kruisbladwals tro	crosswort	bovengronde delen	aerial parts		
Cryptocarya agathophylla van der Werff	Lauraceae	Ravensara aromatica Sonn.; Agathophyllum aromaticum (Sonn.) Willd	ravensara		vrucht	fruit		
Cucumis melo L.	Cucurbitaceae		meloen	melon	vrucht, zaad	fruit, seed		
Cucumis sativus L.	Cucurbitaceae		comcommer	cucumber	vrucht	fruit		
Cucurbita maxima Duch.	Cucurbitaceae		reuzenpompoen	Atlantic giant pumpkin, great pumpkin	vrucht	fruit		
Cucurbita pepo L.	Cucurbitaceae		courgette, pompoen, sierpompoen	squash, gourd, marrow, pumpkin	bloem, vrucht	flower, fruit		
Cuminum	Apiaceae		komijn	cumin	vrucht	fruit		

cyminum L.								
Cupressus sempervirens L.	Cupressaceae		italiaanse cipres	Italian cypress	schors, vrucht, blad	bark, fruit, leaf		
Curcuma longa L.	Zingiberaceae	Curcuma domestica Val., Curcuma domestica Loir., Amomum curcuma Jacq	kurkuma	common turmeric, turmeric rhizome, Indian-saffron	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij galproblemen.	The labelling must: include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants. Do not use if you have biliary problems.
Curcuma xanthorrhiza Roxb.	Zingiberaceae		curcuma	Javanese ginger, Javanese turmeric	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula	The labelling must: include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagula

							ntia. Niet gebruiken bij galproblemen.	nts. Do not use if you have biliary problems.
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe	Zingiberaceae		javaanse curcuma, zedoarwortelstok	Zedoary, white turmeric	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij galproblemen.	The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants. Do not use if you have biliary problems.
Cuscuta chinensis Lam.	Convolvulaceae		duivelsnaaigaren	Chinese dodder	zaad	seed		
Cuscuta epithymum Murray	Convolvulaceae		klein warkruid	clover dodder	bovengronde delen	aerial parts		
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.	Leguminosae		guarplant	guar plant, guar bean, Calcutta-lucerne	zaad, gom	seed, gum		
Cyathula officinalis K.C. Kuan	Amaranthaceae				wortel	root	De etikettering moet de	The labelling must include

							volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	the following warning: Do not use if you are pregnant.
Cyclanthera pedata (L.) Schrader.	Cucurbitaceae		caigua, mexicaanse augurk	caigua, slipper gourd, lady's-slipper	vrucht, blad	fruit, leaf		
Cydonia oblonga Mill.	Rosaceae	Cydonia vulgaris Pers.	kwee	quince	vrucht	fruit		
Cymbopogon citratulus (DC.) Stapf	Poaceae		citroengras	lemongrass	bovengron dse delen	aerial parts		
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W.Watson	Poaceae	Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Stapf			bovengron dse delen	aerial parts		
Cymbopogon jwarancusa subsp. Olivieri (Boiss.) Soenarko	Poaceae	Cymbopogon laniger (Desf.) Duthie			bovengron dse delen	aerial parts		
Cymbopogon martini (Roxb.) Will. Watson	Poaceae		palmarossa	palmarosa	bovengron dse delen	aerial parts		
Cymbopogon nardus (L.)	Poaceae		citronella	citronella, citronella	bovengron dse delen	aerial parts		

Rendle				grass, Ceylon citronella				
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.	Poaceae	Andropogon schoenanthus L.	kameelgras		bovengronde delen	aerial parts		
Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor	Poaceae		java citronella	Java citronella	bovengronde delen	aerial parts		
Cynara cardunculus L.	Compositae		kardoen	Artichoke thistle	bloemhoofd, blad	flower head, leaf		
Cynara scolymus L.	Compositae		artisjok	Artichoke	bloemhoofd, blad	flower head, leaf		
Cyperus rotundus L.	Cyperaceae		notengras	nutgrass	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Cytinus hypocistis (L.) L.	Cytinaceae		gele hypocist		bloem, sap	flower, juice		
Daemonorops draco (Willd.) Blume	Arecaceae	Daemonorops propinqua Becc.; Calamus draco			vrucht, hars	fruit, resin		

		Willd.						
Dahlia pinnata Cav.	Compositae	Dahlia variabilis (Willd.) Desf.		dahlia	wortel	root		
Daucus carota L.	Apiaceae		peen	carrot	wortel, zaad	root, seed		
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.	Compositae		tuinchrysant	garden chrysanthemum	bloem, blad	flower, leaf		
Descurinia sophia (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae		sofiekruid	Flaxweed, tansymustard	blad, zaad	leaf, seed	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoïdie of	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of progoitrin or more than 5 mg of goitrin, regardless of the source. The labelling must include the following warning: For people with

							schildklierb ehandeling: raadpleeg uw arts.	hypothyroidi sm or taking thyroid treatment, consult your doctor.
Desmodium adsendens DC.			Desmodium	Desmodium	blad	leaf	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n dimethyltryp tamine derivaten en alkaloïden van het type beta- carboline (type harmane) bevat.	The analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable amounts of dimethyltryp tamine derivatives or beta- carboline- type (harmane type) alkaloids.
Dianthus caryophyllus L.	Caryophylla ceae		tuinanj	Garden carnation	bloem	flower		
Dimocarpus longan Lour.	Sapindacea e	Euphoria longan (Lour.) Steud.	longan	longan	zaadmante l, bloem, vrucht	Seed coat, flower, fruit		
Dioscorea alata L.	Dioscoreac eae				wortelknol	tuber	Analyse moet aantonen dat de	the analysis must demonstrate that the

							bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n alkaloiden bevat.	preparation does not contain any detectable quantity of alkaloids.
Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palib.) C. Pei & C. T. Ting	Dioscoreac eae				wortelstok	rhizome		
Dioscorea composita Hemsl.	Dioscoreac eae				wortelknol	tuber		
Dioscorea oppositifolia L.	Dioscoreac eae	Dioscore a opposita Thunb.	yam	yam	wortel, wortelstok	root, rhizome		
Dioscorea polystachya Turcz.	Dioscoreac eae	Dioscore a batatas Decne	yamswortel, chinese igname	yam, Chinese igname	wortelstok	rhizome		
Dioscorea villosa L.	Dioscoreac eae		wilde yam	wild yam	wortelknol	tuber		
Diospyros kaki Thunb.	Ebenaceae		kaki	kaki, Chinese persimmon	vrucht, blad, zaad	fruit, leaf, seed		
Diospyros virginiana L.	Ebenaceae		amerikaanse persimoen	American persimmon, common persimmon	vrucht, olie van het zaad	fruit, seed oil		
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC	Brassicacea e		grote zandkool, wilde rucola	large sand cabbage, wild rocket	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het	The recommend ed daily portion of the finished

							eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoïdie of schildklierbehandeling: raadpleeg uw arts.	product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of progoitrin or more than 5 mg of goitrin, regardless of the source. The labelling must include the following warning: For people with hypothyroidism or taking thyroid treatment, consult your doctor.
Dipsacus fullonum L.	Caprifoliaceae		grote kaardebol, wilde kaardebol	large teasel, wild teasel	wortel	root		
Dipsacus inermis Wall.	Caprifoliaceae	Dipsacus asper Wallich., Dipsacus asperoides C. Y. Cheng	sechuan kaardebol, xuduan	Sechuan teasel, xuduan	wortel	root		

		and T. M. Ai						
Dipsacus japonicus Miq.	Caprifoliaceae		japanse kaardebol	Dipsacus japonicus Miq.	wortel	root		
Dorstenia contrajerva L.	Moraceae				wortel	root		
Dracocephalum moldavica L.	Lamiaceae			Moldavian dragonhead	blad, zaad	leaf, seed		
Drimys winteri J.R.Forst. & G.Forst.	Winteraceae				bast	liber		
Drosera anglica Huds.	Droseraceae	Drosera longifolia L.	lange zonnedaauw	English sundew, great sundew	hele plant	whole plant	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of naphthoquinones.
Drosera intermedia Hayne	Droseraceae		kleine zonnedaauw	Narrow-leaved sundew	hele plant	whole plant	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of naphthoquin

							naftochinon en bevat.	ones.
<i>Drosera peltata Thunb.</i>	Droseracea e				bovengron dse delen	aerial parts	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n naftochinon en bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of naphthoquin ones.
<i>Drosera ramentacea Burch ex DC</i>	Droseracea e				hele plant	whole plant	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n naftochinon en bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of naphthoquin ones.
<i>Drosera rotundifolia L.</i>	Droseracea e		ronde zonnedauw	round-leaf sundew	bovengron dse delen	aerial parts	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n naftochinon	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of naphthoquin ones.

							en bevat.	
Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco	Dunaliellaceae	Haematococcus salinus Dunal						
Durvillea antarctica (Chamisso) Hariot	Durvillaeaceae	Fucus antarcticus Chamisso			thallus	thallus		
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	Chenopodium botrys L.	druifkruid		bloeiwijzen	inflorescences	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden ascaridole bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of ascaridole.
Echinacea angustifolia DC.	Echinacea		kogelbloem, rode zonnebloem	narrow-leaved (purple) coneflower	wortel	root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2,4 g gedroogde wortel.	The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 2.4 g of dried root.
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.	Compositae		bleekbladige zonnehoed	pale purple coneflower	hele plant	whole plant	Voor bereidingen van de	For root or rhizome preparations

							wortel of wortelstok : De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 720 mg gedroogde wortel.	: The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 720 mg of dried root.
Echinacea purpurea (L.) Moench	Compositae		purperen rudbeckia, rode zonnehoe	Purple coneflower	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 2 g gedroogde kruid.	The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 2 g of dried grass.
Echium plantagineum L.	Boraginaceae		slangenkruid	purple viper's-bugloss	olie van het zaad	seed oil	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsing	Only products complying with the authorisation as a novel food

							rediënt zijn toegelaten (uitvoerings verordening (EU) 2017/2470). Het voedings-supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidine alkaloiden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van	ingredient are authorised (Implementing Regulation (EU) 2017/2470). The food supplement must comply with the provisions of Section 2.4 (pyrrolizidine alkaloids) of the Annex to Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006. The notification file must demonstrate this
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatiedossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	compliance by analysis.
Eisenia bicyclis (Kjellman) Setchell	Lessoniaceae		aramé	aramé	thallus	thallus		
Elaeis guineensis Jacq.	Arecaceae		oliepalm	African oil palm	olie van de pit	kernel oil		
Elettaria cardamomum (L.) Maton.	Zingiberaceae		echte kardemom, kardoem	common cardamom, green cardamom	zaad	seed		
Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.	Araliaceae	Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms.	Siberische ginseng	Siberian ginseng	wortel	root		
Elymus repens (L.) Gould	Poaceae	Agropyron repens (L.) P. Beauv.	kweek, graswortel	couch grass	wortelstok	rhizome		
Embelia Ribes Burm.f.	Primulaceae				wortel, blad, vrucht	root, leaf, fruit	De etikettering moet de volgende	The labelling must include the

							waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	following warning: Do not use if you are pregnant.
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Onagraceae		gewoon wilgenroosje	rosebay willowherb	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Onagraceae		viltige bastwezerik, kleinbloemig wilgeroosje	hoary willowherb	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae		heermoes	common horsetail	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Equisetaceae		holpijp	water horsetail	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Equisetaceae		schaafstro	rough horsetail	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Equisetaceae		reuzenpaardenstaart	great horsetail	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Erica cinerea</i> L.	Ericaceae		rode dophei	bell heather	bloeiwijze	inflorescences		
<i>Erica tetralix</i> L.	Ericaceae		gewone dophei	common heather	bloem	flower		
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae		japanse mispel, loquat	Japanese plum, loquat	blad, zaad	leaf, seed		
<i>Eriodictyon californicum</i> (Hook. and Arn.) Torr.	Boraginaceae		heilig kruid, yerba sancta	holy herb, yerba sancta	bovengron dse delen	aerial parts		

Erodium cicutarium L. 'Hérit.	Geraniaceae		gewone reigersbek	common stork's bill	hele plant	whole plant		
Eruca vesicaria L. Cav.	Brassicaceae	Eruca sativa Mill.	Rucola, raketsla	rocket, rocket lettuce	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoï die of schildklierbe handeling: raadpleeg uw arts.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of progoitrin or more than 5 mg of goitrin, regardless of the source. The labelling must include the following warning: For people with hypothyroidism or taking thyroid treatment, consult your doctor.
Eryngium campestre L.	Apiaceae		echte kruisdistel	common eryngo	bovengron dse delen	aerial parts		
Eschscholzia	Papaveraceae		slaapmutsje	golden poppy	bovengron	aerial		

californica Cham.	ae				dse delen	parts		
Eucalyptus dives Schauer	Myrtaceae		pepermunt eucalyptus	blue peppermint	blad, twijg	leaf, twigs		
Eucalyptus globulus Labill.	Myrtaceae		eucalyptusboom, koortsboom	eucalyptus, fever tree, blue gum	schors, vrucht, blad	bark, fruit, leaf		
Eucalyptus odorata Behr	Myrtaceae				blad	leaf		
Eucalyptus radiata Sieber ex DC.	Myrtaceae			narrow-leaved peppermint gum	blad	leaf		
Eucalyptus smithii R.T.Baker	Myrtaceae				schors, vrucht, blad	bark, fruit, leaf		
Eucheuma horridum J. Agardh	Solieriaceae				thallus	thallus		
Eucheuma spinosum J. Agardh.	Solieriaceae				thallus	thallus		
Eucommia ulmoides Oliv.	Eucommiaceae		gutta-percha boom, chinese rubberboom	gutta-percha tree	schors	bark		
Eugenia uniflora L.	Myrtaceae		surinaamsekers	Surinam cherry	schors, bloem, vrucht, blad	bark, flower, fruit, leaf		
Euphrasia rostkoviana Hayne	Orobanchaceae	Euphrasia officinalis L.	beklierde ogentroost	eyebright	bovengron dse delen	aerial parts		
Euphrasia	Orobanchaceae		stijve	stiff	bovengron	aerial		

stricta D. Wolff ex J.F. Lehm.	eae		ogentroost, ogentroost	eyebright, eyebright	dse delen	parts		
Euterpe oleracea Mart.	Arecaceae		açaí	açaí, assai palm, cabbage palm	vrucht, zaad	fruit, seed		
Evernia prunastri (L.) Ach.	Parmeliaceae		eikmos, gewoon geweimos	oakmoss	thallus	thallus		
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult.	Rubiaceae				schors	bark	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Fabiana imbricata Ruiz & Pav	Solanaceae				hele plant	whole plant		
Fagopyrum esculentum Moench	Polygonaceae	Polygonum fagopyrum L.	gewone boekweit	common buckwheat, black wheat	bovengronde delen	aerial parts		
Fagus sylvatica L.	Fagaceae		gewone beuk	common beech	schors, knop, vrucht	bark, bud, fruit		

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Dec.	Polygonaceae	Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.	Japanse duizendknoop	Japanese knotweed	hele plant	whole plant		
Ferula assafoetida L.	Apiaceae		duivelsdrek	Asafoetida	wortel, gomhars	root, gum-resin		
Ficus benghalensis L.	Moraceae		banyan	banyan	schors, vrucht	bark, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Ficus carica L.	Moraceae		vijg	common fig	hele plant	whole plant		
Ficus religiosa L.	Moraceae		bodhiboom	bodhi tree	schors, vrucht, blad	bark, fruit, leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist

							apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim	Rosaceae	Spirea ulmaria L.	moerasspirea , geitenbaard	meadowsweet, goatsbeard	bovengrondse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants. Not to be used in children and adolescents under 18 years of age.
Filipendula vulgaris Moench.	Rosaceae		knolspirea	dropwort	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg	The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or

							uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants. Not to be used in children and adolescents under 18 years of age.
Foeniculum vulgare Mill.	Apiaceae		venkel	fennel	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor de andere consumenten dient de hoeveelheid	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 0.05 mg of estragole/kg bodyweight for children under 12 years of age, regardless of the source. For other consumers, the amount of estragole

							estragol zo laag mogelijk te blijven.-De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten: Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	must remain as low as possible.- The labelling must include the following warning: Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl	Oleaceae		forsythia	forsythia	vrucht, blad, wortel	fruit, leaf, root		
Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier	Rosaceae		aardbei	garden strawberry	hele plant	whole plant		
Fragaria vesca L.	Rosaceae		bosaardbei	wild strawberry, woodland strawberry	vrucht, blad	fruit, leaf		
Fragaria viridis Weston	Rosaceae		heuvelaardbei	creamy strawberry, green strawberry	hele plant	whole plant		
Frangula alnus Mill.	Rhamnaceae	Frangula dodonei Ard.,	sporkehout, vuilboom	alder buckthorn	schors	bark	De aanbevolen dagelijkse	The recommended daily

		Rhamnus frangula L.					hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als glucofrangul ine A) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen	portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids * (expressed as glucofrangul in A), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeedin g. Not to be used for more than 14 days without
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

							gebruiken zonder deskundig advies.	specialist advice.
Frangula purshiana Cooper	Rhamnacea e	Rhamnus purshian a DC.	Cascara	cascara buckthorn	schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoids n* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids * (expressed as cascaroside A), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are

							ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	pregnant or breastfeedin g. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Fraxinus excelsior L.	Oleaceae		gewone es	common ash	bovengron dse delen	aerial parts		
Fraxinus ornus L.	Oleaceae		pluim-es, manna-es	manna ash	blad, manna	leaf, manna		
Fucus serratus L.	Fucaceae		zaagwier	serrated wrack	thallus	thallus		
Fucus vesiculosus L.	Fucaceae		fucus, blaaswier	Bladder wrack	thallus	thallus		
Fumaria officinalis L.	Papaverace ae		gewone duivekervel	common fumewort	bovengron dse delen	aerial parts		
Galeopsis segetum Neck.	Lamiaceae	Galeopsis ochroleuc a Lam.	Bleekgele hennepnetel	downy hemp nettle	bovengron dse delen	aerial parts		
Galium aparine L.	Rubiaceae		kleefkruid	bedstraw, catchweed bedstraw	bovengron dse delen	aerial parts		
Galium mollugo L.	Rubiaceae		glad walstro	hedge bedstraw	bovengron dse delen	aerial parts		
Galium odoratum (L.) Scop.	Rubiaceae	Asperula odorata L.	lievevrouweb edstro	sweet woodruff	Bovengron dse delen	aerial parts		
Galium verum L.	Rubiaceae		geel walstro	yellow bedstraw	bovengron dse delen	aerial parts		
Garcinia ×	Clusiaceae		mangostan	mangosteen	vrucht	fruit		

mangostana L.								
Gardenia jasminoides J. Ellis	Rubiaceae	Gardenia augusta (L.) Merr.	Gardenia	common gardenia, Cape jasmine	hele plant	whole plant		
Gastrodia elata Blume	Orchidaceae				hele plant	whole plant		
Gaultheria procumbens L.	Ericaceae		liggende bergthee	checkerberry , eastern teaberry, boxberry, American wintergreen	bovengron dse delen	aerial parts		
Gelidium amansii J.V. Lamouroux	Gelidiaceae				thallus	thallus		
Gelidium sesquipedale (Clemente) Thuret	Gelidiaceae		agar agar	agar agar	thallus	thallus		
Gentiana lutea L.	Gentianaceae		gele gentiaan	(great) yellow gentian	wortelstok , wortel	rhizome, root		
Geranium maculatum L.	Geraniaceae				bovengron dse delen	aerial parts		
Geranium pratense L.	Geraniaceae		beemdooievaarsbek	Meadow Crane's bill, meadow geranium	bovengron dse delen	aerial parts		
Geranium robertianum L.	Geraniaceae		robertskruid	herb-Robert	bovengron dse delen	aerial parts		
Geranium sanguineum L.	Geraniaceae		bloedooievaarsbek	bloody crane's bill	bovengron dse delen	aerial parts		

Geum rivale L.	Rosaceae		knikkend nagelkruid	water avens	hele plant	whole plant		
Geum urbanum L.	Rosaceae		geel nagelkruid	yellow avens	hele plant	whole plant		
Ginkgo biloba L.	Ginkgoaceae		ginkgo	ginkgo	blad	leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van flavonolglycosiden hoger dan 21,6 mg en van terpeenlactonen hoger dan 5,4 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of	The recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than 21.6 mg of flavonol glycosides or 5.4 mg of terpenic lactones. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor in case of simultaneous use of anticoagulants. Do not use during pregnancy or breastfeeding.

							borstvoeding.	
Glycine max (L.) Merr.	Leguminosae		soja	soybean	zaad	seed	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed as glycoside of the main component), regardless of the source.
Glycyrrhiza glabra L.	Leguminosae		zoethout	liquorice	wortel	root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizinezuur hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing	The recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than 100 mg of glycyrrhizinic acid. The labelling must include the following warning: Do

							ng bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	not use for more than 6 weeks without medical advice.
Glycyrrhiza uralensis Fisch. Ex DC.	Leguminosa e		chinees zoethout	Chinese liquorice	wortel, wortelstok , stolon	root, rhizome, stolon	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van glycyrrhizin ezuur hoger dan 100 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet langer dan 6 weken gebruiken zonder medisch advies.	The recommen ed daily portion must not lead to the ingestion of more than 100 mg of glycyrrhizini c acid. The labelling must include the following warning: Do not use for more than 6 weeks without medical advice.
Gossypium herbaceum L.	Malvaceae		katoenplant, oosters katoen	cotton plant, oriental cotton	pilus, wortel, zaad	pilus, root, seed	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het	The recommen ed daily portion of the finished

							eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van gossypol hoger dan 0,6 mg.	product must not lead to the ingestion of more than 0.6 mg gossypol, regardless of the source.
Gossypium hirsutum L.	Malvaceae		behaarde katoen	American cotton, upland cotton	zaad	seed	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van gossypol hoger dan 0,6 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 0.6 mg gossypol, regardless of the source.
Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham	Gracilariaceae		knoopwier		thallus	thallus		
Grindelia camporum Greene	Compositae		gomplant	Gumweed	bovengronde delen	aerial parts		
Grindelia hirsutula	Compositae	Grindelia humilis			Bovengronde delen	aerial parts		

Hook. & Arn.		Hook & Ar.						
Grindelia robusta Nutt.	Compositae		grindelia	Great valley gumweed	bovengron dse delen	aerial parts		
Grindelia squarrosa (Pursh) Dun.	Compositae		grindelia	Gumweed	bovengron dse delen	aerial parts		
Guaiacum officinale L.	Zygophyllac eae		guajakhout, echt pokhout	guaiacwood	schors, hout	bark, wood		
Guaiacum sanctum L.	Zygophyllac eae		guajakhout, pokhout	structural timber.	schors, hout	bark, wood		
Guazuma ulmifolia Lamk.	Malvaceae			West Indian elm or bay cedar	schors, blad, vrucht, zaad	bark, leaf, fruit, seed	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino	Cucurbitaceae		jiaogulan	jiaogulan	blad	leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg	The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or

							uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling . Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.	pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes. Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Gypsophila paniculata L.	Caryophyllaceae		pluimgipskruid	baby's breath	wortel	root		
Haematococcus pluvialis Flotow	Haematococcaceae		bloedregenalg	haematococcus pluvialis	ééncellig alg	single-cell algae		
Haematoxylum campechianum L.	Leguminosae		campechehout	campeche wood, logwood, bloodwood	ongefermenteerd kernhout	unfermented heartwood		
Hamamelis virginiana L.	Hamamelidaceae		virginische toverhazelaar	witch-hazel	schors, blad	bark, leaf		
Haplopappus baylahuen Remy	Compositae				bovengrondse delen	aerial parts		
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.	Pedaliaceae		duivelsklauw	devil's claw	secundaire wortelknol	secondary tuber	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal	The recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than

							iridoïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.	40 mg of total iridoids (expressed as harpagoside). The labelling must include the following warning: Do not use if you have gastric or duodenal ulcer or gallstones.
Harpagophytum zeyheri Decne.	Pedaliaceae			devil's claw, grapple plant	wortel, wortelknol	root, tuber	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van totaal iridoïden (berekend als harpagoside) hoger dan 40 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing	The recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than 40 mg of total iridoids (expressed as harpagoside). The labelling must include the following warning: Do

							bevatten : Niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.	not use if you have gastric or duodenal ulcer or gallstones.
Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen	Amaranthac eae	Pfaffia paniculat a (Mart.) Kuntze	braziliaanse ginseng	Brazilian ginseng	wortel	root		
Hedeoma pulegioides (L.) Pers.	Lamiaceae		hedeoma	hedeoma	bovengron dse delen	aerial parts		
Hedera helix L.	Araliaceae		klimop	ivy	blad	leaf	Enkel de volgende preparaten zijn toegelaten, in overeenstem ming met de volgende maximale dagelijkse dosis: a) droog extract (DER 4-8:1), extractie solvent ethanol 24- 30% m/m b) droog extract (DER 6-7:1), extractie	Only the following preparations are authorised, with the correspondi ng maximum daily doses: a) dry extract (DER 4-8:1), extraction solvent ethanol 24- 30 % m/m b) dry extract (DER 6-7:1), extraction solvent ethanol

							solvent ethanol 40% m/m c) droog extract (DER 3-6:1), extractie solvent ethanol 60% m/m d) vloeibaar extract (DER 1:1), extractie solvent ethanol 70% v/v e) soft extract (DER 2.2-2.9:1), extractie solvent ethanol 50% v/v: propylene glycol (98:2) Maximale dagelijkse dosis : Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen : a) 31 mg	40 % m/m c) dry extract (DER 3-6:1), extraction solvent ethanol 60 % m/m d) liquid extract (DER 1:1), extraction solvent ethanol 70 % m/m e) soft extract (DER 2.2-2.9:1), extraction solvent ethanol 50 % m/m: propylene glycol (98:2) Maximum daily doses: Adolescents over 12 years of age and adults: a) 31 mg b) 29 mg c) 46 mg d) 210 mg e) 84 mg
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							b) 29 mg c) 46 mg d) 210 mg e) 84 mg Kinderen van 6 tot 11 jaar : a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg Kinderen van 3 tot 5 jaar : a) 16 mg b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg	Children from 6 to 11 years of age: a) 23 mg b) 10 mg c) 35 mg d) 157 mg e) 56 mg Children from 3 to 5 years of age: a) 16 mg b) 11 mg c) 23 mg e) 42 mg
Hedychium coronarium J. Koenig	Zingiberace ae				bloem, wortelstok	flower, rhizome		
Helianthus annuus L.	Compositae		gewone zonnebloem	common sunflower	bovengron dse delen	aerial parts		
Helianthus tuberosus L.	Compositae		aardpeer	Jerusalem artichoke, earth apple	knol	tuber		
Helichrysum arenarium (L.) Moench.	Compositae		strobloem, zandstrobloe m	sandy everlasting, dwarf everlast, straw flower, sand straw flower	bovengron dse delen	aerial parts		
Helichrysum italicum (Roth.) G.	Compositae		kerrieplant	white-leaved everlasting, Italian	bovengron dse delen	aerial parts		

Don.				everlasting, curry plant				
Helichrysum stoechas (L.) Moench	Compositae		gele strobloem	shrubby everlasting, goldilocks, yellow straw flower	bovengron dse delen	aerial parts		
Heracleum sphondylium L.	Apiaceae		gewone berenklauw	common hogweed	hele plant	whole plant		
Herniaria glabra L.	Caryophylla ceae		kaal breukkruid	smooth rupturewort	hele plant	whole plant		
Herniaria hirsuta L.	Caryophylla ceae				bovengron dse delen	aerial parts		
Hesperis matronalis L.	Brassicacea e		damastbloem	damask violet, dame's rocket	bovengron dse delen	aerial parts		
Hibiscus sabdarriffa L.	Malvaceae		roselle, jamaïcazurin g	roselle, Jamaica sorrel	tak, bloem, blad, zaad	branch, flower, leaf, seed		
Hieracium pilosella L.	Compositae		muizenoor	mouse-ear hawkweed	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeedin g.
Hierochloe odorata (L.)	Poaceae	Hierochlo e odorata	veenreukgras	holy grass	bovengron dse delen	aerial parts		

Beauv.		(L.) Wahl.						
Himanthalia elongata (L.) S.F. Gray	Himanthali aceae		riemwier	thongweed	thallus	thallus		
Hippophae rhamnoides L.	Eleagnacea e		duindoorn	sea buckthorn	vrucht, olie van de bes	fruit, berry oil	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagula nts.
Hizikia fusiformis (Harvey) Okamura	Sargassacea e		hai zao	hai zao, hijiki, hiziki	thallus	thallus		
Hordeum vulgare L.	Poaceae		incl. gewone gerst, zesrijige gerst	incl. regular barley, six- row barley	zaad, wortel, scheut	seed, root, shoot		
Houttuynia cordata Thunb.	Saururacea e				hele plant	whole plant		
Humulus lupulus L.	Cannabacea e		hop	hops	bloeiwijze n	infloresce nces	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname	The recommen ded daily portion must not lead to the ingestion of

							van 8-prenylnarin genine hoger dan 400 µg. Bij gebruik van deze plant met andere planten waarvoor een limiet van 40 mg isoflavonen werd opgelegd, is 400 µg 8-prenylnarin genine equivalent aan 8 mg isoflavonen.	more than 400 µg of 8-prenylnarin genin. When this plant is used together with other plants for which a limit of 40 mg of isoflavones has been imposed, 400 µg of 8-prenylnarin genin is equivalent to 8 mg isoflavones.
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.	Lycopodiaceae	Lycopodium serratum Thunb.			bovengrondse delen	aerial parts		
Hydrastis canadensis L.	Ranunculaceae		canadese geelwortel	Goldenseal, Canadian turmeric	wortel, wortelstok	root, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline

							isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	alkaloids (expressed as berberine), regardless of the source.
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine	Acanthaceae				blad, wortel, zaad	leaf, root, seed		
Hymenaea courbaril L.	Leguminosae		lokusboom, gomcopal	courbaril, West Indian locust, Brazilian copal	schors, fruit, blad, zaad, hars	bark, fruit, leaf, seed, resin		
Hypericum perforatum L.	Hyperaceae		sint-janskruid	St John's wort	bovengronde delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van hypericine hoger dan 700 µg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen	The recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than 700 µg of hypericin. The labelling must include the following warning: Inform your doctor or pharmacist if you are taking

							elen uw arts of apotheker informeren.	medicinal products at the same time.
Hyssopus officinalis L.	Lamiaceae		hyssop	hyssop	bovengron dse delen	aerial parts		
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.	Aquifoliaceae		mate	maté	blad	leaf		
Illicium verum Hook. f.	Schisandra ceae		chinese steranijs	Chinese star anise	schors, vrucht	bark, fruit		
Impatiens balsamina L.	Balsaminaceae		tuinbalsemien	garden balsam	bovengron dse delen	aerial parts		
Indigofera tinctoria L.	Leguminosae		indigostruik	Indigo bush	blad	leaf	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of indospicin.
Inula britannica L.	Compositae		engelse alant	British elecampane	bovengron dse delen	aerial parts		
Inula helenium L.	Compositae		griekse alant	Elecampane, scabwort	blad, wortelstok , wortel	leaf, rhizome, root		
Ipomoea batatas (L.) Poir	Convolvulaceae		zoete aardappel	sweet potato	knol	tuber		
Isatis tinctoria L.	Brassicaceae		wede	woad	bovengron dse delen, sap	aerial parts, juice	De aanbevolen dagelijkse	The recommended daily

						hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indirubine bevat. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoïdie of schildklierbehandeling: raadpleeg uw arts.	portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of progoitrin or more than 5 mg of goitrin, regardless of the source. the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of indirubin. The labelling must include the following warning: For people with hypothyroidism or taking thyroid treatment,
--	--	--	--	--	--	---	--

								consult your doctor.
Jasminum grandiflorum L.	Oleaceae		grootbloemig e jasmijn	Spanish jasmine	bloem	flower		
Jasminum officinale L.	Oleaceae		gewone jasmijn	common jasmine, poet's jasmine	bloem	flower	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Jateorhiza palmata (Lam.) Miers	Menispermaceae	Menispermum palmatum Lam.	kolombo, calumbo	colombo, calumb	wortel	root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as berberine) regardless of the source.

Juglans cinerea L.	Juglandaceae		witte walnoot, boternoot	white walnut, butternut	zaad	seed		
Juglans regia L.	Juglandaceae		okkernoot	walnut	bovengronde delen	aerial parts		
Jumellea fragrans (Thouars) Schltr.	Orchidaceae				blad	leaf		
Juniperus communis L.	Cupressaceae		gewone jeneverbes	common juniper	vrucht, blad, hout	fruit, leaf, wood	Voor bereidingen van de vrucht : De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies (maximum 6 weken). Niet gebruiken bij nierfunctiestoornissen.	For fruit preparations : The labelling must include the following warnings: Do not use for a prolonged period without specialist advice (maximum 6 weeks). Do not use if you have renal impairment.
Justicia Adhatoda L.	Acanthaceae	Adhatoda vasica Nees	malabarnoot, adulsa, arusa	malabar nut, adulsa, arusa	hele plant	whole plant		
Justicia pectoralis Jacq.	Acanthaceae				bovengronde delen	aerial parts		

Kaempferia galanga L.	Zingiberaceae		kentjoer		wortelstok	rhizome		
Kavalama urens (Roxb.) Raf.	Malvaceae	Sterculia urens Roxb.			gom	gum		
Kickxia spuria (L.) Dumort.	Plantaginaceae		eironde leeuwenbek	roundleaf cancerwort	bovengronde delen	aerial parts		
Knautia arvensis (L.) Coult.	Caprifoliaceae		beemdkroon	field scabious	bovengronde delen	aerial parts		
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson	Krameriaceae	Krameria triandra Ruiz & Pav.	ratanhia	rhatany	wortel	root		
Labisia pumila (Blume) Fern.-Vill.	Primulaceae	Ardisia pumila Blume			hele plant	whole plant	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënten zijn toegelaten (uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470).	Only products complying with the authorisation as a novel food ingredient are authorised (Implementing Regulation (EU) 2017/2470).
Lactuca indica L.	Compositae		chinese sla		bovengronde delen	aerial parts		
Lactuca sativa L.	Compositae		sla	garden lettuce	bovengronde delen	aerial parts		
Lagerstroemia speciosa	Lythraceae		banaba	Banaba, pride of	blad	leaf		

(L.) Pers.				India, Queen's crape myrtle				
Laminaria digitata (Hudson) J.V. Lam.	Laminariac eae	Laminari a palmata Bory	gladgesteeld vingerwier	oarweed	thallus	thallus		
Laminaria hyperborea (Gun.) Foslie	Laminariac eae		ruwgesteeld vinger wier	tangle	thallus	thallus		
Laminaria japonica J.E. Areschoug	Laminariac eae		kelp	Japanese kelp	thallus	thallus		
Lamium album L.	Lamiaceae		witte dovenetel	white dead- nettle	bovengron dse delen	aerial parts		
Larix decidua Mill.	Pinaceae		europese lork, lork	European larch, larch	bovengron dse delen, hars	aerial parts, resin		
Larix occidentalis Nutt.	Pinaceae		west amerikaanse lork	western larch	hele plant	whole plant		
Laurus nobilis L.	Lauraceae		laurierboom	bay tree	vrucht, blad	fruit, leaf		
Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.	Lamiaceae		lavendel	Lavender	bovengron dse delen	aerial parts		
Lavandula angustifolia Mill.	Lamiaceae	Lavandul a angustifol ia subsp. angustifol ia, Lavandul a officinalis Chaix,	lavendel	Lavender	bloeiende top	flowering tops		

		Lavandula spica L.						
Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica (DC.) Guinea	Lamiaceae	Lavandula vera DC.	lavendel	Pyrenean lavender	bloeiende top	flowering tops		
Lavandula latifolia Medik	Lamiaceae	Lavandula hybrida E.Rev. ex Briq.	breedbladige lavendel, spijklavendel	Broad-leaved Lavender	bovengron dse delen	aerial parts		
Lavandula stoechas L.	Lamiaceae		franse lavendel	French/ Italian/ Spanish lavender, topped lavender	bovengron dse delen	aerial parts		
Lawsonia inermis L.	Lythraceae		henna	henna	blad	leaf	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden naftochinonen bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of naphthoquinones.
Ledum palustre L.	Ericaceae		moerasrozemarijn; moeraspalm	wild rosemary, marsh Labrador tea	bovengron dse delen	aerial parts		
Lens culinaris Medik.	Leguminosae		linze	lentil	zaad	seed		
Leonurus	Lamiaceae		hartgespan	Motherwort	bovengron	aerial	De	The

cardiaca L.					dse delen	parts	etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling .	labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant. Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for hypertension.
Leonurus japonicus Houtt.	Lamiaceae	Leonurus artemisia (Lour.) S.Y.Hu, Leonurus heterophyllus Sweet			bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant. Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment

							gebruik van hypertensie behandeling .	for hypertension.
Lepidium campestre (L.) R. Br.	Brassicaceae		veldkruidkers	field herb cherry	bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoïdie of schildklierbehandeling: raadpleeg uw arts.	The labelling must include the following warning: For people with hypothyroidism or taking thyroid treatment, consult your doctor.
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae				bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoïdie of schildklierbehandeling: raadpleeg uw arts.	The labelling must include the following warning: For people with hypothyroidism or taking thyroid treatment, consult your doctor.
Lepidium latifolium L.	Brassicaceae		peperkers	cherry pepper	bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing	The labelling must include the following

							ng bevatten : Bij hypothyreoï die of schildklierb ehandeling: raadpleeg uw arts.	warning: For people with hypothyroidi sm or taking thyroid treatment, consult your doctor.
Lepidium meyenii Walp.	Brassicacea e	Lepidium peruvian um G. Chacón de Popovici	maca	Maca	wortel	root	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n alkaloïden bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of alkaloids.
Lepidium sativum L.	Brassicacea e		tuinkers	garden cress	hele plant	whole plant		
Leptospermu m petersonii subsp. petersonii.	Myrtaceae	Leptospe rmum citratum (J.F.Baile y & C.T.White) Challinor, Cheel & A.R.Penfil old			bloeiende toppen	flowering tops		
Leptospermu m scoparium J.R.Forst. & G.Forst.	Myrtaceae		manuka	manuka	schors, blad	bark, leaf	De etikettering moet de volgende	The labelling must include the

							waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	following warning: Do not use if you are pregnant.
Lespedeza capitata Michx.	Leguminosae		lespedeza	lespedeza, roundhead bush-clover	bovengron dse delen	aerial parts		
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.	Compositae		gewone margriet	ox-eye daisy, marguerite, common marguerite	bovengron dse delen	aerial parts		
Levisticum officinale W.D.J. Koch	Apiaceae		lavas	lovage	hele plant	whole plant		
Ligusticum striatum DC.	Apiaceae	Ligusticum chuanxiong S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu. Ligusticum wallichii Franch.			wortel	root	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloïden (o.a. 2,3,5,6- tetramethyl pyrazine) bevat. De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of alkaloids (incl. 2,3,5,6- tetramethyl pyrazine). Isolated essential oil from this plant is not authorised

							toegelaten in voedingssupplementen De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding.	in food supplements . The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Lilium brownii F.E. Br. ex Mieliez	Liliaceae				bol	bulb	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden alkaloiden bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of alkaloids.
Lindera aggregata (Sims) Kosterm.	Lauraceae				wortel	root		
Linum usitatissimum L.	Linaceae		gekweekt vlas	cultivated flax	zaad	seed	Het voedings-supplement dat het zaad	The food supplement containing the seed in

							bevat in de vorm vermeld in sectie 2.3 van bijlage I van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006, dient te voldoen aan de bepalingen van ditzelfde reglement. Voor het voedingssupplement dat het zaad in	the form mentioned in section 2.3 of Annex I to Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in foodstuffs and repealing Regulation (EC) No 1881/2006 must comply with the provisions of that Regulation. For the food supplement containing the seed in another form, the recommended daily portion of the finished
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							een andere vorm bevat mag de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van vrije en/of gebonden waterstofcy anideequival enten hoger dan 1 mg. Indien het product bestemd is voor kinderen jonger dan 12 jaar, mag de inname niet hoger zijn dan 0.5 mg/dag Het notificatiedo ssier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	product must not lead to the ingestion of more than 1 mg of hydrogen cyanide equivalents, free and/or bound, regardless of the source. If the product is intended for children under 12 years of age, ingestion must not exceed 0.5 mg/day. The notification file must demonstrate this compliance by analysis.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Liquidambar styraciflua L.	Altingiaceae		amerikaanse amberboom	American sweetgum	schors	bark		
Litchi chinensis Sonn.	Sapindaceae		lychee	lychee	vrucht, zaad	fruit, seed		
Lithothamnion calcareum (Pallas) Areschoug	Hapalidiaceae	Phymatolithon calcareum (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin ex Woelkerling & L.M.Irvine.	lithothamnion calcareum	common maërl	thallus	thallus		
Litsea cubeba (Lour.) Pers.	Lauraceae				vrucht	fruit		
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Lobariaceae		longenmos	lungmoss	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van usninezuure quivalenten hoger dan 30 mg. De	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 30 mg of usnic acid equivalents, regardless of the source. The

							usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	concentratio n of usnic acid in the finished product must not exceed 3 %.
Lonicera japonica Thunb.	Caprifoliace ae		japanse kamperfoelie	Japanese honeysuckle	bloem, steel	flower, stem		
Lotus cornicolatus L.	Leguminosa e		gewone rolklaver	common bird's foot trefoil	hele plant	whole plant		
Lotus corniculatus subsp. corniculatus L.	Leguminosa e		gewone rolklaver	common bird's foot trefoil	bovengron dse delen	aerial parts		
Luma chequen (Molina) A.Gray	Myrtaceae	Eugenia chequen Mol.			blad	leaf		
Lycium barbarum L.	Solanaceae	Lycium halimifoli um Mill.	boksdoo rn	Chinese wolfberry	vrucht	fruit		
Lycium chinense Mill.	Solanaceae		chinese boksdoo rn	Chinese buckthorn	vrucht	fruit		
Lycopersicon esculentum, Mill.	Solanaceae	Solanum lycopersi cum L., Lycopersi con lycopersi cum (L.) H. Karst.	tomaat	tomato	vrucht	fruit		
Lycopodium	Lycopodiaceae		grote	common club	bovengron	Aerial		

clavatum L.	eae		wolfsklauw	moss	dse delen, spoor	parts, spore		
Lycopus europaeus L.	Lamiaceae	L. mollis A.Kern., Lycopus menthifol ius Mabille	wolfspoot	Bugleweed, gipsywort, water horehound	bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Bij hypothyreoï die of schildklierb ehandeling: raadpleeg uw arts. Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap of borstvoedin g.	The labelling must include the following warnings: For people with hypothyroidi sm or taking thyroid treatment, consult your doctor. Do not use if you are pregnant or breastfeedin g.
Lycopus virginicus Michx.	Lamiaceae				bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Bij hypothyreoï die of schildklierb ehandeling: raadpleeg uw arts.	The labelling must include the following warnings: For people with hypothyroidi sm or taking thyroid treatment, consult your doctor. Do

							Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	not use if you are pregnant or breastfeeding.
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Primulaceae		grote wederik	yellow loosestrife	bovengronde delen	aerial parts		
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae		grote kattenstaart	purple loosestrife	toppen	tops	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
<i>Macadamia ternifolia</i> F. Muell	Proteaceae		macadamia noten	Macadamia tree	vrucht, zaad	fruit, seed		
<i>Macrocystis pyrifera</i> (L.) C.Ag.	Laminariaceae		kelp	Giant kelp	thallus	thallus		
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliaceae	<i>Michelia champaca</i> L.			bloem	flower		
<i>Magnolia</i>	Magnoliaceae		magnolia	magnolia	schors,	bark,	De	The

officinalis Rehder & Wilson	ae				bloem	flower	etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant. Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagula nts.
Malpighia glabra L.	Malpighiac eae	Malpighi a punicifoli a L.	west-indische kers, barbadoskers	West Indian cherry, Barbados cherry	vrucht	fruit		
Malus domestica Borkh.	Rosaceae	Malus sylvestris (L.) Mill. var. domestic a (Borkh.) Mansf	eetappel	common apple tree	hele plant	whole plant		
Malus pumila Mill.	Rosaceae		paradijsappel boom	paradise apple tree	knop, bloem, vrucht blad	bud, flower, fruit, leaf		
Malus sylvestris	Rosaceae		wilde appel	wild apple tree	knop, bloem,	bud, flower,		

(L.) Mill. subsp. sylvestris					vrucht, blad	fruit, leaf		
Malva sylvestris L.	Malvaceae		groot kaasjeskruid, wilde malve	large mallow, wild mallow	bovengron dse delen	aerial parts		
Mammea americana L.	Calophyllac eae		amerikaanse mammi-appel	mammee apple	pulp van de vrucht	fruit pulp		
Mangifera indica L.	Anacardiac eae		mango	Mango tree	hele plant	whole plant		
Manihot esculenta Crantz	Eupharbiac eae		cassave, maniok	cassava, manioc	gekookte wortel	cooked root		
Manilkara zapota (L.) P.Royen	Sapotaceae	Achras sapota L.	sapodilla	sapodilla	vrucht, bloem	fruit, flower		
Maranta arundinacea L.	Marantacea e		pijlwortel	arrowroot	bol, wortelstok	bulb, rhizome		
Marchantia polymorpha L.	Marchantia ceae		paraplutjes mos	umbrella liverwort	thallus	thallus	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n lectine bevat. Er kan van deze voorwaarde worden afgeweken indien wetenschap	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of lectins. This condition may be waived if scientific evidence is submitted showing that the heat

							pelijk kan worden aangetoond dat de toegepaste hittebehandeling de beoogde stoffen effectief vernietigt.	treatment applied effectively destroys the substances targeted.
Marrubium vulgare L.	Lamiaceae		malrove	malrove common horehound	bovengrondse delen	aerial parts		
Marsdenia cundurango Rchb.f.	Apocynaceae	Marsdenia reichenbachii Triana	condurango	Condurango	schors	bark		
Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst.	Apocynaceae	Gymnema sylvestre (Retz) R.Br.			blad	leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Mastocarpus	Phyllophora		kernwier		thallus	thallus		

stellatus (Stackhouse) Guiry	ceae							
Matricaria chamomilla L.	Compositae	Matricaria recutita L., Chamomilla recutita (L.) Rauscher t	echte kamille	wild chamomile	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van α - bisabolol hoger dan 1,9 mg en van apigenine-7- glucoside hoger dan 5,6 mg.	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to ingestion of more than 1.9 mg of α - bisabolol and more than 5.6 mg of apigenin- 7-glucoside, regardless of the source.
Medicago sativa L.	Leguminosa e		luzerne, alfalfa	lucerne, alfalfa	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed as glycoside

							als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg.	of the main component), regardless of the source.
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel	Myrtaceae		theeboom, medicinale mirthehei	tea tree, narrow-leaved paperbark	bovengron dse delen	aerial parts	De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	Isolated essential oil from this plant is not authorised in food supplements .
Melaleuca cajuputi Powell	Myrtaceae		kajapoetboom, cajeputboom	cajuput, white samet	blad, twijg	leaf, twigs	De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	Isolated essential oil from this plant is not authorised in food supplements .
Melaleuca leucarendra (L.) L.	Myrtaceae	Melaleuca leucadendron (L.) L.			blad	leaf	De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	Isolated essential oil from this plant is not authorised in food supplements .
Melaleuca linariifolia	Myrtaceae			cajeput tree	blad	leaf	De geïsoleerde	Isolated essential oil

Sm.							vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	from this plant is not authorised in food supplements .
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae		niaouli	paper bark tree, punk tree, paperbark teatree	blad, twijg	leaf, twigs	De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	Isolated essential oil from this plant is not authorised in food supplements .
Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn.	Myrtaceae		nerolina	nerolina	blad twijg	leaf, twigs	De geïsoleerde vluchtige olie van deze plant is niet toegelaten in voedingssupplementen.	Isolated essential oil from this plant is not authorised in food supplements .
Melilotus altissimus Thuill.	Leguminosae		goudgele honingklaver, gele honingklaver	Tall melilot, golden yellow honey clover, yellow honey clover	bovengronde delen	aerial parts		
Melilotus officinalis (L.) Lam.	Fabaceae		citroengele honingklaver, akkerhoningk	common melilot, yellow	bloeiende top	flowering tops	De etikettering moet de	The labelling must include

			laver	sweetclover			volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	the following warning: Do not use if you are pregnant.
Melissa officinalis L.	Lamiaceae		citroenmelisse	lemon balm	bovengron dse delen	aerial parts		
Melittis melissophyllum L.	Lamiaceae		bijenblad	bastard balm	bovengron dse delen	aerial parts		
Mentha aquatica L.	Lamiaceae		watermunt, aalkruid, bakkruid, boerenbalse m, vlooienkruid	watermint	hele plant	whole plant		
Mentha arvensis L.	Lamiaceae		akkerment	field mint	bovengron dse delen	aerial parts		
Mentha spicata L.	Lamiaceae		aarmunt, groene munt	spearmint	bovengron dse delen	aerial parts		
Mentha x piperita L.	Lamiaceae		pepermunt	peppermint	bovengron dse delen	aerial parts		
Mentzelia cordifolia Dombey ex Urb. & Gilg	Losaceae	Mentzelia scabra Kunth			hele plant	whole plant		
Menyanthes trifoliata L.	Menyantha ceae		waterdriebla d	bogbean	blad	leaf		
Mesembryan themum crystallinum L.	Aizoaceae	Gasoul crystallin um (L.) Rothm.; Cryophyt	ijsplantje, ijskruid	ice plant, crystalline ice plant	blad	leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het	The recommen ded daily portion of the finished

		um crystallinum (L.) N.E.Br.					eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van mesembrine alkaloiden hoger dan 90 µg.	product must not lead to the ingestion of more than 90 µg of mesembrine alkaloids, regardless of the source.
Mespilus germanica L.	Rosaceae		mispel	medlar	vrucht	fruit		
Mikania amara (Vahl.) Willd.	Compositae				schors, blad	bark, fruit		
Mitchella repens L.	Rubiaceae				bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Momordica balsamina L.	Cucurbitaceae				vrucht, blad	fruit, leaf	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of

							n lectine bevat. Er kan van deze voorwaarde worden afgeweken indien wetenschap pelijk kan worden aangetoond dat de toegepaste hittebehand eling de beoogde stoffen effectief vernietigt.	lectins. This condition may be waived if scientific evidence is submitted showing that the heat treatment applied effectively destroys the substances targeted.
Momordica charantia L.	Cucurbitaceae		alsempeer, balsempeer, sopropo, bittere augurk, bittere komkommer	bitter melon, bitter gourd, bitter squash, balsam pear	vrucht, blad	fruit, leaf	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden lectine bevat. Er kan van deze voorwaarde worden afgeweken indien	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of lectins. This condition may be waived if scientific evidence is submitted showing

							wetenschap pelijk kan worden aangetoond dat de toegepaste hittebehand eling de beoogde stoffen effectief vernietigt.	that the heat treatment applied effectively destroys the substances targeted.
Monarda didyma L.	Lamiaceae		bergamot, scharlaken monarda	crimson beebalm, bergamot	bovengron dse delen	aerial parts		
Monarda punctata L.	Lamiaceae				bovengron dse delen	aerial parts		
Morinda citrifolia L.	Rubiaceae		noni, indische moerbei	noni, Indian mulberry	puree en concentraa t van vrucht, sap	fruit puree and concentr ate, juice	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsing rediënt zijn toegelaten (uitvoerings verordening (EU) 2017/2470).	Only products complying with the authorisatio n as a novel food ingredient are authorised (Implementi ng Regulation (EU) 2017/2470).
Morinda officinalis F.C. How	Rubiaceae				hele plant	whole plant		
Moringa oleifera Lam.	Moringaceae		moringa	moringa	blad, vrucht,	leaf, fruit, seed	De aanbevolen	The recommend

					zaad		dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 500 mg gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 18 jaar.	ed daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 500 mg of dried plant. The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant. Do not administer to children under 18 years of age.
Morus alba L.	Moraceae		witte moerbei	white mulberry	vrucht, blad	fruit, leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist

							apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Morus nigra L.	Moraceae		zwarte moerbei	black mulberry	knop, steel, schors, vrucht, blad	bud, stem, bark, fruit, leaf		
Murraya koenigii (L.) Spreng.	Rutaceae		kerrieboom	curry tree	schors, blad, wortel van de volwassen struik	bark, leaf, root of adult bush		
Musa x paradisiaca L. (pro sp.)	Musaceae	Musa x sapientu m L.	banaan	banana tree	vrucht, blad, wortel	fruit, leaf, root		
Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh	Myrtaceae	Psidium dubium H.B.K.	camu camu, rumbes	camu camu	vrucht	fruit		
Myrica cerifera L.	Myricaceae				wortel	root	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij	The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of

							gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	concomitant use of anticoagulants. Do not use if you are pregnant.
Myrica gale L.	Myricaceae		wilde gagel, was gagel	bog-myrtle, sweet willow	bovengronde delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Myristica fragrans Houtt.	Myristicaceae		nootmuskaat boom	nutmeg tree	foelie, zaad	mace, seed		
Myroxylon balsamum var. balsamum (L.) Harms	Leguminosae		tolubalsemboom	Tolu balsam tree	schors van de stam	trunk bark		
Myrtus communis L.	Myrtaceae		mirt	myrtle	bovengronde delen	aerial parts		
Nardostachys jatamansi (D. Don) DC.	Caprifoliaceae	Nardostachys grandiflora DC.	jatamansi, indisch aarborstelgras, narduskruid	spikenard, nard, nardin	hele plant	whole plant		
Nasturtium officinale R.	Brassicaceae		witte waterkers	watercress	bovengronde delen	aerial parts	De aanbevolen	The recommend

Brown							dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van de som van pulegone + menthofuran hoger dan 37,5 mg.	ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 37.5 mg of pulegone + menthofuran together, regardless of the source.
Nelumbo nucifera Gaertn.	Nelumbonaceae		lotus, indische lotusbloem, heilige lotus	lotus, Indian lotus flower, sacred lotus	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Nepeta cataria L.	Lamiaceae		wild kattekruid	wild catnip	bovengronde delen	aerial parts		
Nepeta tenuifolia Benth.	Lamiaceae	Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.	japans kattenkruid	Japanese catnip	blad	leaf		

Nephelium lappaceum L.	Sapindaceae		ramboetan	rambutan	vrucht	fruit		
Nigella sativa L.	Ranunculaceae		zwarte komijn	nigella, black cumin	koud geperste olie van het zaad	cold-pressed seed oil	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet geraffineerde olie van deze plant bekomen door koude persing is instabiel en hoge dosissen zijn niet geschikt voor de consumptie door kwetsbare groepen, met name: kinderen onder 12 jaar, adolescenten onder 18 jaar, zwangere en lacterende vrouwen.	The labelling must include the following warning: The unrefined oil from this plant obtained by cold pressure is unstable and at high doses is not suitable for consumption by vulnerable groups, in particular: children under 12, adolescents under 18, pregnant or breastfeeding women.

Ocimum basilicum L.	Lamiaceae		basilicum, baziëkruid	basil, common basil	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsge wicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor andere consumenten dient de hoeveelheid estragol zo laag mogelijk te blijven. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet langer dan 14 dagen gebruiken	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 0.05 mg of estragole/kg bodyweight by children under 12 years of age, regardless of the source. For other consumers, the amount of estragole must remain as low as possible. The labelling must include the following warning: Not to be used for more than 14 days without
------------------------	-----------	--	--------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------	---	--

							zonder deskundig advies.	specialist advice.
Ocimum gratissimum L.	Lamiaceae				bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor andere consumenten dient de hoeveelheid estragol zo laag mogelijk te blijven. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet langer	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 0.05 mg of estragole/kg bodyweight by children under 12 years of age, regardless of the source. For other consumers, the amount of estragole must remain as low as possible. The labelling must include the following warning: Not to be used for

							dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	more than 14 days without specialist advice.
Ocimum tenuiflorum L.	Lamiaceae	Ocimum sanctum L.	heilige basilicum	holy basil	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor andere consumenten dient de hoeveelheid estragol zo laag mogelijk te blijven. De etikettering moet de volgende waarschuwi	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 0.05 mg of estragole/kg bodyweight by children under 12 years of age, regardless of the source. For other consumers, the amount of estragole must remain as low as possible. The labelling must include the following

							ng bevatten : Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	warning: Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Oenanthe aquatica (L.) Poiret	Apiaceae		watertorkruid, watervinkel	fine-leaved water- dropwort	rijpe vrucht	ripe fruit		
Oenothera biennis L.	Onagraceae		middelste teunisbloem	Common evening primrose	zaad	seed		
Olea europaea L.	Oleaceae		olijfboom	olive tree	knop, vrucht, blad	bud, fruit, leaf		
Olea europaea L. subsp. europaea	Oleaceae		olijfboom	olive tree	schors, vrucht, blad	bark, fruit, leaf		
Ononis spinosa L.	Leguminosae	Ononis vulgaris 'Rouy, p.p.C'	kattedoorn	spiny restharrow	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed as glycoside of the main

							van de hoofdcompo nent) hoger dan 40 mg.	component), regardless of the source.
Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams	Leguminosa e	Ononis arvensis L.	wild zoethout, stalkruid	field restharrow	wortel	root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcompo nent) hoger dan 40 mg.	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed as glycoside of the main component), regardless of the source.
Onopordon acanthium L.	Compositae		wegdistel	cotton thistle	bovengron dse delen	aerial parts		
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.	Asparagace ae		japanse slangenbaard	Japanese snake's bear	knol	tuber	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant

							gebruik van anticoagula ntia.	use of anticoagula nts.
Opopanax chironius (L.) W.D.J.Koch	Apiaceae		opopanax	Hercules-all- heal, sweet myrrh, bisabol myrrh	hele plant, gomhars	whole plant, gum resin		
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Cactaceae		vijgcactus	prickly pear, barbary fig	cladode, bloem, vrucht	cladode, flower, fruit		
Orchis mascula L.	Orchidacea e		mannetjesorc his	early-purple orchid	wortelknol	tuber		
Origanum compactum Bentham	Lamiaceae		origano	oregano	bovengron dse delen	aerial parts		
Origanum dictamnus L.	Lamiaceae		hopmarjolein, kandische majoraan	hop marjoram, dittany of Crete	bovengron dse delen	aerial parts		
Origanum majorana L.	Lamiaceae	Majorana hortensis Moench.	marjolein, majoraan	sweet marjoram, knotted marjoram	bovengron dse delen	aerial parts		
Origanum vulgare L.	Lamiaceae		wilde marjolein, orego	wild marjoram, oregano	bovengron dse delen	aerial parts		
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.	Lamiaceae		javaanse nierthee	Javanese kidney tea	blad	leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid	The recommen ded daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 5.5 g of

							equivalent met 5,5 g gedroogde bladeren.	dried leaves.
Orthosiphon aristatus var. aristatus	Lamiaceae		kattensnor	cat's whiskers	bovengron dse delen	aerial parts		
Oryza sativa L.	Poaceae		rijst	rice	zaad, wortel	seed, root		
Oxalis acetosella L.	Oxalidaceae		witte klaverzuring	white sorrel	bovengron dse delen	aerial parts		
Pachira aquatica Aubl.	Malvaceae		watercacao	malabar chestnut	blad, zaad	leaf, seed		
Pachira insignis (SW.) Savigny	Malvaceae				zaad	seed		
Padus avium var. avium	Rosaceae	Prunus padus L.	gewone vogelkers	bird cherry, European bird cherry	schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van waterstofcy anide equivalente n (vrij en gebonden) hoger dan 1 mg. Indien	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 1 mg of hydrogen cyanide equivalents (free and bound), regardless of the source. If

							het product bestemd is voor kinderen jonger dan 12 jaar, mag de inname niet hoger zijn dan 0.5 mg/dag	the product is intended for children under 12 years of age, ingestion must not exceed 0.5 mg/day
<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	Paeoniaceae	<i>Paeonia albiflora</i> Pall., <i>Paeonia chinensis</i> L. Vilmorin	chinese pioen	Chinese peony	bloem, wortel, zaad	flower, root, seed	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Paeoniaceae		boerenpioen	farmer peony	bloem, wortel	flower, root		
<i>Paeonia x suffruticosa</i> Andrews	Paeoniaceae		boompioen	tree peony	wortel	root		
<i>Palmaria palmata</i> (Linnaeus) Weber & Mohr	Palmariaceae	<i>Fucus palmatus</i> L., <i>Rhodymenia palmata</i> (L.) Greville	rood lapwier	purple dulse	thallus	thallus		
<i>Panax ginseng</i> C.A.	Araliaceae		ginseng	ginseng	wortel, blad, bes	root, leaf, berry	De etikettering	The labelling

Mey.							moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Panax notoginseng (Burkill) F.H. Chen.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	leaf, root, seed	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Panax pseudoginseng Wall.	Araliaceae				blad, wortel, zaad	leaf, root, seed	De etikettering moet de volgende waarschuwi	The labelling must include the following

							ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Panax quinquefoliu s L.	Araliaceae		amerikaanse ginseng	American ginseng	wortel, blad, zaad	root, leaf, seed	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetis che behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Panicum miliaceum L.	Poaceae		pluimgierst	broomcorn millet, common millet	bloem, vrucht	flower, fruit		
Panzerina lanata (L.) Soják	Leguminosa e	Panzeria lanata (L.) Bunge.			bovengron dse delen	aerial parts		

Papaver rhoeas L.	Papaveraceae		grote klaproos	comon poppy, field poppy	bloem	flower		
Parietaria officinalis L.	Urticaceae		groot glaskruid	pellitory-of- the-wall	bovengron dse delen	aerial parts		
Parmelia saxatilis (L.) Ach.	Parmeliaceae				thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van usninezuure quivalenten hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 30 mg of usnic acid equivalents, regardless of the source. The concentratio n of usnic acid in the finished product must not exceed 3 %.
Parthenium hysterophor us L.	Compositae				bovengron dse delen	aerial parts		
Parthenociss us tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.	Vitaceae	Ampelops is tricuspid ata Siebold & ucc.	oosterse wingerd, oosterse wilde wingerd	Boston ivy, Japanese ivy, Japanese creeper	bovengron dse delen	aerial parts	Voor bereidingen van de jonge scheut: De aanbevolen dagelijkse	For preparations of young shoots: The recommend ed daily

							hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 5% gedroogde plant.	portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 5 % of dried plant.
Passiflora edulis Sims	Passifloraceae	Passiflora incarnata L.	passiebloem, passiekruid	maypop, purple passionflower	bovengronde delen	aerial parts		
Pastinaca sativa L.	Apiaceae		pastinaak	parsnip	wortel	root		
Paullinia cupana Kunth	Sapindaceae		guarana	guarana	zaad	seed		
Pedaliium murex L.	Pedaliaceae				bovengronde delen	aerial parts		
Pelargonium graveolens L'Hérit	Geraniaceae		rozenpelargonium, rozengeranium	rose geranium	bovengronde delen	aerial parts		
Pelargonium radens H.E. Moore	Geraniaceae	Pelargonium radula (Cav.) L'Hér.			bovengronde delen	aerial parts		
Perilla frutescens (L.) Britton	Lamiaceae		zwarte netel, perilla, japans sesam-zaad	perilla, Korean perilla	zaad	seed		
Persea americana	Lauraceae		avocadoboom	avocado tree	blad, olie van het	leaf, fruit pulp oil		

Mill.					vruchtvlees			
Persicaria bistorta (L.) Samp.	Polygonaceae	Polygonum bistorta L.	adderwortel, adderkruid	bistort, snakeweed	wortelstok	rhizome		
Persicaria maculosa Gray	Polygonaceae	Polygonum persicaria L.	perzikkruid	lady's-thumb	bovengronde delen	aerial parts		
Petiveria alliacea L.	Phytolaccaceae		parelhoenkruide	guinea henweed	blad, wortel	leaf, root	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Apiaceae		tuinpeterselie	garden parsley	hele plant	whole plant		
Peucedanum ostruthium (L.) W. Koch	Apiaceae		meesterwortel, varkenskerf	masterwort, hog's fennel	hele plant	whole plant		
Peumus boldus Molina	Monimiaceae		boldo	boldo	blad	leaf		
Phaseolus vulgaris L.	Leguminosae		gewone boon	common bean	gekookt of geweekt zaad	boiled or soaked seeds		

Phellodendron amurense Rupr.	Rutaceae		kurkboom	cork tree	schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as berberine), regardless of the source. The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Phillyrea latifolia L.	Oleaceae				blad	leaf		
Phlebodium aureum (L.) J. Sm.	Polypodiaceae	Polypodium leucatomos Poir.	blauwvaren		blad, wortelstok	leaf, rhizome		
Phoenix	Arecaceae		dadelpalm	date palm	vruchtvlee	fruit pulp		

dactylifera L.					s			
Photinia melanocarpa (Michx.) K.R. Robertson & J.B. Phipps	Rosaceae	Aronia melanocarpa (Michaux.) S. Elliott	zwarte appelbes	black chokeberry	vrucht	fruit		
Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) Moldenke	Verbenaceae	Lippia dulcis Trev.	azteeks zoetkruid	Aztec sweet herb, rough fogfruit	bovengronde delen	aerial parts		
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.	Phyllanthaceae				bloeiende top	Flowering tops	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Phyllanthus emblica L.	Phyllanthaceae	Emblica officinalis Gaertn.	amalaki, amla	amalaki, amla, malacca tree	bovengronde delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Phyllanthus	Phyllanthaceae				hele plant	whole	De	The

niruri L.	eae					plant	etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Phymatolithon calcareum (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin	Hapalidiaceae			common maërl	thallus	thallus		
Physalis alkekengi L.	Solanaceae		lampionplant, jodenkers	physalis, Chinese lantern	rijpe vrucht	ripe fruit		
Physalis peruviana L.	Solanaceae		goudbes, ananaskers, incabes, kaapse kruisbes	golden berry, Cape gooseberry	rijpe vrucht	ripe fruit		
Picea abies (L.) Karst.	Pinaceae		fijnspar, grote spar	common spruce	naald, top van de tak	needle, branch tip		
Picramnia antidesma Sw.	Picramniaceae				schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of

							leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als cascaroside A) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	more than 14 mg of total anthranoids* (expressed as cascaroside A), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Pimenta dioica (L.)	Myrtaceae	Pimenta officinalis	piment, jamaicapeper	pimenta, Jamaica	bes	berry		

Merr.		Lindl.		pepper				
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore	Myrtaceae		west-indische bay-boom, bay-rumboom, bay st.thomas	West Indian bay tree, bay rum tree, bay St Thomas	blad	leaf		
Pimpinella anisum L.	Apiaceae		anijs	anise	zaad	seed	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van estragol hoger dan 0,05 mg/kg lichaamsgewicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor de andere consumenten dient de hoeveelheid estragol zo laag mogelijk te blijven. De etikettering moet de volgende	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 0.05 mg of estragole/kg bodyweight by children under 12 years of age, regardless of the source. For other consumers, the amount of estragole must remain as low as possible. The labelling must include the following

							waarschuwing bevatten: Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	warning: Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Pimpinella major (L.) Huds.	Apiaceae		grote bevernel	greater burnet-saxifrage	wortel	root		
Pimpinella saxifraga L.	Apiaceae		kleine bevernel	Lesser burnet-saxifrage	hele plant	whole plant		
Pinus koraiensis Siebold & Zucc.	Pinaceae		koreaanse den	Korean pine	naald, oliebars, zaad	needle, oil resin, seed		
Pinus massoniana Lamb.	Pinaceae				naald, oliebars, zaad	needle, oil resin, seed		
Pinus mugo Turra	Pinaceae	Pinus montana Mill.	bergden	mountain pine	knop, naald, scheut	bud, needle, shoot		
Pinus pinaster Ait.	Pinaceae	Pinus maritima Lam.	zeeden	maritime pine	schors, zaad, blad, knop (kegel)	bark, seed, leaf, bud (cone)		
Pinus pinea L.	Pinaceae		parasolden	umbrella pine, parasol pine, pignolia-nut pine	naald, oliebars, zaad	needle, oil resin, seed		
Pinus sylvestris L.	Pinaceae		grove den	wild pine	schors, knop, vrucht,	bark, bud, fruit, leaf,		

					blad, scheut	shoot		
Piper aduncum L.	Piperaceae	Piper angustifol ium Ruiz & Pav.	maticopeper	spiked pepper	bovengron dse delen	aerial parts		
Piper longum L.	Piperaceae		lange peper	long pepper	vrucht	fruit		
Piper nigrum L.	Piperaceae		zwarte peper, witte peper	black pepper, white pepper	vrucht, oliehars, olie	fruit, oil resin, oil		
Pistacia lentiscus L.	Anacardiaceae	Lentiscus vulgaris Fourr. , Terebinth us lentiscus (L.) Moench	mastiekboom	mastic tree	blad, hars, twijg	leaf, resin, twig		
Pistacia terebinthus L.	Anacardiaceae		terpentijnboom	turpentine tree	vrucht	fruit		
Pistacia vera L.	Anacardiaceae		pistache, pimpernoot	pistachio, European bladdernut	vrucht	fruit		
Pisum sativum L.	Leguminosae		erwt	pea	peul, zaad	pod, seed		
Plantago afra L.	Plantaginaceae	Plantago psyllium L.	vlozaad, weegbree	psyllium	zaadhuid, zaad	seed coat, seed	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen	The labelling must include the following warning: Do not take alongside medicinal products.

							met geneesmiddelen.	
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. and Kit.	Plantaginaceae		zandweegbrede	sand plantain	zaad	seed		
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae		smalle weegbree	small plantain	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae		grote weegbree	broad-leaf plantain	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Plantago media</i> L.	Plantaginaceae		ruige weegbree	hoary plantain	hele plant	whole plant		
<i>Plantago orbignyana</i> Steinh. ex Decne.	Plantaginaceae	<i>Plantago ovata</i> Phil.	vlozaad	psyllium	zaad	seed		
<i>Plantago ovata</i> Forssk.	Plantaginaceae	<i>Plantago ispaghula</i> Roxb. ex Fleming	vlozaad	psyllium	zaad	seed	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen.	The labelling must include the following warning: Do not take alongside medicinal products.
<i>Platanus orientalis</i> L.	Platanaceae		oosterse plataan	oriental plane, chenar	knop	bud		
<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacquin) A. DC.	Campanulaceae		ballonklokje, chinese klokjesbloem, ballonbloem	balloon bellflower, Chinese bellflower,	wortel	root	De etikettering moet de volgende	The labelling must include the

				balloon flower			waarschuwing bevatten : Langdurig gebruik kan de maag irriteren.	following warning: Prolonged use may irritate the stomach.
Plectranthus barbatus Andrews	Lamiaceae	Coleus barbatus (Andrews) Benth			blad, wortel, knol	leaf, root, tuber	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken met hartmedicatie. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warnings: Do not use with heart medication. Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Plukenetia volubilis L.	Euphorbiaceae				olie van het zaad	seed oil	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (uitvoerings	Only products complying with the authorisation as a novel food ingredient are authorised

							verordening (EU) 2017/2470).	(Implementing Regulation (EU) 2017/2470).
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.	Lamiaceae		patchoeli	patchouli	blad	leaf		
Polygala senega L.	Polygalaceae		senegawortel , senecawortel , ratelslangwortel	seneca/ senega snakeroot, seneca/senega root, sengaroot	wortel, wortelstok	root, rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	The labelling must include the following warning: Do not use for a prolonged period without specialist advice.
Polygala sibirica L.	Polygalaceae				wortel	root	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	The labelling must include the following warning: Do not use for a prolonged period without specialist advice.
Polygala tenuifolia	Polygalaceae		siberische vleugeltjesblo	Chinese senega root,	wortel	root		

Willd.			em	thin-leaf milkwort				
Polygala vulgaris L.	Polygalaceae	Polygala comosa Schkuhr	gewone vleugeltjesblo em	tufted milkwort	bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.	The labelling must include the following warning: Do not use for a prolonged period without specialist advice.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	Lilliaceae	Polygonat um officinale All.	welriekende salomonszeg el	Solomon's seal, angular/arom atic Solomon's seal	wortelstok	rhizome		
Polygonum aviculare L.	Asparagace ae		varkensgras	doorweed, (English) knotgrass, knotweed	bovengron dse delen	aerial parts		
Populus alba L.	Salicaceae		witte abeel, zilverpopulier	white poplar, silver poplar	schors, knop, blad	bark, bud, leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant

							gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	use of anticoagulants. Not to be used in children and adolescents under 18 years of age.
Populus balsamifera L.	Salicaceae		balsempopulier	balsam poplar	schors, knop, blad	bark, bud, leaf	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants. Not to be used in children and adolescents under 18 years of age.
Populus nigra L.	Salicaceae		zwarte populier	black poplar	schors, knop	bark, bud	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :	The labelling must include the following warnings: Consult your

							Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants. Not to be used in children and adolescents under 18 years of age.
Populus tremula L.	Salicaceae		ratelpopulier	aspen, European aspen, quaking aspen	schors, knop	bark, bud	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants. Not to be used in children and adolescents under 18 years of age.
Populus tremuloides	Salicaceae		amerikaanse ratelpopulier	aspen poplar, American	schors, knop	bark, bud	De etikettering	The labelling

Michx.				aspen, trembling aspen			moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescente n onder 18 jaar.	must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagula nts. Not to be used in children and adolescents under 18 years of age.
Porphyra umbilicalis Kützinger	Bangiaceae		navelwier, purperwier	nori, porphyry	thallus	thallus		
Portulaca oleracea L.	Portulacaceae		postelein	purslane	bovengron dse delen	aerial parts		
Potentilla anserina L.	Rosaceae		zilverschoon	silverweed cinquefoil	hele plant	whole plant		
Potentilla argentea L.	Rosaceae		viltganzerik	hoary cinquefoil	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij	The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of

							gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling . Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding	concomitant use of treatment for diabetes. Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.	Rosaceae		tormentil, bloedwortel, zevenblad, zevenvingerkruid	erect cinquefoil, tormentil, bloodroot	hele plant	whole plant		
Potentilla reptans L.	Rosaceae		vijfvingerkruid	creeping cinquefoil	wortelstok	rhizome		
Prangos pabularia Lindl.	Apiaceae		prangos	prangos	vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant. Do not administer to children under 12 years of age.
Primula	Primulacea		slanke	true oxlip	bloem,	flower,		

elator Hill	e		sleutelbloem		wortel	root		
Primula veris L.	Primulaceae	Primula officinalis (L.) Hill.	gulden sleutelbloem	cowslip	bloem, wortel	flower, root		
Prunella vulgaris L.	Lamiaceae		gewone brunel	brownwort	bovengronde delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken samen met contraceptiva.	The labelling must include the following warning: Do not use concurrently with contraceptives.
Prunus africana (Hook. f.) kalkman	Rosaceae	Pygeum africanum Hook. f.	rood stinkhout, afrikaanse kers, pygeum	pygeum, African cherry, African almond	schors	bark		
Prunus armeniaca L.	Rosaceae		abrikoos	apricot tree	vrucht, blad, zaad	fruit, leaf, seed	Het voedings-supplement dat het zaad bevat in de vorm vermeld in sectie 2.3 van bijlage I van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april	The food supplement containing the seed in the form mentioned in section 2.3 of Annex I to Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for

							2023 betreffende maximumge halten aan bepaalde verontreinig ingen in levensmidde len en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006, dient te voldoen aan de bepalingen van ditzelfde reglement. Voor het voedingssup plement dat het zaad in een andere vorm bevat mag de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname	certain contaminant s in foodstuffs and repealing Regulation (EC) No 1881/2006 must comply with the provisions of that Regulation. For the food supplement containing the seed in another form, the recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 1 mg of hydrogen cyanide equivalents, free and/or bound, regardless
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							van vrije en/of gebonden waterstofcy anideequivalenten hoger dan 1 mg. Indien het product bestemd is voor kinderen jonger dan 12 jaar, mag de inname niet hoger zijn dan 0.5 mg/dag Het notificatiedossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	of the source. If the product is intended for children under 12 years of age, ingestion must not exceed 0.5 mg/day. The notification file must demonstrate this compliance by analysis.
Prunus avium (L.) L.	Rosaceae		zoete kers	sweet cherry tree	vrucht, steel	fruit, peduncle		
Prunus cerasus L.	Rosaceae	Cerasus vulgaris Mill.	zure kers	sour cherry tree	Fruit (namelijk zaad en pulp), bloemsteel, blad, schors, gom	Fruit (including seed and pulp), peduncle, leaf, bark, gum		
Prunus	Rosaceae		pruimboom	plum tree	schors,	bark,		

domestica L.					knop, bloem, vrucht, blad	bud, flower, fruit, leaf		
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb	Rosaceae	Amygdalus communis L., Prunus amygdalus Batsch.	amandelboom	amond tree	knop, bladknop, zaad, bloem, vrucht, olie	bud, leaf bud, seed, flower, fruit, oil	Het voedings- supplement dat het zaad bevat in de vorm vermeld in sectie 2.3 van bijlage I van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumge- halten aan bepaalde verontreinig- ingen in levensmidde- len en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006, dient te voldoen aan de	The food supplement containing the seed in the form mentioned in section 2.3 of Annex I to Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in foodstuffs and repealing Regulation (EC) No 1881/2006 must comply with the provisions of that Regulation. For the food supplement

							bepalingen van ditzelfde reglement. Voor het voedingssupplement dat het zaad in een andere vorm bevat mag de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van vrije en/of gebonden waterstofcyanideequivalenten hoger dan 1 mg. Indien het product bestemd is voor kinderen jonger dan 12 jaar, mag de inname niet hoger zijn dan 0.5	containing the seed in another form, the recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 1 mg of hydrogen cyanide equivalents, free and/or bound, regardless of the source. If the product is intended for children under 12 years of age, ingestion must not exceed 0.5 mg/day. The notification file must demonstrate this compliance
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							mg/dag Het notificatiedossier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	by analysis.
Prunus persica (L.) Stokes	Rosaceae		perzik	Peach tree	vrucht, blad, zaad	fruit, leaf, seed		
Prunus serotina Ehrh.	Rosaceae		amerikaanse vogelkers	wild black cherry	schors, blad	bark, leaf		
Prunus spinosa L.	Rosaceae		sleedoorn	Sloe, blackthorn	bovengronde delen	aerial parts		
Psidium guajava L.	Myrtaceae		guava	guava tree	schors, vrucht, blad, wortel	bark, fruit, leaf, root	Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (25%) extracten zijn toegelaten.	Only the use of aqueous and slightly alcoholic extracts (25 %) is authorised.
Psidium guineense Sw.	Myrtaceae	Psidium araca Raddi	braziliaanse guave	Brazilian guava tree	vrucht, blad	fruit, leaf		
Pterocarpus erinaceus Poir.	Leguminosae				sap van het hout	wood juice		
Pterocarpus indicus Willd.	Leguminosae				sap van het hout	wood juice	De etikettering moet de volgende waarschuwing	The labelling must include the following warning:

							bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Pterocarpus marsupium Roxb.	Fabaceae		kinoboom, sandelboom, bastaardteak	Indian kino, venkai	bloem, kernhout, blad, gomhars	flower, heartwood, leaf, gum resin		
Pterocarpus officinalis Jacq.	Leguminosae	Pterocarpus draco L.			hars	resin		
Pterocarpus santalinus L. f.	Leguminosae		rode sandelboom	red sandalwood	hout	wood		
Pueraria montana var. lobata (Willd.) Sanjappa & Pradeep	Leguminosae	Pueraria lobata (Willd.) Ohwi	kudzu	Kudzu vine, foot-a-night vine, Japanese arrowroot	bloem, wortel	flower, root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed as glycoside of the main

							van de hoofdcompo nent) hoger dan 40 mg.	component), regardless of the source.
Pueraria tuberosa (Willd.) DC.	Leguminosa e				bloem, wortel	flower, root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcompo nent) hoger dan 40 mg.	The recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed as glycoside of the main component), regardless of the source.
Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn.	Compositae		heelblaadjes	common fleabane	hele plant	whole plant		
Pulmonaria officinalis L.	Boraginace ae		gevekt longkruid	common lungwort	wortel	root	Het voedings- supplement dient te voldoen aan de bepalingen van sectie 2.4 (pyrrolizidin e	The food supplement must comply with the provisions of Section 2.4 (pyrrolizidin e alkaloids) of the Annex to Commission

							alkaloïden) van de bijlage van verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023 betreffende maximumge halten aan bepaalde verontreinig ingen in levensmidde len en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1881/2006. Het notificatiedo ssier dient deze conformiteit aan te tonen middels analyse.	Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006. The notification file must demonstrate this compliance by analysis.
Punica granatum L.	Lythraceae		granaatboom	pomegranate	bloem, vrucht, zaad	flower, fruit, seed		
Pyrola rotundifolia L.	Ericaceae		rond wintergroen, rondbladig	round-leaved wintergreen	blad	leaf		

			wintergroen					
Pyropia tenera (Kjellman) N.Kikuchi & M.Miyata, M.S. Hwang & H.G.Choi	Bangiaceae	Porphyra tenera Kjellman			thallus	thallus		
Pyrus communis L.	Rosaceae		peer	pear tree	schors, vrucht, blad	bark, fruit, leaf		
Quercus alba L.	Fagaceae		amerikaanse witte eik	white oak, eastern white oak	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	bark, fruit, gallnut, leaf, bud		
Quercus coccifera L.	Fagaceae		hulsteik	kermes oak	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	bark, fruit, gallnut, leaf, bud		
Quercus ilex L.	Fagaceae		steeneik	holm oak	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	bark, fruit, gallnut, leaf, bud		
Quercus infectoria G. Olivier	Fagaceae				schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	bark, fruit, gallnut, leaf, bud		
Quercus petraea (Matt.) Liebl.	Fagaceae		wintereik	durmast oak, sessile oak	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	bark, fruit, gallnut, leaf, bud		
Quercus	Fagaceae		donzige eik	downy oak	schors,	bark,		

pubescens Willd.					vrucht, galnoot, blad, bladknop	fruit, gallnut, leaf, bud		
Quercus robur L.	Fagaceae		zomereik	English oak	schors, vrucht, galnoot, blad, bladknop	bark, fruit, gallnut, leaf, bud		
Quercus serrata subsp. serrata	Fagaceae	Quercus glandulifera Blume	chinese eik	jolcham oak, konara oak	schors, vrucht, galnoot, blad	bark, fruit, gallnut, leaf		
Quercus suber L.	Fagaceae		kurkeik	cork oak	schors, vrucht, galnoot, blad	bark, fruit, gallnut, leaf		
Quillaja saponaria Molina	Quillajaceae	Quillaja smegmadermos DC.			schors	bark		
Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin	Brassicaceae	Raphanus sativus var. niger (Mill.) J.Kern.	knopherik, wilde radijs	jointed charlock, wild radish	hele plant	whole plant		
Raphanus sativus L.	Brassicaceae		tuinradijs	garden radish	hele plant	whole plant		
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl.	Areaceae	Raphia pedunculata P.Beauv.			zetmeel afkomstig van het merg van de scheut	starch derived from the marrow of the shoot		
Rehmannia glutinosa (Gaertn.)	Plantaginaceae		chinees vingerhoedskruid	Chinese foxglove	wortel	root		

DC.								
Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke	Polygonaceae	Polygonum multiflorum Thunb., Fallopia multiflora (Thunb.) K. Haraldson	knoopkruid	brown knapweed	wortel, stengel, zaad	root, stem, seed		
Rhamnus alpina L.	Rhamnaceae		alpenwegedoorn	alpenwegebuckthorn	schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids* (expressed as glucofranguline A equivalents), regardless of the source. The labelling must include the following

							bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rhamnus cathartica L.	Rhamnaceae		wegedoorn	buckthorn	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als glucofranguline A) hoger	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids* (expressed as glucofranguline A equivalents),

							dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rheum australe D. Don	Polygonaceae	Rheum emodii Wall. ex Meisn.			blad, wortelstok	leaf, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 25 mg of

							van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	total anthranoids* (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rheum x hybridum Murray	Polygonaceae		Tuinrabarber	rhubarb	wortel, wortelstok	root, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct	The recommended daily portion of the finished product

							mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	must not lead to the ingestion of more than 25 mg of total anthranoids * (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rheum	Polygonace		chinese	Chinese	wortel,	root,	De	The

officinale Baill.	ae		rabarber	rhubarb, officinal rhubarb root	wortelstok	rhizome	aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen	recommend ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 25 mg of total anthranoids * (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeedin g. Not to be used for more than 14 days without
----------------------	----	--	----------	---------------------------------------	------------	---------	--	---

							gebruiken zonder deskundig advies.	specialist advice.
Rheum palmatum L.	Polygonace ae		chinese rabarber, sierrabarber, turkse rabarber	Chinese rhubarb, Sierrabarber, Turkish rhubarb	wortel, wortelstok	root, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin	The recommen ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 25 mg of total anthranoids * (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeedin

							g uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	g. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rheum rhabarbarum L.	Polygonaceae	Rheum undulatum L.	rabarber	rhubarb	wortel, wortelstok	root, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 25 mg of total anthranoids* (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age.

							jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rheum rhaponticum L.	Polygonaceae				wortel, wortelstok	root, rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 25 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 25 mg of total anthranoids* (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings:

							bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeedin g. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rhodiola crenulata (Hook. f.) & Thomson) Ohba	Crassulacea e		rozewortel	roseroot	wortel	root		
Ribes nigrum L.	Grossularia ceae		zwarte aalbes	black currant	knop, vrucht, blad	bud, fruit, leaf		
Ribes rubrum L.	Grossularia ceae		aalbes, trosbes	currant, redcurrant	vrucht, blad	fruit, leaf		
Ribes uva- crispa L.	Grossularia ceae		kruisbes	gooseberry	vrucht, blad	fruit, leaf		
Robinia pseudoacaci a L.	Leguminosa e		gewone robinia, valse acacia	false acacia, black locust	gekookte bloem, gekookte zaad	boiled flower, boiled seed		
Rocella phycopsis	Rocellaceae	Rocella tinctoria			thallus	thallus	De aanbevolen	The recommend

Ach.		DC.					dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van usninezuure quivalenten hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	ed daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 30 mg of usnic acid equivalents, regardless of the source. The concentration of usnic acid in the finished product must not exceed 3 %.
Rosa canina L.	Rosaceae		hondsroos	dog rose	bloem, vrucht, blad, zaad	flower, fruit, leaf, seed		
Rosa centifolia L. (pro sp.)	Rosaceae		franse provenceroos , provenceroos	French provence rose, provence rose	bloem, blad	flower, leaf		
Rosa gallica L.	Rosaceae		franse roos	French rose	bloem, vrucht, blad, zaad	flower, fruit, leaf, seed		
Rosa moschata Mill.	Rosaceae		echte muskusroos	real musk rose	bloem, vrucht, blad, zaad	flower, fruit, leaf, seed		
Rosa rubiginosa L.	Rosaceae		egellantier	eglantine, sweetbriar,	bloem, vrucht,	flower, fruit, leaf		

				sweetbriar rose	blad			
Rosa x damascena Mill.	Rosaceae	Rosa gallica f. trigintipe tala Dieck	damastroos	damask rose	bloem, vrucht, blad	flower, fruit, leaf		
Salvia rosmarinus Spenn.	Lamiaceae	Rosmarin us officinalis L.	rozemarijn	rosemary	bovengron dse delen	aerial parts		
Rubia cordifolia L.	Rubiaceae		rubia cordifolia l.	rubiaceae	wortel	root	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n lucidine bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of lucidin.
Rubus caesius L.	Rosaceae		dauwbraam	dewberry	bovengron dse delen	aerial parts		
Rubus chingii var. suavissimus (S. Lee) L.T. Lu	Rosaceae	Rubus suavissim us S. Lee			vrucht	fruit		
Rubus fruticosus L.	Rosaceae		gewone braam	bramble	hele plant	whole plant		
Rubus idaeus L.	Rosaceae		gewone framboos	European Raspberry, red raspberry	blad, vrucht	leaf, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuw ing	The labelling must include the following warning: Do

							bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap.	not use if you are pregnant.
Rubus rosa L.H. Bailey	Rosaceae				blad, vrucht	leaf, fruit		
Rumex acetosa L.	Polygonace ae		veldzuring	Sorrel, garden dock/sorrel, sour dock	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids * (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your

							12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rumex acetosella L.	Polygonaceae		schapenzuring	common sheep sorrel, red sorrel,	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten :	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids* (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not

							Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rumex alpinus L.	Polygonaceae		alpenzuring	alpine sorrel	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De etikettering	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids* (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling

							moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rumex conglomeratus Murray	Polygonaceae	Rumex acutus Sm.	kluwenzuring	clustered dock	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden*	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids* (expressed

							(uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rumex crispus L.	Polygonaceae		krulzuring	curled dock, curly-leaved dock, narrowleaf dock	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of

							leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	more than 14 mg of total anthranoids* (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rumex longifolius DC.	Polygonaceae				hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid	The recommended daily portion of

							van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig	the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids * (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rumex obtusifolius L.	Polygonaceae		ridderzuring	bitter dock	hele plant	whole plant	advies.	
							De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids* (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than

							dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	14 days without specialist advice.
Rumex patientia L.	Polygonaceae		spinaziezuring	spinach dock, spinach sorrel	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangsch	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids* (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are

							ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	pregnant or breastfeedin g. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Rumex sanguineus L.	Polygonace ae		bloedzuring		hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als rheine) hoger dan 14 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 14 mg of total anthranoids * (expressed as rhein), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children

							aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Ruscus aculeatus L.	Asparagaceae		stekelige muizendoorn	butcher's broom	hele plant	whole plant	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Ruscus hypoglossum L.	Asparagaceae				cladode, wortelstok	cladode, rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.

							tijdens de zwangerschap.	
Sabatia angularis (L.) Pursh	Gentianaceae				bovengron dse delen	aerial parts		
Saccharina latissima (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders	Laminariaceae	Laminaria saccharina (L.) J.V. Lam.	suikerwier	sugar kelp	thallus	thallus		
Saccharum officinarum L.	Poaceae		suikerriet	sugar cane	tak, sap	branch, juice		
Salix alba L.	Salicaceae		schietwilg, knotwilg	white willow	schors, knop, bloem, blad	bark, bud, flower, leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 96 mg of salicin, regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Consult your

							uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants. Do not administer to children and adolescents under 18 years of age.
Salix caprea L.	Salicaceae		boswilg	goat willow	schors	bark	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 96 mg of salicin, regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist

							bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescente n onder 18 jaar.	in the event of concomitant use of anticoagula nts. Do not administer to children and adolescents under 18 years of age.
Salix fragilis L.	Salicaceae		kraakwilg	brittle willow	schors, blad	bark, leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 96 mg of salicin, regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of

							gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	concomitant use of anticoagulants. Do not administer to children and adolescents under 18 years of age.
Salix pentandra L.	Salicaceae		laurierwilg	bay willow, laurel willow	schors, blad	bark, leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 96 mg of salicin, regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of

							ntia. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	anticoagulants. Do not administer to children and adolescents under 18 years of age.
Salix purpurea L.	Salicaceae		bittere wilg	basket willow, purple osier	schors, blad	bark, leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van salicine hoger dan 96 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulants. Niet gebruiken	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 96 mg of salicin, regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants. Do not

							bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.	administer to children and adolescents under 18 years of age.
Salvia hispanica L.	Lamiaceae		chia	chia	olie van het zaad	seed oil	Enkel de producten conform met de toelating als novel food voedingsingrediënt zijn toegelaten (verordening (uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470).	Only products complying with the authorisation as a novel food ingredient are authorised (Implementing Regulation (EU) 2017/2470).
Salvia miltiorrhiza Bunge	Lamiaceae		rode salie	red sage	blad, wortel	leaf, root		
Salvia officinalis L.	Lamiaceae		echte salie	kitchen sage	bovengronde delen	aerial parts		
Salvia officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams	Lamiaceae	Salvia lavandulifolia Vahl	lavendelsalie	lavender sage	bovengronde delen	aerial parts		
Salvia pratensis L.	Lamiaceae		veldsalie, weidesalie	meadow sage, meadow clary sage	bovengronde delen	aerial parts		
Salvia	Lamiaceae		scharlei	clary sage	bovengron	aerial		

sclarea L.					dse delen	parts		
Sambucus nigra L.	Adoxaceae		gewone vlier	common elder	hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van waterstofcyanide equivalenten (vrij en gebonden) hoger dan 1 mg. Indien het product bestemd is voor kinderen jonger dan 12 jaar, mag de inname niet hoger zijn dan 0.5 mg/dag	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 1 mg of hydrogen cyanide equivalents (free and bound), regardless of the source. If the product is intended for children under 12 years of age, ingestion must not exceed 0.5 mg/day
Sanguisorba minor Scop.	Rosaceae		kleine pimpernel	garden burnet	bovengron dse delen	aerial parts		
Sanguisorba officinalis L.	Rosaceae		grote pimpernel	burnet bloodwort, great burnet	hele plant	whole plant		
Sanicula elata Buch.-	Apiaceae	Sanicula europaea	heelkruid	laceleaf sanicle	blad, wortel	leaf, root		

Ham. ex D. Don		L.						
Santolina chamaecyparissus L.	Asteraceae		heiligenbloem	cotton lavender	bloeiende top, blad, zaad	flowering tops, leaf, seed		
Saponaria officinalis L.	Caryophyllaceae		zeepkruid	common soapwort	hele plant	whole plant		
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk	Apiaceae	Siler divaricatum (Turcz.) Benth. & Hook. f.		siler root	wortel	root		
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach	Rosaceae	Poterium spinosum L.		siler root	wortelschors	root bark	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Sargassum fusiforme (Harvey) Setchell	Sargassaceae	Hizikia fusiformis (Harvey) Okamura	hijiki, hiziki	hijiki, hiziki	thallus	thallus		
Sarracenia purpurea L.	Sarraceniacae		paarse trompetbeker	common pitcherplant,	blad, wortelstok	leaf, rhizome		

			plant	purple pitcherplant				
Satureja hortensis L.	Lamiaceae		bonenkruid	savory	bloeiende top, zaad	flowering tops, seed		
Satureja montana L.	Lamiaceae		winterbonenk ruid, bergbonenkr uid, bergsteentij m	Savory, winter savory	bovengron dse delen	aerial parts		
Satureja thymbra L.	Lamiaceae				bovengron dse delen	aerial parts		
Saussurea costus (Falc.) Lipsch.	Asteraceae	Saussure a lappa (Decne.) Sch. Bip.	costus	costus	wortel	root		
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.	Schisandra ceae		schisandra, wu wei zu	schisandra, Chinese schisandra, wu wei zu	decoct van tak, gekookt jong blad, vrucht	branch decoction , boiled young leaf, fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagula ntia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagula nts.
Schizochytri um microalgae	Thraustoch ytriaceae				olie	oil	Enkel de producten conform met de toelating als novel	Only products complying with the authorisatio

							food voedingsing rediënt zijn toegelaten (uitvoerings verordening (EU) 2017/2470).	n as a novel food ingredient are authorised (Implementi ng Regulation (EU) 2017/2470).
Scorzonera hispanica L.	Compositae		grote schorseneer	black salsify, Spanish salsify, common viper's grass	wortel	root		
Scrophularia ningpoensis Helmsl.	Scrophulari aceae		zwart helmkruid	scrophularia ningpoensis helmsl.	wortel	root		
Scutellaria baicalensis Georgi	Lamiaceae		baikalgliidkruid	Baikal skullcap	blad, wortel	leaf, root		
Scutellaria lateriflora L.	Lamiaceae				hele plant	whole plant	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n furano neoclerodan en bevat. De voorwaarde tot analyse vervalt indien door	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of furano neoclerodan es Analyses are not required if it can be demonstrate

							een botanisch certificaat wordt aangetoond dat de gebruikte delen afkomstig zijn van deze plant.	d by a botanical certificate that the parts used come from that plant
Secale cereale L.	Poaceae		rogge	rye	hele plant	whole plant		
Sedum acre L.	Crassulaceae		muurpeper	stonecrop	bovengron dse delen	aerial parts		
Sedum album L.	Crassulaceae		wit vetkruid	white stonecrop	blad	leaf		
Sedum roseum (L.) Scop.	Crassulaceae	Rhodiola rosea L.	rozenwortel	rose root	wortel	root		
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose	Cactaceae	Cereus grandiflorus (L.) Mill.	koningin der nacht	Queen of the night	bloem	flower		
Sempervivum tectorum L.	Crassulaceae		gewone huislook	common houseleek	bovengron dse delen	aerial parts		
Senna alexandrina Mill.	Leguminosae	Cassia acutifolia Delile, Cassia alexandrina (Garsault) Thell., Cassia angustifol	alexandrijnse senna	Alexandrian senna	blad, peul	leaf, pod	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than

		ia M.Vahl, Cassia senna L., Senna acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandri na Garsault, Senna angustifol ia (Vahl) Batka.					een inname van totaal anthranoïde n* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	18 mg of total anthranoids * (expressed as sennoside B), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeedin g. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Senna italica Mill.	Leguminosa e	Cassia italica (Mill.) F.W.Andr			vrucht (peul), blad	fruit (pod), leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid	The recommend ed daily portion of

		ews					van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoïden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder	the finished product must not lead to the ingestion of more than 18 mg of total anthranoids * (expressed as sennoside B), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
--	--	-----	--	--	--	--	---	--

							deskundig advies.	
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	Cassia obtusifolia L.			hele plant	whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 18 mg of total anthranoids* (expressed as sennoside B), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be

							raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	used for more than 14 days without specialist advice.
Senna occidentalis (L.) Link	Leguminosa e			arsenic bean, coffee senna	blad	leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoids n* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 18 mg of total anthranoids * (expressed as sennoside B), regardless of the source. The labelling must include the following warnings: Do not administer to children under 12 years of age.

							jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Senna tora (L.) Roxb.	Leguminosae				blad, zaad	leaf, seed	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van totaal anthranoiden* (uitgedrukt als sennoside B) hoger dan 18 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwi	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 18 mg of total anthranoids* (expressed as sennoside B), regardless of the source. The labelling must include the following

							ngen bevatten : Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangersch ap of borstvoedin g uw arts raadplegen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder deskundig advies.	warnings: Do not administer to children under 12 years of age. Consult your doctor if you are pregnant or breastfeedin g. Not to be used for more than 14 days without specialist advice.
Sequoiadend ron giganteum (Lindl.) J.Buchholz	Taxodiaceae		mammoetboom	giant redwood, giant sequoia	jonge bebladerde scheuten	young leafy shoots	Enkel geglycerine erde koude maceraten zijn toegelaten waarvoor de aanbevolen dagelijkse dosis overeenstem t met maximum 41 mg equivalent droge plant.	Only cold glycerinated macerations for which the recommended daily dose corresponds to a maximum of 41 mg of dry plant equivalent are authorised.
Serenoa	Arecaceae	Serenoa	zaagpalm,	saw palmetto	vrucht	fruit	De	The

repens (W.Bartram) Small		serrulata (Michx.) G. Nicholson; Serenoa serrulata (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks .; Sabal serrulata (Michx.) Schult.f.	zaagpalmetto				aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van vetoplosbare bestanddelen hoger dan 256 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than 256 mg fat- soluble constituents. The labelling must include the following warning: Seek advice from your doctor or pharmacist.
Sesamum indicum L.	Pedaliaceae	Sesamum orientale L.	sesam	sesame	zaad	seed		
Seseli tortuosum L.	Apiaceae				bovengron- dse delen	aerial parts		
Sideritis scardica Griseb.	Lamiaceae		Grieks bergkruid, Griekse bergthee	Greek mountain herb, Greek mountain tea	bovengron- dse delen	aerial parts	Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (20%) extracten is toegelaten.	Only the use of aqueous and slightly alcoholic extracts (20 %) is authorised.
Sideritis syriaca L.	Lamiaceae		bergthee	ironwort, Syrian	bovengron- dse delen	aerial parts	Enkel het gebruik van	Only the use of aqueous

				mountain tea			waterige en licht alcoholische (20%) extracten is toegelaten.	and slightly alcoholic extracts (20 %) is authorised.
<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	Compositae	<i>Sigesbeckia serrata</i> DC.		western St Paul's wort	blad, wortel	leaf, root		
<i>Silaum silaus</i> (L.) Shinz & Thell.	Apiaceae		weidekervel	pepper-saxifrage	vrucht, wortel	Fruit, root		
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Compositae		mariadistel	milk thistle	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C.K. Schneid.	Simmondsiaceae		jojoba	jojoba	zaad vrij van olie	oil-free seed	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken bij kinderen, adolescenten onder 18 jaar en tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Not to be used in children and adolescents under 18 years of age or during pregnancy.
<i>Sisymbrium officinale</i> (L) Scop.	Brassicaceae	<i>Erysimum officinale</i> L.	gewone raket	hedge mustard	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het	The recommended daily portion of the finished

							eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoïdie of schildklierbehandeling: raadpleeg uw arts. De concentratie aan cardioactieve steroïde glycosides in het eindproduct mag niet hoger zijn dan 0,1 mg/100mg bevat.	product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of progoitrin or more than 5 mg of goitrin, regardless of the source. The labelling must include the following warning: For people with hypothyroidism or taking thyroid treatment, consult your doctor. The concentration of cardiotonic steroid glycosides in the preparation must not be higher than 0.1 mg/100 mg.
--	--	--	--	--	--	--	---	---

Smilax aristolochiifolia Mill.	Smilacaceae	Smilax medica Schltdl. & Cham.			wortelstok , wortel	rhizome, root		
Smilax aspera L.	Smilacaceae		struikwinde,s tekende winde	common smilax, rough bindweed, catbrier, greenbrier	wortelstok , wortel, wortelscheut	rhizome, root, root shoot		
Smilax china L.	Smilacaceae		chinawortel	China root	hele plant	whole plant		
Smilax cordifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.	Smilacaceae				wortelstok , wortel	rhizome, root		
Smilax glabra Roxb.	Smilacaceae				wortelstok , wortel	rhizome, root		
Smilax officinalis Kunth	Smilacaceae	Smilax tonduzii Apt	echte sarsaparilla	real sarsaparilla	wortel	root		
Smilax purhampuy Ruiz	Smilacaceae	Smilax febrifuga Kunth	ecuadoriaanse sarsaparilla	Smilax febrifuga Kunth	wortelstok , wortel	rhizome, root		
Smilax regelii Killip & C.V. Morton	Smilacaceae		hondurese sarsaparilla, jamaicaanse sarsaparilla	Honduran sarsaparilla, Jamaican sarsaparilla	wortelstok , wortel	rhizome, root		
Solanum melongena L.	Solanaceae	Solanum ovigerum Dun.	aubergine	aubergine	vrucht, wortel	Fruit, root		
Solanum tuberosum L.	Solanaceae		aardappel	potato	knol	tuber		
Solidago virgaurea L.	Compositae		echte guldenroede	common goldenrod	bovengronde delen	aerial parts		

Sorbus aucuparia L.	Rosaceae		wilde lijsterbes	rowan	bovengron dse delen	aerial parts		
Sorghum bicolor (L.) Moench	Poaceae		kafferkoren, durra, kafir	sorghum, durra, kafir	zaad, jonge scheut	seed, young shoot	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van waterstofcy anide equivalente n (vrij en gebonden) hoger dan 1 mg. Indien het product bestemd is voor kinderen jonger dan 12 jaar, mag de inname niet hoger zijn dan 0.5 mg/dag.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 1 mg of hydrogen cyanide equivalents (free and bound), regardless of the source. If the product is intended for children under 12 years of age, ingestion must not exceed 0.5 mg/day.
Spatholobus suberectus Dunn.	Leguminosae				stam	stem	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct	The recommended daily portion of the finished product

							mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg.	must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed as glycoside of the main component), regardless of the source.
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C. Presl.	Caryophyllaceae		rode schijnspurrie	red sandspurrey	bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling .	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Spinacia oleracea L.	Amaranthaceae		spinazie	spinach	blad	leaf		
Spirulina major Kützing ex Gomont	Pseudanabaenaceae	Spirulina major Kützing	spirulina	Spirulina	ééncellige alg	single-cell algae		
Spirulina	Pseudanaba	Arthrospi	spirulina	Spirulina	ééncellige	single-		

maxima (Setchell & Gardner) Geitler	enaceae	ra maxima Setchell & Gardner			alg	cell algae		
Spirulina platensis (Gomont) Geitler	Pseudanaba enaceae		spirulina platensis, platensis	spirulina platensis, platensis	ééncellige alg	single- cell algae		
Stachys officinalis (L.) Trevis.	Lamiaceae	Betonica officinalis L.	betonie	betony	bovengron dse delen	aerial parts		
Stachys recta L.	Lamiaceae		bergandoorn	stiff hedgenettle	bovengron dse delen	aerial parts		
Stachys sylvatica L.	Lamiaceae		bosandoorn	hedge woundwort	bovengron dse delen	aerial parts		
Stellaria media (L.) Vill.	Caryophylla ceae		vogelmuur	chickweed	bovengron dse delen	aerial parts		
Stemmacant ha carthamoide s (Willd.) Dittrich	Asteraceae	Rhaponti cum carthamo ides (Willd.) Iljin		maral root	wortel	root		
Styphnolobiu m japonicum (L.) Schott	Leguminosa e	Sophora japonica L.	honingboom	pagoda tree	gekookt jong blad, bloem, bloemknop , decoct van het zaad, decoct van de stengel	young cooked leaf, flower, flower bud, seed decoction , stem decoction	Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerba re hoeveelhede n alkaloiden bevat.	the analysis must demonstrate that the preparation does not contain any detectable quantity of alkaloids.
Symplocos	Symplocace				bast	liber		

racemosa Roxb.	ae							
Syringa vulgaris L.	Oleaceae		sering	lilac	bladknop	leaf bud		
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry	Myrtaceae	Caryophy llus aromatic us L., Eugenia caryophyl lata Thunb. (name. illeg.) Mansfeld	kruidnagelbo om	clove tree	bloemknop	flower bud		
Syzygium cumini (L.) Skeels	Myrtaceae		jambolan	jambolan	schors, vrucht, blad, zaad	bark, fruit, leaf, seed		
Syzygium jambos (L.) Alston	Myrtaceae		rozenappel	malabar plum	vrucht, blad	fruit, leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van waterstofcy anide equivalente n (vrij en gebonden) hoger dan 1 mg. Indien	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 1 mg of hydrogen cyanide equivalents (free and bound), regardless of the source. If

							het product bestemd is voor kinderen jonger dan 12 jaar, mag de inname niet hoger zijn dan 0.5 mg/dag	the product is intended for children under 12 years of age, ingestion must not exceed 0.5 mg/day
Syzygium malaccense (L.) Merr. and L. M. Perry.	Myrtaceae		djamboe bol, maleisische rozenappel, maleisische wasappel	Malay rose apple, Malay apple, mountain apple	blad	leaf		
Tagetes erecta L.	Compositae		groot afrikaantje	Aztec marigold	bovengron dse delen	aerial parts		
Tagetes minuta L.	Compositae		geelgroen afrikaantje	southern cone marigold	bovengron dse delen	aerial parts		
Tamarindus indica L.	Leguminosae		tamarindeboom	Tamarind tree	vrucht	fruit		
Tamarix gallica L.	Tamaricaceae		franse tamarisk	French tamarisk	jonge bladscheut	young shoots		
Tanacetum balsamita L.	Compositae		balsemwormkruid	costmary, balsam herb	bovengron dse delen	aerial parts		
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.	Compositae		moederkruid	feverfew, featherfew	bovengron dse delen	aerial parts		
Tanacetum vulgare L.	Compositae		boerenwormkruid	tansy	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the

							bron, niet leiden tot een inname van thujon hoger dan 6 mg.	ingestion of more than 6 mg of thujone, regardless of the source.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H.Øllg. & Štěpánek	Asteraceae	Taraxacu m officinale Weber ex F.H.Wigg agg.	paardebloem	dandelion	hele plant	whole plant		
Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb.	Combretace ae		bibhitaki, bastaard myrobalaan	bibhitaki, bastard myrobalan	vrucht	fruit		
Terminalia chebula Retz.	Combretace ae		zwarte myrobalaan	black myrobalan	vrucht	fruit		
Thalictrum flavum L.	Ranunculac eae		poelruit	common meadow-rue	wortel	root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloïden (uitgedrukt als berberine)	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as berberine), regardless

							hoger dan 10 mg.	of the source.
Theobroma cacao L.	Malvaceae		cacaoboom	cacao tree	zaad	seed		
Thlaspi arvense L.	Brassicaceae		witte krodde, boerenkers	field penny-cress	zaad	seed	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoïdie of schildklierbehandeling: raadpleeg uw arts.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of progoitrin or more than 5 mg of goitrin, regardless of the source. The labelling must include the following warning: For people with hypothyroidism or taking thyroid treatment, consult your doctor.
Thymus satureioides	Lamiaceae		satureja tijm		bovengronde delen	aerial parts		

Coss.								
Thymus serpyllum L.	Lamiaceae		wilde tijm, veldtijm, citroentijm	wild thyme, field thyme, lemon thyme	bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant. Do not administer to children under 12 years of age.
Thymus vulgaris L.	Lamiaceae		echte tijm, hooitijm, roomse kwendel, tijmoes	common thyme, garden thyme, German thyme, thyme	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 4 g gedroogde plant. De etikettering moet de volgende waarschuwingen	The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 4 g of dried plant. The labelling must include the following warnings: Do not use if you are

							bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangersch ap. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.	pregnant. Do not administer to children under 12 years of age.
Thymus zygis L.	Lamiaceae		spaanse tijm, rode tijm	Spanish thyme, red thyme	bovengron dse delen	aerial parts		
Tilia americana L.	Malvaceae		amerikaanse linde	American linden	bovengron dse delen	aerial parts		
Tilia cordata Mill.	Malvaceae		winterlinde, kleinbladige linde	littleleaf linden, pry tree	hele plant	whole plant		
Tilia platyphyllos Scop.	Malvaceae		zomerlinde, grootbladige linde	summer linden, large- leaved linden	hele plant	whole plant		
Tilia tomentosa Moench	Malvaceae	Tilia argentea DC.	zilverlinde	silver linden	hele plant	whole plant		
Tilia x europaea L.	Malvaceae	Tilia x vulgaris B. Heyne	hollandse linde	holland lime, common lime, common linden	schors, bloem, blad, zaad	bark, flower, leaf, seed		
Tinospora cordifolia (Willd.) Miers	Menisperm aceae				wortel, stengel, blad	root, stem, leaf	Een botanisch certificaat moet aantonen dat de gebruikte	A botanical certificate must demonstrate that the parts used originate

							delen afkomstig zijn van deze plant. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isochinoline alkaloiden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.	from that plant. The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 10 mg of isoquinoline alkaloids (expressed as berberine), regardless of the source.
Trachyspermum ammi (L.) Sprague	Apiaceae		ajowan	ajowan	zaad	seed	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Tragopogon porrifolius L.	Compositae		paarse morgenster,	common salsify,	wortel	root		

Tribulus terrestris L.	Zygophyllaceae		boksbaard tribulus	oyster plant tribulus	gekookte plantendelen van de hele plant	boiled parts of the whole plant	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van saponinen hoger dan 15 mg. De etikettering moet de volgende waarschuwingen bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van hypertensie behandeling of antidiabetische behandeling	The recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than 15 mg of saponins. The labelling must include the following warnings: Do not use if you are pregnant or breastfeeding. Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for hypertension or diabetes. Not to be used in children and
------------------------	----------------	--	-----------------------	--------------------------	---	---------------------------------	--	--

							. Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 21 jaar.	adolescents under 21 years of age.
Trichilia catigua A. Juss.	Meliaceae		catuaba	catuaba	schors	bark	Een gedetailleerde botanische identificatie is vereist. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van tropaanalkaloiden (uitgedrukt als de som van atropine en scopolamine) hoger dan 1 µg.	Detailed botanical identification is required. The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 1 µg of tropane alkaloids (expressed as the sum of atropine and scopolamine), regardless of the source.
Trichosanthes kirilowii Maxim.	Cucurbitaceae		chinese komkommer	Chinese cucumber	vrucht (pericarp en zaad)	fruit (pericarp and seed)	Analyse moet aantonen	the analysis must demonstrate

							dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden trichosanthine bevat.	that the preparation does not contain any detectable quantity of trichosanthin.
Tridax procumbens L.	Compositae				bovengron dse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of anticoagulants.
Trifolium arvense L.	Leguminosae		hazenpootje	hare's foot clover	bovengron dse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isoflavonen	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed

							(uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg.	as glycoside of the main component), regardless of the source.
Trifolium campestre Schreb.	Leguminosae		liggende klaver	big hop clover	bovengronde delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed as glycoside of the main component), regardless of the source.
Trifolium pratense L.	Leguminosae		rode klaver	Chilean clover, cowgrass clover, red clover	bovengronde delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones

							isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg.	(expressed as glycoside of the main component), regardless of the source.
Trifolium repens L.	Leguminosae		witte klaver	Dutch clover, creeping white clover	bovengrondse delen	aerial parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron , niet leiden tot een inname van isoflavonen (uitgedrukt als glycoside van de hoofdcomponent) hoger dan 40 mg.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 40 mg of isoflavones (expressed as glycoside of the main component), regardless of the source.
Trigonella caerulea (L.) Ser.	Leguminosae		zevengetijdek laver	blue fenugreek	bovengrondse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.

Trigonella foenum-graecum L.	Leguminosae		fenegriek	fenugreek	zaad	seed	ap. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Trillium erectum L.	Melanthiaceae		drieblad, boslelie	red trillium, wake-robin	wortelstok	rhizome	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.
Triticum aestivum L.	Poaceae	Triticum vulgare Vill. ; Triticum sativum Lam.	gewone tarwe	common wheat	bovengrondse delen	aerial parts		
Triticum dicoccon (Schrank.) Schübl.	Poaceae		emmertarwe, emmer, tweekoren	emmer wheat, hulled wheat	vrucht	fruit		
Triticum durum Desf.	Poaceae	Triticum turgidum	harde tarwe	durum wheat	scheut, zaad	shoot, seed		

		L. subsp. durum (Desf.) Husnot						
Triticum spelta L.	Poaceae		spelt	spelt	scheut, zaad	shoot, seed		
Triticum turgidum L.	Poaceae		engelse tarwe	English wheat	scheut, zaad	shoot, seed		
Tropaeolum majus L.	Tropaeolac eae		oost-indische kers	Indian cress	bovengron dse delen zonder vrucht	aerial parts without fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progoitrine en 5 mg goitrine. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Bij hypothyreoï die of schildklierb ehandeling: raadpleeg uw arts.	The recommen ded daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of progoitrin or more than 5 mg of goitrin), regardless of the source. The labelling must include the following warning: For people with hypothyroidi sm or taking thyroid treatment,

								consult your doctor.
Tropaeolum minus L.	Tropaeolaceae				bovengronde delen zonder vrucht	aerial parts without fruit	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname hoger dan 20 mg progointrine en 5 mg goitrine. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Bij hypothyreoïdie of schildklierbehandeling: raadpleeg uw arts.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 20 mg of progointrin or more than 5 mg of goitrin), regardless of the source. The labelling must include the following warning: For people with hypothyroidism or taking thyroid treatment, consult your doctor.
Tsuga canadensis (L.) Carrière	Pinaceae		oostelijke, canadese hemlockspar	eastern hemlock, Canadian hemlock	blad, hars	leaf, resin		

Turnera diffusa Wild. ex Schult.	Passifloraceae		damiaanblad, damiana	Damiana leaves	bovengronde delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.	The labelling must include the following warning: Consult your doctor or pharmacist in the event of concomitant use of treatment for diabetes.
Ulmus glabra Huds.	Ulmaceae	Ulmus campestris L.; Ulmus scabra Mill.	ruwe olm, ruwe iep, bergiep	wych elm, Scots elm	schors, knop	bark, bud		
Ulmus pumila L.	Ulmaceae		siberische iep	Siberian Elm	schors, blad	bark, leaf		
Ulmus rubra Muhl.	Ulmaceae	Ulmus fulva Michx.	rode iep	red elm	schors	bark		
Ulva lactuca L.	Ulvaceae		zeesla	lettuce laver	thallus	thallus		
Uncaria gambir (Hunter) Roxb.	Rubiaceae		cachou, gambir, gambirstruik	cachou, gambir, gambir bush	bovengronde delen	aerial parts		
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.	Rubiaceae	Nauclea rhynchophylla			haak	hook		

ex Havel.		Miq.						
Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC.	Rubiaceae		katsklauw	cat's claw	schors, stam, wortel	bark, stem, root		
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar	Alariaceae	Alaria pinnatifida Harvey	wakame	wakame	thallus	thallus		
Urtica dioica L.	Urticaceae		grote brandnetel	common nettle	hele plant	whole plant	Voor bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Vraag raad aan uw arts	For preparations of the root or rhizome: The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 3.2 g of dried rhizome. The labelling must include the following warning: Seek the advice of your doctor and/or pharmacist.

							of apotheker.	
Urtica urens L.	Urticaceae		kleine brandnetel	dwarf nettle	hele plant	whole plant	Voor bereidingen van de wortel of wortelstok: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,2 g gedroogde wortelstok. De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Vraag raad aan uw arts of apotheker.	For preparations of the root or rhizome: The recommen ded daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 3.2 g of dried rhizome. The labelling must include the following warning: Seek the advice of your doctor and/or pharmacist.
Usnea barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Parmeliace ae		baardmos	tree moss	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het	The recommen ded daily portion of the finished

							eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van usninezuure quivalenten hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	product must not lead to the ingestion of more than 30 mg of usnic acid equivalents, regardless of the source. The concentration of usnic acid in the finished product must not exceed 3 %.
Usnea longissima Ach.	Parmeliaceae		baardmos	tree moss	thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van usninezuure quivalenten hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 30 mg of usnic acid equivalents, regardless of the source. The concentration of usnic acid in the

							eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	finished product must not exceed 3 %.
Usnea plicata Wiggers	Parmeliaceae				thallus	thallus	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het eindproduct mag, ongeacht de bron, niet leiden tot een inname van usninezuure quivalenten hoger dan 30 mg. De usninezuur concentratie in het eindproduct mag niet meer dan 3% zijn.	The recommended daily portion of the finished product must not lead to the ingestion of more than 30 mg of usnic acid equivalents, regardless of the source. The concentration of usnic acid in the finished product must not exceed 3 %.
Vaccinium angustifolium A.	Ericaceae				vrucht	fruit		
Vaccinium myrtilloides Michx.	Ericaceae	Vaccinium angustifolium var. myrtilloides (Michx.)		Canada Blueberry, velvet-leaved blueberry, sourtop	vrucht, blad	fruit, leaf		

		House						
<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Ericaceae		blauwe bes	blueberry, American blueberry	vrucht, blad	fruit, leaf		
<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	Ericaceae		grote veenbes, cranberry	cranberry	bes	berry		
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Ericaceae		blauwe bosbes	common bilberry	vrucht, blad	fruit, leaf		
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Ericaceae	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	kleine veenbes	small cranberry	vrucht	fruit		
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Ericaceae		rijsbes	bog bilberry	vrucht, blad	fruit, leaf		
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Ericaceae		rode bosbes	red bilberry	vrucht, blad	fruit, leaf	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 6,8 g gedroogd blad. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet	The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 6.8 g of dried leaf. The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeeding

							gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	g.
Valeriana jatamansi Jones	Valerianaceae	Valeriana wallichii DC.	indische valeriaan	Indian valerian	wortel	root	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g gedroogde wortel. De in te nemen bereiding mag geen valepotriaten bevatten.	The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 3.6 g of dried root. The final form for consumption must not contain valepotriates.
Valeriana officinalis L.	Caprifoliaceae		echte valeriaan	officinal valerian, hilly valerian, small leaf valerian	ondergrondse delen	subterranean parts	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 3,6 g	The recommended daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 3.6 g of dried subterranean

							gedroogde ondergrondse delen. De in te nemen bereiding mag geen valepotriaten bevatten.	n parts. The final form for consumption must not contain valepotriates.
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Caprifoliaceae	Valeriana locusta L.	veldsla, korensla, ezelsoor	corn salad, common cornsalad, lamb's lettuce	blad	leaf		
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews	Orchidaceae		vanille-orchidee	Vanilla orchid	vrucht, oliehar	fruit, oil, resin		
Verbascum densiflorum Bertol.	Scrophulariaceae		stalkaars	dense-flowered mullein	bovengrondse delen	aerial parts		
Verbascum phlomoides L.	Scrophulariaceae		keizerskaars	orange mullein	bloem	flower		
Verbascum thapsus L.	Scrophulariaceae		koningskaars	mullein	bovengrondse delen	aerial parts		
Verbena officinalis L.	Verbenaceae		ijzerhard	common vervain	bovengrondse delen	aerial parts	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant.

Veronica anagallis- aquatica L.	Plantaginac eae		blauwe waterereprijs	water speedwell	hele plant	whole plant		
Veronica beccabunga L.	Plantaginac eae		beekpunge	brooklime	bovengron dse delen	aerial parts		
Veronica chamaedrys L.	Plantaginac eae		gewone ereprijs, gamander- ereprijs	common speedwell, germander speedwell	hele plant	whole plant		
Veronica officinalis L.	Plantaginac eae		mannetjesere prijs	heath speedwell	bovengron dse delen	aerial parts		
Viburnum lantana L.	Adoxaceae		wollige sneeuwbal	wayfaring tree	bovengron dse delen	aerial parts		
Viburnum opulus L.	Adoxaceae		gelderse roos	guelder rose	bovengron dse delen	aerial parts		
Vicia Faba L.	Leguminosa e		tuinboon, labboon	fava bean, broad bean	gekookt zaad	cooked seed	De etikettering moet de volgende waarschuwi ng bevatten : Niet gebruiken bij favisme.	The labelling must include the following warning: Do not use if you have favism.
Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi	Leguminosa e	Phaseolu s Chrysant hos Savi	adzukiboon	adzuki bean, azuki bean	gekookt of geweekt zaad	boiled or soaked seeds		
Vigna subterranea (L.) Verdc.					zaad	seed	Voor de zaden en het zaadmeel, enkel de producten conform met de toelating	For the seeds and seed flour, only products that comply with the

							als novel food voedingsing rediënten zijn toegelaten (uitvoerings verordening (EU) 2017/2470).	authorisatio n as a novel food ingredient are authorised (Implementi ng Regulation (EU) 2017/2470).
<i>Viola calcarata</i> L.	Violaceae		langsporig viooltje	long-spurred violet, mountain violet	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae		maarts viooltje	sweet violet	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Viola palustris</i> L.	Violaceae		moerasviooltj e	marsh violet, alpine marsh violet	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Viola tricolor</i> L.	Violaceae		driekleurig viooltje	heartsease	bovengron dse delen	aerial parts		
<i>Viscum album</i> L.	Santalaceae		maretak	mistletoe	tak, blad	branch, leaf		
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Lamiaceae		monnikkenpe per, kuisboom	monk's pepper, chaste tree	hele plant	whole plant	Voor bereidingen van de vrucht: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid	For fruit preparations : The recommen ded daily portion must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 96 mg of dried fruit.

							equivalent met 96 mg gedroogde vrucht. De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Vitex trifolia L.	Lamiaceae				vrucht	fruit	De etikettering moet de volgende waarschuwing bevatten : Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.	The labelling must include the following warning: Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Vitis vinifera L.	Vitis Vitaceae		druif, wijnstok, wijngaardstok	common grape vine	vrucht, bladknop, blad, zaad	fruit, leaf bud, leaf, seed		
Withania somnifera	Solanaceae		ashwagandha , indiase	ashwagandha, Indian	hele plant	whole plant		

(L.) Dunal			ginseng	ginseng				
Xeranthemum annuum L.	Compositae		papierbloem	annual everlasting	bloem	flower		
Yucca filamentosa L.	Asaparagaceae		palmlelie	palm lily	bovengronde delen	aerial parts		
Yucca schidigera Roetz ex Ortgies	Asaparagaceae				bovengronde delen	aerial parts		
Zea mays L.	Poaceae		maïs	maize	bloem, vrucht, haarwortels van gekiemde zaad	flower, fruit, sprouted seed radicles		
Zingiber officinale Rosc.	Zingiberaceae		gember	ginger	wortelstok	rhizome	De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan de hoeveelheid equivalent met 1,5 g gedroogde wortelstok voor adolescenten en volwassenen en de hoeveelheid equivalent	The recommended daily dose must not lead to ingestion exceeding the amount equivalent to 1.5 g of dried rhizome for adolescents and adults and the equivalent amount of 0.75 g of dried rhizome for children

							met 0,75 g gedroogde wortelstok voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname hoger dan 1 g gedroogde wortelstok voor zwangere vrouwen (extracten zijn niet toegelaten). Het gebruik voor kinderen onder 6 jaar is niet toegestaan.	from 6 to 12 years of age. The recommended daily portion must not lead to the ingestion of more than 1 g of dried rhizome for pregnant women (extracts are not authorised). Use for children under 6 years of age is not authorised.
Ziziphus jujuba Mill.	Rhamnaceae		jujubeboom, chinese dadel	Chinese jujube, Chinese date	bovengrondse delen	aerial parts		

* Het "totaal" gehalte aan anthranoiden dient berekend te worden via bepaling van de gehalten in de afzonderlijke grondstoffen en vervolgens, op basis van de toegediende mengverhoudingen, gesommeerd te worden. Bij mengsels van verschillende plantensoorten is het totaal gehalte te

*In order to calculate the 'total' anthranoid content, the contents of each component must be determined separately and then, based on the dosages administered, added together. For mixtures of different plant species, the total content shall be limited to the maximum authorised dose of

beperken tot de maximale dosis toegelaten voor het ingrediënt waarvoor de laagste dosis geldt bij enkelvoudig gebruik.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.

Van Koningswege:

De Minister van Landbouw,

the ingredient to which the lowest dose applies in the case of simple use.

To be annexed to Our Decree of ... amending the Royal Decree of 31 August 2021 on the manufacture of and trade in foods composed of or containing plants or plant preparations.

By the King:

The Minister for Agriculture,

David CLARINVAL

De Minister van Volksgezondheid,

The Minister for Public Health,

Frank VANDENBROUCKE
