

Σχέδιο κανονισμού σχετικά με τροποποιήσεις του κανονισμού για την εκτροφή κατοικίδιων ορνίθων και γαλοπουλών

Νομική βάση: Θεσπίστηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων (ημερομηνία), σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 19, 23 και 24 του νόμου αριθ. 97, της 19ης Ιουνίου 2009, για την καλή μεταχείριση των ζώων, πρβλ. βασιλικό διάταγμα αριθ. 814, της 11ης Ιουνίου 2010.

Στην παραπομπή ΕΟΧ προστίθενται τα εξής:

Παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι τμήμα 9.1 σημείο 13 της συμφωνίας ΕΟΧ (οδηγία 2007/43/ΕΚ).

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ενημερώθηκε σχετικά με τους κανονισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην πράξη αριθ. 101, της 17ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την ευρωπαϊκή υποχρέωση κοινοποίησης όσον αφορά τους τεχνικούς κανόνες (πράξη διαβούλευσης ΕΟΧ) και στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΧΙΧ αριθ. 1 [οδηγία (ΕΕ) 2015/1535].

I

Επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στον κανονισμό της 12ης Δεκεμβρίου 2001, αριθ. 1494 σχετικά με την εκτροφή κατοικίδιων ορνίθων και γαλοπουλών:

Η νομική βάση διατυπώνεται ως εξής:

Θεσπίστηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων στις 12 Δεκεμβρίου 2001, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 15, 19, 23, 24, 25 και 38 του νόμου αριθ. 97, της 19ης Ιουνίου 2009, για την καλή μεταχείριση των ζώων, πρβλ. βασιλικό διάταγμα αριθ. 814, της 11ης Ιουνίου 2010.

Το πεδίο της παραπομπής ΕΟΧ διατυπώνεται ως εξής:

Συμφωνία ΕΟΧ παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι τμήμα 9.1 σημείο 8. (Οδηγία 1999/74/ΕΚ) και αριθ. 13. (Οδηγία 2007/43/ΕΚ) και παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι τμήμα 9.2 σημείο 2 (οδηγία 2002/4/ΕΚ).

Το άρθρο 3 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- a. Ζώα αναπαραγωγής: κατοικίδιες όρνιθες ηλικίας 20 εβδομάδων και άνω και γαλοπούλες 30 εβδομάδων και άνω που διατηρούνται για την παραγωγή αυγών για επώαση
- b. Ωφέλιμη επιφάνεια: περιοχή διαθέσιμη στα ζώα ανά πάσα στιγμή, εξαιρουμένης της περιοχής ωτοκίας
- c. Νεοσσοί μίας ημέρας και νεοσσοί γαλοπούλας: κατοικίδιες όρνιθες και γαλοπούλες ηλικίας κάτω των 72 ωρών και που δεν έχουν τραφεί μετά την εκκόλαψη
- d. Ημερήσιο ποσοστό θνησιμότητας: ο αριθμός των νεκρών κοτόπουλων ανά ημέρα μεταξύ των πτηνών που εισάγονται κατά την ίδια περίσταση σε έναν ορνιθώνα, διαιρούμενος με τον αριθμό των κοτόπουλων που υπάρχουν στον ορνιθώνα, πολλαπλασιαζόμενος επί 100. Ο αριθμός των νεκρών κοτόπουλων περιλαμβάνει εκείνα που έχουν θανατωθεί λόγω ασθένειας ή για άλλους λόγους
- e. Κάτοχος: ο ιδιοκτήτης του ζώου και λοιπά άτομα που εκπροσωπούν τον κάτοχο στην καθημερινή φροντίδα των πουλερικών σε μόνιμη ή προσωρινή βάση
- f. Πυκνότητα εκτροφής: συνολικό βάρος ζώντων ζώων που υπάρχουν ταυτόχρονα ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας στον ορνιθώνα
- g. Πουλερικά: πτηνά του είδους της κατοικίδιας όρνιθας (*Gallus gallus*) και γαλοπούλας (*Meleagris gallopavo*)

- h. Εγκαταστάσεις πουλερικών: υπαίθριοι χώροι, κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται πουλερικά
- i. Σμήνος: δύο ή περισσότερα πτηνά που βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο ορνιθώνα
- j. Πυκνότητα ζώων: ο αριθμός των πτηνών που υπάρχουν ταυτόχρονα ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας στον ορνιθώνα ή στον κλωβό
- k. Χειρουργική επέμβαση: κοπή ή διάτρηση του δέρματος ή άλλου ζωντανού ιστού, καταστροφή ζωντανών ιστών ή αφαίρεση ολόκληρου ή τμήματος μέρους του σώματος
- l. Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής: κατοικίδιες όρνιθες ηλικίας κάτω των 20 εβδομάδων που διατηρούνται για την παραγωγή κρέατος
- m. Πουλάδες: κατοικίδιες όρνιθες ηλικίας κάτω των 20 εβδομάδων που διατηρούνται για την παραγωγή αυγών προς κατανάλωση ή προς επώαση και γαλοπούλες ηλικίας κάτω των 30 εβδομάδων που διατηρούνται για την παραγωγή αυγών προς επώαση
- n. Όρνιθες ωοπαραγωγής: κατοικίδιες όρνιθες ηλικίας 20 εβδομάδων και άνω που διατηρούνται για την παραγωγή αυγών για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Το νέο άρθρο 4α διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 4α Συμβουλές για την καλή μεταχείριση των ζώων

Κάτοχοι οι οποίοι δεν υπόκεινται στα συστήματα καλής μεταχείρισης των ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 4β και οι οποίοι διατηρούν 50 ή περισσότερα πουλερικά εξασφαλίζουν ότι ο κτηνίατρος αξιολογεί και παρέχει συμβουλές για την καλή μεταχείριση των πτηνών τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Το νέο άρθρο 4β διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 4β Συστήματα καλής μεταχείρισης των ζώων

Κάτοχοι οι οποίοι διατηρούν

1. 200 ή περισσότερα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής του είδους της κατοικίδιας όρνιθας και γαλοπούλας για παραγωγή κρέατος
2. 50 ή περισσότερες πουλάδες ή κλώσες του είδους της κατοικίδιας όρνιθας ή γαλοπούλας
3. 1000 ή περισσότερες πουλάδες ή όρνιθες ωοπαραγωγής για την παραγωγή αυγών για κατανάλωση από τον άνθρωπο από το είδος της κατοικίδιας όρνιθας

υπάγονται σε σύστημα για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Το σύστημα για την καλή μεταχείριση των ζώων επιβάλλει, κατ' ελάχιστον, απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο κάτοχος πρέπει

1. να διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την καλή μεταχείριση των ειδών πουλερικών που διατηρεί και τον συγκεκριμένο τύπο παραγωγής
2. να διασφαλίζει την εκτέλεση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών ελέγχων της κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης
3. να συνάψει συμφωνία με κτηνίατρο που θα επισκέπτεται την κτηνοτροφική εκμετάλλευση και θα αξιολογεί και θα παρέχει συμβουλές σχετικά με την καλή μεταχείριση των πτηνών τουλάχιστον
 1. δύο φορές ετησίως όταν εκτρέφει το είδος της κατοικίδιας όρνιθας ή γαλοπούλας για την παραγωγή κρέατος
 2. μία φορά ανά εισαγωγή πουλάδων ή κλωσών (ζώα αναπαραγωγής) του είδους της κατοικίδιας όρνιθας ή γαλοπούλας
 3. μία φορά ανά εισαγωγή ορνίθων ωοπαραγωγής για την παραγωγή αυγών για κατανάλωση από τον άνθρωπο

4. μία φορά κατά τη διάρκεια 12μηνιαίας περιόδου διατήρησης πουλάδων με σκοπό την παραγωγή αυγών για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Επιπλέον, στην περίπτωση εκτροφής του είδους της κατοικίδιας όρνιθας ή γαλοπούλας για την παραγωγή κρέατος, το σύστημα καλής μεταχείρισης των ζώων επιβάλλει επίσης απαιτήσεις για τη συμμετοχή του κατόχου στο πρόγραμμα για την υγεία των πελμάτων και τον σχετικό υπολογισμό της βαθμολογίας δερματίτιδας των πελμάτων για όλα τα σμήνη που σφάζονται.

Επιπλέον, στην περίπτωση εκτροφής πουλάδων ή ορνίθων ωοπαραγωγής για την παραγωγή αυγών για κατανάλωση από τον άνθρωπο και στην περίπτωση εκτροφής πουλάδων ή κλωσών του είδους της κατοικίδιας όρνιθας ή γαλοπούλας, το σύστημα καλής μεταχείρισης των ζώων επιβάλλει επίσης απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο κάτοχος πρέπει

1. να μετρά την ποιότητα του αέρα και να εκτιμά την ποσότητα σκόνης, την ποιότητα της στρωμνής και του φτερώματος
2. να παρακολουθεί μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τη θανάτωση πτηνών.

Το νέο άρθρο 4γ διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 4γ Σχέδιο για την καλή μεταχείριση των ζώων

Κατά την εκτροφή πουλερικών, ο κάτοχος διαθέτει γραπτό σχέδιο στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλίζεται η καλή μεταχείριση των πτηνών. Το σχέδιο πρέπει, κατ' ελάχιστον, να περιγράφει

1. τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι όποιος είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα των πτηνών είναι ικανός, εξοικειωμένος με τις ενδείξεις κακής διαβίωσης των ζώων και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που τα πτηνά παρουσιάζουν ενδείξεις κακής διαβίωσης των ζώων
2. τον τρόπο με τον οποίο περιθάλπονται τα πτηνά όταν νοσούν, τραυματίζονται ή είναι αδύναμα ή όταν τα πτηνά παρουσιάζουν ενδείξεις κακής διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του βαθμού επιτυχίας της θεραπείας ή του κατά πόσον το πτηνό πρέπει να θανατωθεί
3. τις διαδικασίες σχετικά με τη θανάτωση πτηνών, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης σοβαρών εστιών νόσου
4. τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της φροντίδας των πτηνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως όταν ο κάτοχος δεν είναι σε θέση να φροντίσει τα πτηνά ή σε εξαιρετικές καταστάσεις.

Το νέο άρθρο 4δ διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 4δ Τεκμηρίωση

Για κάθε νέα εισαγωγή ζώων, ο κάτοχος τεκμηριώνει γραπτώς τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα πτηνά που διατηρούνται σε κάθε ορνιθώνα:

1. τον αριθμό των πτηνών που εισάγονται
2. το μέγεθος της ωφέλιμης επιφάνειας
3. τη φυλή ή το υβρίδιο που εισάγεται
4. τυχόν αξιολογήσεις και συμβουλές που παρέχονται από τον κτηνίατρο
5. τυχόν ασθένειες και τραυματισμούς των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών αιτιών
6. οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή ασθενειών και τραυματισμών των πτηνών

7. τον αριθμό των πτηνών που βρέθηκαν νεκρά ή θανατώθηκαν σε σχέση με κάθε επιθεώρηση
8. την πιθανή αιτία θανάτου ή αιτία θανάτωσης για πτηνά που πεθαίνουν από φυσικά αίτια ή που πρέπει να θανατωθούν
9. τον αριθμό των πτηνών που παραμένουν στο σμήνος μετά την επιλογή προς πώληση, τη σφαγή ή τη θανάτωση πτηνών.

Σε περίπτωση εκτροφής του είδους της κατοικίδιας όρνιθας ή γαλοπούλας για παραγωγή κρέατος, η βαθμολογία δερματίτιδας των πελμάτων που καταγράφεται από το σφαγείο τεκμηριώνεται επίσης γραπτώς.

Επιπλέον, όταν διατηρούνται πουλάδες ή όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους της κατοικίδιας όρνιθας για παραγωγή αυγών για κατανάλωση από τον άνθρωπο και πουλάδων ή κλωσών του είδους της κατοικίδιας όρνιθας ή γαλοπούλας, τα αποτελέσματα των μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών καλής μεταχείρισης και τυχόν δράσεων που έχουν υλοποιηθεί, πρέπει επίσης να τεκμηριώνονται γραπτώς.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) και στην τρίτη παράγραφο καταγράφονται κατά την εισαγωγή, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) και στη δεύτερη παράγραφο καταγράφονται ανάλογα με τις ανάγκες ή όταν πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και μετρήσεις και οι πληροφορίες στα στοιχεία ε) και στ) καταγράφονται σε συνεχή βάση. Όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο φυλάσσονται για τουλάχιστον πέντε έτη και διατίθενται στο πλαίσιο επιθεωρήσεων ή άλλων ερευνών από τη νορβηγική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Το άρθρο 7 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 7 Εγκαταστάσεις πουλερικών

Οι εγκαταστάσεις πουλερικών σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε:

1. στο μέτρο του δυνατού, να καλύπτονται οι σωματικές και ψυχικές ανάγκες των πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών συμπεριφοράς τους
2. να μπορούν τα πτηνά να εκτελούν τυπικές κινήσεις
3. το πλέγμα και τα λοιπά υλικά στους κλωβούς να είναι καλής σχεδίασης και ποιότητας
4. να υπάρχει μικρός κίνδυνος τραυματισμού των πτηνών, ακόμη και κατά τη στιγμή της εισαγωγής τους και της μείωσης του πληθυσμού τους
5. το δάπεδο, η κούρνια και τα λοιπά υλικά να μην προκαλούν δυσφορία στα πτηνά
6. η κούρνια να εμποδίζει το λιγότερο δυνατόν την πρόσβαση των πτηνών
7. να είναι εύκολο να διενεργείται διεξοδική επιθεώρηση και να γίνεται σωστή επίβλεψη όλων των πτηνών
8. να μπορούν τα πτηνά να λαμβάνουν καλής ποιότητας περίθαλψη και θεραπευτική αγωγή
9. να μην μπορούν τα πτηνά να δραπετεύσουν.

Τα πτηνά που διατηρούνται εντός της ίδιας οριοθετημένης περιοχής πρέπει να είναι ίδιας ηλικίας.

Η νέα παράγραφος 3 του άρθρου 9 διατυπώνεται ως εξής:

Τα πτηνά δεν πρέπει να εκτίθενται σε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αυτό δεν ισχύει για την απαραίτητη χρήση εξαιρετικά ορατών εξωτερικών ηλεκτρικών περιφράξεων. Απαγορεύεται η χρήση και η εγκατάσταση ηλεκτροφόρων καλωδίων σε εσωτερικούς χώρους με σκοπό τον περιορισμό ή την τροποποίηση της συμπεριφοράς των πτηνών.

Η τρέχουσα παράγραφος 3 του άρθρου 9 γίνεται η νέα παράγραφος 4.

Το νέο άρθρο 9 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 9α Κούρνια

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται στην παραγωγή όλων των κατοικίδιων ορνίθων, με εξαίρεση τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής.

Τα πτηνά έχουν πρόσβαση σε κούρνιες στις οποίες μπορούν να κουρνιάζουν για να αναπαύονται. Όλα τα πτηνά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κουρνιάζουν ταυτόχρονα.

Οι κούρνιες δεν πρέπει να έχουν αιχμηρές ακμές και πρέπει να είναι κατάλληλες για το είδος και το μέγεθος των πτηνών. Οι κούρνιες πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε το πέλμα να μπορεί να επιτυγχάνει καλή πρόσφυση γύρω από την κούρνια. Οι κούρνιες τοποθετούνται σε τέτοιο ύψος σε σχέση με το δάπεδο ώστε τα πτηνά να αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται ψηλά όταν κουρνιάζουν και να είναι σε θέση να έχουν κάποια εικόνα του τι συμβαίνει στο δάπεδο. Η απαίτηση σχετικά με υπερυψωμένη θέση δεν ισχύει για τους διευθετημένους κλωβούς.

Οι κούρνιες δεν τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να παρεμποδίζονται οι κινήσεις των πτηνών στην περιοχή της στρωμνής ή κατά τρόπον ώστε η τροφή και το νερό να μπορούν να μολυνθούν.

Για τις όρνιθες ωοπαραγωγής ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τουλάχιστον 15 cm κούρνιας ανά όρνιθα. Στις περιπτώσεις συστημάτων ελεύθερης βοσκής, οι κούρνιες δεν τοποθετούνται πάνω από την περιοχή της στρωμνής. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των κουρνιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 cm και η οριζόντια απόσταση μεταξύ της κούρνιας και του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2027, οι διάφορες λύσεις κουρνιών που υποβάλλονται σε δοκιμή μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές κούρνιες για κατοικίδιες όρνιθες σε σμήνη για την παραγωγή αυγών προς επώαση και σε σμήνη γεννητόρων που αποτελούνται είτε από ζώα αναπαραγωγής είτε από πουλάδες για την παραγωγή αυγών για κατανάλωση από τον άνθρωπο, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις είναι κατάλληλες και άνετες για το κούρνιασμα των πτηνών.

Το άρθρο 10 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 10 Κλιματικές συνθήκες

Η θερμοκρασία και η ποιότητα του αέρα προσαρμόζονται στις ανάγκες των πτηνών. Τα πτηνά φυλάσσονται σε ξηρές αίθουσες ελεύθερες ρευμάτων. Η ποσότητα σκόνης δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλή που να προκαλεί σημαντική επιδείνωση της καλής διαβίωσης των πτηνών. Το επίπεδο των αερίων στον αέρα δεν πρέπει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα πτηνά. Η συγκέντρωση αμμωνίας και διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 ppm και τα 3 000 ppm αντίστοιχα, μετρούμενα στο ύψος της κεφαλής των πτηνών. Ο κάτοχος πρέπει να διαθέτει γραπτές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η μη υπέρβαση των κρίσιμων ορίων και η ανάληψη δράσεων σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων. Τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τυχόν υλοποιηθεισών δράσεων.

Το άρθρο 11 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 11 Συστήματα εξαερισμού και συναγερμού σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες

Τα συστήματα εξαερισμού και τα συστήματα διαχείρισης της κοπριάς σχεδιάζονται, λειτουργούν και συντηρούνται κατά τρόπο ώστε να μην προκύπτουν δυσμενείς συγκεντρώσεις αερίων.

Εάν ο χώρος διαβίωσης δεν αερίζεται επαρκώς με φυσικό τρόπο, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τα εξής

1. μηχανικό σύστημα εξαερισμού που εξασφαλίζει επαρκή κυκλοφορία του αέρα
2. χειροκίνητο εξαερισμό έκτακτης ανάγκης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον του μηχανικού συστήματος εξαερισμού
3. λειτουργικό σύστημα συναγερμού που προειδοποιεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και υπερβολικά υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.

Το σύστημα συναγερμού ειδοποιεί τα άτομα που γνωρίζουν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση βλάβης του μηχανικού συστήματος εξαερισμού. Το σύστημα συναγερμού εξακολουθεί να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ο συναγερμός θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να εξασφαλίζεται ότι λειτουργεί και να εντοπίζονται και να διορθώνονται τυχόν βλάβες το συντομότερο δυνατόν. Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται τεκμηριώνονται.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 διατυπώνεται ως εξής:

Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ταΐστρες και ποτίστρες. Όλα τα *πτηνά* πρέπει να είναι σε θέση να έχουν εύκολη πρόσβαση στο νερό και την τροφή. Εάν τα *πτηνά* δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην τροφή, πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος στην ταΐστρα ώστε όλα τα *πτηνά* να σιτίζονται ταυτόχρονα. Τα *πτηνά* έχουν *πάντοτε* ελεύθερη πρόσβαση σε πόσιμο νερό καλής ποιότητας. Όλα τα *πτηνά* έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον δύο ποτίστρες. Οι *ποτίστρες* σχεδιάζονται και συντηρούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν μικρότερη σπατάλη νερού.

Η νέα παράγραφος 3 του άρθρου 17 διατυπώνεται ως εξής:

Οι πουλάδες και τα ζώα αναπαραγωγής που μεταφέρονται μεταξύ πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σιτίζονται από τον παραλήπτη εντός 24 ωρών από την τελευταία σίτιση από τον προμηθευτή. Εάν τα *πτηνά* έχουν συνηθίσει να τρέφονται δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα, τα *πτηνά* πρέπει να λάβουν τροφή εντός 12 ωρών. Ο χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης των *πτηνών* δεν περιλαμβάνεται στις 12 ώρες σύμφωνα με τη δεύτερη περίοδο της παρούσας παραγράφου. Τα *πτηνά* πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκουν εύκολα τροφή και νερό κατά την άφιξή τους στην εγκατάσταση υποδοχής.

Το νέο άρθρο 17α διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 17α Στρωμνή και κύλισμα σε χώμα

Τα *πτηνά* έχουν πρόσβαση σε στρωμνή. Η στρωμνή αποτελείται από χαλαρό υλικό, όπως άμμος, χαλίκι, ροκανίδια ξύλου, άχυρο ή τύρφη, το οποίο ενθαρρύνει το ράμφισμα και το γρατζούνισμα από τα *πτηνά*. Η επιφάνεια της στρωμνής είναι στεγνή και ολόκληρη η στρώση της στρωμνής διατηρείται επαρκώς στεγνή έτσι ώστε τα *πτηνά* να τη χρησιμοποιούν χωρίς να αισθάνονται δυσφορία. Κάθε φορά που εισάγονται νέα πουλερικά χρησιμοποιείται νέα στρωμνή.

Ολόκληρη η ωφέλιμη επιφάνεια για γαλοπούλες και κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής καλύπτεται με στρωμνή.

Επιπλέον, τα *πτηνά* έχουν πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα υλικών κατάλληλων για κύλισμα σε χώμα.

Για τα *πτηνά* που φυλάσσονται σε κλωβούς, ο χώρος που προορίζεται για κύλισμα σε χώμα τοποθετείται και σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε όλα τα *πτηνά* στον κλωβό να μπορούν να κυλιούνται στο χώμα κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να διαφεύγουν τυχόν υλικά από τον χώρο κυλίσματος. Τα *πτηνά* είναι σε θέση να έρχονται σε επαφή με το υλικό κατά τη διάρκεια του κυλίσματος στο χώμα.

Το νέο άρθρο 17β διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 17β Εμπλουτισμένο περιβάλλον διαβίωσης

Εκτός από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 9α και 17α, όλα τα πτηνά έχουν πρόσβαση σε διάφορα κατάλληλα υλικά που έχουν σχεδιαστεί για να ενεργοποιούν και να ενθαρρύνουν τη φυσική συμπεριφορά των πτηνών, όπως εξερεύνηση, δραστηριότητα, παιχνίδι, αναζήτηση τροφής, ράμφισμα και ανάπαυση, καθώς και παραμονή σε υπερυψωμένη θέση. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά *πρέπει* να προσαρμόζονται στην ηλικία και στις ειδικές ανάγκες των πτηνών, όπως οι πλατφόρμες για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και γαλοπούλες.

Το άρθρο 19 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 19. Χειρισμός

Η σύλληψη και τυχόν άλλος χειρισμός των πουλερικών *πρέπει* να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η *πρόκληση* τραυματισμού ή περιττού φόβου στα πτηνά. Κατά τη διάρκεια της μείωσης του πληθυσμού των κλωβών, τα πτηνά *πρέπει* να *στηρίζονται* κάτω από το στέρνο ή να κρατούνται με άλλο τρόπο, έτσι ώστε να μην προκαλείται βλάβη στα φτερά ή σε άλλα μέρη του σώματος.

Τα πουλερικά δεν ανυψώνονται ούτε μεταφέρονται από το ένα πόδι. Η απόσταση μεταφοράς θα *πρέπει* να περιορίζεται στο μέτρο του δυνατού. Τα πτηνά μεταφέρονται *κατά* τρόπο κατάλληλο για το μέγεθος και το βάρος τους.

Κανείς δεν *πρέπει* να μεταφέρει περισσότερες από μία γαλοπούλες κάθε φορά. Οι γαλοπούλες μεταφέρονται με τα κεφάλια τους στραμμένα προς τα πάνω, εκτός από τη στιγμή κατά την οποία ανυψώνονται. Μέχρι την ηλικία των 14 εβδομάδων, ο μεταφορέας μεταφέρει τις γαλοπούλες είτε κρατώντας τις γύρω από τους δύο μηρούς είτε κρατώντας τις κοντά στο σώμα του και παρέχοντας στήριξη με το σώμα και τον βραχίονα του. Στην περίπτωση των γαλοπουλών ηλικίας άνω των 14 εβδομάδων ή αυτών που ανήκουν σε σμήνος με μέσο βάρος άνω των 10 kg ανά πτηνό, ο μεταφορέας τις μεταφέρει κρατώντας τις γύρω από τους δύο μηρούς και παρέχοντας στήριξη στη βάση της μίας φτερούγας.

Το άρθρο 20 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 20 Υγιεινή

Οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούν καλά επίπεδα υγιεινής. Οι εγκαταστάσεις καθαρίζονται και απολυμαίνονται στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των εισαγωγών πτηνών. Οι υπαίθριοι χώροι διαθέτουν σύστημα αποστράγγισης έτσι ώστε να μη γίνονται λασπώδεις.

Τα νεκρά πτηνά απομακρύνονται καθημερινά.

Το άρθρο 21 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 21 Χειρουργικές επεμβάσεις και απαγόρευση αφαίρεσης τμημάτων του σώματος

Δεν πραγματοποιείται καμία χειρουργική επέμβαση σε πουλερικά, εκτός εάν είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση, την πρόληψη ή τη θεραπεία ασθενειών ή τραυματισμών του πτηνού. Όλες οι επεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τη λειτουργική ικανότητα και την ποιότητα ζωής του πτηνού. Ωστόσο, έως την 1η Ιανουαρίου 2030, θα εξακολουθεί να επιτρέπεται η αφαίρεση της εξωτερικής άρθρωσης του τελευταίου δακτύλου του ποδιού στους πετεινούς για την αποφυγή της πρόκλησης τραυματισμών στις όρνιθες.

Όλες οι διαδικασίες που αφορούν τα πουλερικά διενεργούνται από κτηνίατρο με ήπια μέθοδο αναγνωρισμένη στην κτηνιατρική. Τα πτηνά λαμβάνουν την απαραίτητη αναισθησία και ανακούφιση από τον πόνο με επαρκή διάρκεια δράσης.

Το άρθρο 25 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 25 Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ελεύθερου σταβλισμού

Στα συστήματα ελεύθερου σταβλισμού των ορνίθων ωοπαραγωγής, πρέπει να υπάρχουν τα εξής

1. κατ' ανώτατο όριο εννέα όρνιθες ανά m^2 ωφέλιμης επιφάνειας διαθέσιμης για τις όρνιθες
2. φωλιές, κατάλληλες για την ωοτοκία και όχι με δικτυωτή επιφάνεια. Υπάρχει είτε τουλάχιστον μία ατομική φωλιά για κάθε επτά όρνιθες ή τουλάχιστον $1 m^2$ εμβαδού φωλιάς ανά 120 όρνιθες όταν χρησιμοποιούνται κοινόχρηστες φωλιές
3. τουλάχιστον $250 cm^2$ επιφάνειας στρωμνής ανά όρνιθα, όπου η στρωμνή καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο της επιφάνειας του δαπέδου
4. ταΐστρες τις οποίες οι όρνιθες μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς εμπόδια, με τουλάχιστον 10 cm χώρου στην ταΐστρα ανά όρνιθα στην περίπτωση γραμμικών ταϊστρών ή τουλάχιστον 4 cm χώρου στην ταΐστρα ανά όρνιθα στην περίπτωση κυκλικών ταϊστρών
5. ποτίστρες τις οποίες οι όρνιθες μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς εμπόδια, με τουλάχιστον 2,5 cm χώρου στην ποτίστρα ανά όρνιθα ή τουλάχιστον 1 cm χώρου στην ποτίστρα ανά όρνιθα στην περίπτωση των κυκλικών ποτιστρών. Όταν χρησιμοποιούνται ποτίστρες με θήλαστρα ή κύπελλα νερού, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία ποτίστρα με θήλαστρα ή θήλαστρο νερού ανά δέκα όρνιθες
6. υπόστρωμα στα κελιά που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επαρκώς καθένα από τα νύχια με μέτωπο προς τα εμπρός σε κάθε πέλμα.

Το άρθρο 26 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 26 Πρόσθετες απαιτήσεις για τα πτηνοτροφεία

Σε συστήματα παραγωγής στα οποία οι όρνιθες ωοπαραγωγής μπορούν να κινούνται ελεύθερα μεταξύ διαφορετικών επιπέδων,

1. υπάρχουν το πολύ τέσσερα επίπεδα
2. υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 45 cm μεταξύ κάθε επιπέδου
3. υπάρχουν συστήματα σίτισης και παροχής νερού καταμετρημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση για όλες τις όρνιθες
4. εφαρμόζονται ρυθμίσεις για τα επίπεδα έτσι ώστε να αποφεύγεται η πτώση περιττωμάτων στα επίπεδα από κάτω.

Το άρθρο 29 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 29 Απαιτήσεις σχετικά με τους διευθετημένους κλωβούς

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέας εκμετάλλευσης ορνίθων ωοπαραγωγής για τις οποίες χρησιμοποιούνται διευθετημένοι κλωβοί ή η προσθήκη νέων διευθετημένων κλωβών σε υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής.

Σε διευθετημένους κλωβούς ορνίθων ωοπαραγωγής, πρέπει να υπάρχουν

1. τουλάχιστον $850 cm^2$ εμβαδού κλωβού ανά όρνιθα, εκ των οποίων τουλάχιστον $675 cm^2$ πρέπει να είναι ωφέλιμη επιφάνεια. Η ωφέλιμη επιφάνεια πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 30 cm, ύψος τουλάχιστον 45 cm και κλίση που δεν υπερβαίνει το 14 %.

Εξωτερικά της ωφέλιμης επιφάνειας, το ύψος πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm. Κάθε κλωβός έχει συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 2 000 cm²

2. φωλιές, κατάλληλες για την ωοτοκία και όχι με δικτυωτή επιφάνεια. Ο αριθμός των φωλιών και το μέγεθος των φωλιών προσαρμόζονται στο μέγεθος του σμήνους
3. ταΐστρες στις οποίες οι όρνιθες έχουν πρόσβαση χωρίς εμπόδια και με τουλάχιστον 12 cm χώρου στην ταΐστρα ανά όρνιθα
4. κατάλληλο σύστημα παροχής νερού που αντιστοιχεί στο μέγεθος της ομάδας. Όταν χρησιμοποιούνται ποτίστρες με θήλαστρα ή κύπελλα, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ποτίστρες με θήλαστρα ή κύπελλα για κάθε όρνιθα
5. διάταξη ξυσίματος των νυχιών για να εξασφαλιστεί ότι τα νύχια των ορνίθων φθείρονται και δεν μακραίνουν πολύ. Η διάταξη ξυσίματος των νυχιών αντικαθίσταται όταν το αποτέλεσμα καθίσταται υπερβολικά περιορισμένο
6. 5,5 όρνιθες κατ' ανώτατο όριο ανά m³ όγκου αίθουσας.

Υπάρχει διάδρομος με πλάτος τουλάχιστον 90 cm μεταξύ των σειρών κλωβών. Υπάρχει διάστημα τουλάχιστον 35 cm μεταξύ δαπέδου και κλωβών στην κατώτερη βαθμίδα.

Κεφάλαιο VII. Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διατήρηση των ζώων αναπαραγωγής

Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 διατυπώνεται ως εξής:

Για ζώα αναπαραγωγής κατοικίδιων ορνίθων που προορίζονται για κρεατοπαραγωγή, η πυκνότητα ζώων δεν υπερβαίνει τα επτά ζώα ανά m². Σε περίπτωση που δεν είναι όλα τα πτηνά σε θέση να εκτελούν τυπικές κινήσεις και να εκδηλώνουν φυσιολογική συμπεριφορά, η πυκνότητα των ζώων πρέπει να μειωθεί όπως απαιτείται.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 καταργείται.

Η τρέχουσα παράγραφος 4 του άρθρου 30 γίνεται η νέα παράγραφος 3.

Το άρθρο 31 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 31 Απαιτήσεις σχετικά με τους κλωβούς

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται διευθετημένοι κλωβοί για τη διατήρηση ζώων αναπαραγωγής ή η εγκατάσταση νέων διευθετημένων κλωβών για ήδη υπάρχοντα σμήνη αναπαραγωγής.

Τα ζώα αναπαραγωγής κατοικίδιων ορνίθων φυλών ωοτοκίας και φυλών που προορίζονται για κρεατοπαραγωγή υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν για τις όρνιθες ωοπαραγωγής σε διευθετημένους κλωβούς. Για ζώα αναπαραγωγής που προορίζονται για κρεατοπαραγωγή, η πυκνότητα ζώων δεν υπερβαίνει τα έξι ζώα ανά m². Σε περίπτωση που δεν είναι όλα τα πτηνά σε θέση να εκτελούν τυπικές κινήσεις και να εκδηλώνουν φυσιολογική συμπεριφορά, η πυκνότητα των ζώων πρέπει να μειωθεί όπως απαιτείται.

Οι κλωβοί πρέπει να είναι αρκετά υπερυψωμένοι ώστε τα πτηνά να μπορούν να ζευγαρώσουν χωρίς κίνδυνο τραυματισμού.

Το άρθρο 32 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 32 Απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση γαλοπούλων

Για τις γαλοπούλες αναπαραγωγής, η πυκνότητα ζώων δεν υπερβαίνει τις τέσσερις γαλοπούλες ανά m² και τους δύο γάλους ανά m². Σε περίπτωση που δεν είναι όλα τα πτηνά

σε θέση να εκτελούν τυπικές κινήσεις και να εκδηλώνουν φυσιολογική συμπεριφορά, η πυκνότητα των ζώων πρέπει να μειωθεί όπως απαιτείται.

Το κεφάλαιο VIII διατυπώνεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διατήρηση πουλάδων κατοικίδιων ορνίθων

Το άρθρο 33 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 33 Απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση σε συστήματα ελεύθερου σταβλισμού

Όταν διατηρούνται πουλάδες κατοικίδιων ορνίθων σε συστήματα ελεύθερου σταβλισμού, η πυκνότητα ζώων δεν υπερβαίνει τα 15 πτηνά ανά m^2 μετά την ηλικία των 12 εβδομάδων και τα 12 πτηνά ανά m^2 μετά την ηλικία των 17 εβδομάδων. Η διάταξη αυτή μπορεί να αρθεί για τους σκοπούς της κοινωνικοποίησης στον ορνιθώνα ωοτοκίας.

Όταν διατηρούνται σε συστήματα πολλαπλών επιπέδων, η πυκνότητα ζώων δεν υπερβαίνει τα 24 πτηνά ανά m^2 ωφέλιμης επιφάνειας μετά την ηλικία των πέντε εβδομάδων και έως την ηλικία των 16 εβδομάδων. Για εκτροφή μετά την ηλικία των 16 εβδομάδων, η πυκνότητα ζώων δεν υπερβαίνει τα 22 πτηνά ανά m^2 ωφέλιμης επιφάνειας.

Σε περίπτωση που δεν είναι όλα τα πτηνά σε θέση να εκτελούν τυπικές κινήσεις και να εκδηλώνουν φυσιολογική συμπεριφορά, η πυκνότητα των ζώων πρέπει να μειωθεί όπως απαιτείται.

Το άρθρο 34 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 34 Απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση σε κλωβούς:

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων εκμεταλλεύσεων πουλάδων για τις οποίες χρησιμοποιούνται διευθετημένοι κλωβοί ή η εγκατάσταση νέων διευθετημένων κλωβών σε υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις πουλάδων.

Όταν διατηρούνται πουλάδες σε κλωβούς, η πυκνότητα ζώων δεν υπερβαίνει τα 28 πτηνά ανά m^2 μετά την ηλικία των πέντε εβδομάδων και τα 15 πτηνά ανά m^2 μετά την ηλικία των 17 εβδομάδων. Σε περίπτωση που δεν είναι όλα τα πτηνά σε θέση να εκτελούν τυπικές κινήσεις και να εκδηλώνουν φυσιολογική συμπεριφορά, η πυκνότητα των ζώων πρέπει να μειωθεί όπως απαιτείται.

Τα πτηνά τα οποία στη συνέχεια θα στεγαστούν σε συστήματα ελεύθερου σταβλισμού μόλις γίνουν όρνιθες αναπαραγωγής ή όρνιθες ωοπαραγωγής δεν διατηρούνται σε κλωβούς.

Το νέο άρθρο 34β διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 34β Συστήματα αναπαραγωγής και κοινοποίηση από κατόχους που διατηρούν πουλάδες

Τα ζώα αναπαραγωγής και οι όρνιθες ωοπαραγωγής διατηρούνται στον ίδιο τύπο συστήματος σταβλισμού στον οποίο διατηρούνταν όταν ήταν πουλάδες.

Οι κάτοχοι που διατηρούν πουλάδες για αναπαραγωγή, το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης, ενημερώνουν τον παραγωγό αυγών σχετικά με το σύστημα στο οποίο στεγάζονταν οι όρνιθες, τη φυλή ή το υβρίδιο, τον αριθμό των πτηνών, την ημερομηνία εκκόλαψης, το ποσοστό θνησιμότητας του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής, το υγειονομικό καθεστώς, την κατάσταση εμβολιασμού και τυχόν κτηνιατρική περίθαλψη.

Το άρθρο 35α διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 35α Πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου

Η τυπική πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής είναι 25 kg/m² κατ' ανώτατο όριο.

Οι παραγωγοί κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής που είναι σε θέση να τεκμηριώσουν ότι η υγεία των πελμάτων των κοτόπουλων είναι καλή μέσω της επιτευχθείσας βαθμολογίας δερματίτιδας των πελμάτων μπορούν να αυξήσουν την πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 35β του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η παραγωγή με πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου μεγαλύτερη από 36 kg/m² κατ' ανώτατο όριο. Επιπλέον, για να γίνει παραγωγή σε πυκνότητες άνω των 34 kg/m², πρέπει επίσης να πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα 2 και 3.

Η νορβηγική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων μπορεί να χορηγήσει άδεια για προσωρινή υπέρβαση της μέγιστης πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων που προκαλούν καθυστερήσεις στην παράδοση των ζώων στο σφαγείο.

Το άρθρο 35β διατυπώνεται ως εξής:-

Άρθρο 35β Πρόγραμμα υγείας των πελμάτων για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

Το πρόγραμμα για την υγεία των πελμάτων βασίζεται σε αξιολόγηση της δερματίτιδας των πελμάτων των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής κατά τη σφαγή, με επακόλουθη διαίρεση σε τρεις κλάσεις:

Κλάση 0: Τίποτα άξιο αναφοράς

Κλάση 1: Ήπιος τραυματισμός, μικρές βλάβες

Κλάση 2: Σοβαρός τραυματισμός, σοβαρές βλάβες.

Οι βαθμολογίες δερματίτιδας των πελμάτων υπολογίζονται με βάση την ταξινόμηση στην πρώτη παράγραφο και υποδιαιρούνται στα επίπεδα Α, Β και Γ.

Κατά την έναρξη του προγράμματος, απαιτούνται τρεις διαδοχικές εισαγωγές πτηνών επιπέδου Α προκειμένου να αυξηθεί η μέγιστη πυκνότητα από 34 σε 36 κιλά. Οι παραγωγοί που μπορούν να τεκμηριώσουν τρεις διαδοχικές εισαγωγές επιπέδου Α αμέσως πριν από την έναρξη του προγράμματος μπορούν να αυξήσουν αμέσως τη μέγιστη πυκνότητα από 34 σε 36 κιλά. Το επίπεδο που επιτυγχάνεται στη συνέχεια επηρεάζει την πυκνότητα ως εξής:

Επιτρεπόμενη μέγιστη πυκνότητα	Επιτευχθέν επίπεδο	Συνέπειες για την επόμενη εισαγωγή
Άνω των 25 kg έως και 33 kg	Μία εισαγωγή επιπέδου Α	Αύξηση κατά 2 kg κατ' ανώτατο όριο.
Από 34 kg έως και 36 kg	Τρεις διαδοχικές εισαγωγές επιπέδου Α	Αύξηση κατά 2 kg κατ' ανώτατο όριο.
Άνω των 25 kg έως και 36 kg	Μία εισαγωγή επιπέδου Β	Μείωση κατά 3 κιλά.
	Εξαίρεση: εισαγωγή επιπέδου Β λαμβάνει χώρα έπειτα από τέσσερις διαδοχικές εισαγωγές επιπέδου Α	Καμία αλλαγή.
Άνω των 25 kg έως και 36 kg	Μία εισαγωγή επιπέδου Γ	Μείωση κατά 5 κιλά.

Εάν περιστάσεις πέραν του ελέγχου του παραγωγού οδηγήσουν σε υψηλή ταξινόμηση για μία εισαγωγή, η νορβηγική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων μπορεί,

κατόπιν αίτησης, να αποφασίσει ότι το επιτευχθέν επίπεδο δεν θα οδηγήσει σε μειωμένη πυκνότητα κατά την επόμενη εισαγωγή.

Το άρθρο 35γ διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 35γ Ειδική τεκμηρίωση για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής που διατηρούνται σε πυκνότητες από 34 kg/m² και άνω

Στην περίπτωση πυκνοτήτων κοτόπουλων έως και 34 kg/m², εκτός από τις πληροφορίες του άρθρου 4δ, επίσης τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα 2 και 3.

Το άρθρο 37 διατυπώνεται ως εξής:

Άρθρο 37 Το πρόγραμμα για την υγεία των πελμάτων των γαλοπουλών

Το πρόγραμμα για την υγεία των πελμάτων βασίζεται σε αξιολόγηση της δερματίτιδας των πελμάτων των θηλυκών γαλοπουλών κατά τη σφαγή, με επακόλουθη διαίρεση σε τέσσερις κλάσεις:

Κλάση 0: Τίποτα άξιο αναφοράς

Κλάση 1: Ήπιος τραυματισμός

Κλάση 2: Σοβαρός τραυματισμός, λιγότερο από το 50 % της επιφάνειας που έχει προσβληθεί από δερματίτιδα των πελμάτων

Κλάση 3: Σοβαρός τραυματισμός, περισσότερο από το 50 % της επιφάνειας που έχει προσβληθεί από δερματίτιδα των πελμάτων.

Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού σε λιγότερο από το 50 % της επιφάνειας που έχει προσβληθεί από δερματίτιδα των πελμάτων, αλλά και σοβαρού τραυματισμού σε ένα ή περισσότερα δάχτυλα των ποδιών, η δερματίτιδα των πελμάτων κατατάσσεται στην κλάση 3.

Οι βαθμολογίες δερματίτιδας των πελμάτων υπολογίζονται με βάση την ταξινόμηση στην πρώτη παράγραφο και υποδιαιρούνται στα επίπεδα Α, Β, Γ και Δ.

Η πυκνότητα των ζώων κατά την εισαγωγή νεοσσών γαλοπούλας μίας ημέρας προσαρμόζεται ως εξής με βάση τη βαθμολογία δερματίτιδας των πελμάτων που επιτεύχθηκε κατά την προηγούμενη εισαγωγή:

Επίπεδο	Βαθμολογία (μέση βαθμολογία δερματίτιδας των πελμάτων για όλες τις σφαγμένες θηλυκές γαλοπούλες)	Ζωική πυκνότητα νεοσσών γαλοπούλας μίας ημέρας ανά m ² στην επακόλουθη εισαγωγή
A	150-179	4,6
B	180-209	4,5
Γ	210-239	4,4
Δ	240 και άνω	4,3

Εάν περιστάσεις πέραν του ελέγχου του παραγωγού οδηγήσουν σε υψηλή ταξινόμηση για μία εισαγωγή, η νορβηγική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων μπορεί, κατόπιν αίτησης, να αποφασίσει ότι η βαθμολογία που επιτυγχάνεται δεν θα οδηγήσει σε μειωμένη πυκνότητα κατά την επόμενη εισαγωγή.

Το κεφάλαιο XI διατυπώνεται ως εξής:

Κεφάλαιο XI. Διοικητικές διατάξεις

Το παράρτημα 3 τμήματα 1 και 2 διατυπώνεται ως εξής:

1. Σε περίπτωση πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου από 34 kg/m² και άνω, ο κάτοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι η τεκμηρίωση που συνοδεύει το σμήνος περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: ημερήσιο ποσοστό θνησιμότητας, συνολική ημερήσια θνησιμότητα για ολόκληρη την

εισαγωγή με βάση τους υπολογισμούς του κατόχου και φυλή ή υβρίδιο από το οποίο αποτελείται το σμήνος.

2. Υπό την εποπτεία της νορβηγικής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το σφαγείο καταχωρίζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 1, μαζί με τον αριθμό των νεκρών ζώων κατά την άφιξη στο σφαγείο, αναφέροντας τον παραγωγό και την εκμετάλλευση / τον ορνιθώνα. Η αξιοπιστία των δεδομένων και του συνολικού ημερήσιου ποσοστού θνησιμότητας για ολόκληρο το σμήνος που εισήχθη ελέγχεται, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σφαγίων και τον αριθμό των ζώων που ήταν νεκρά κατά την άφιξή τους στο σφαγείο.

II

Οι παρούσες αλλαγές τίθενται αμέσως σε ισχύ.